

**Essai de psychopathologie psychosomatique à partir de
deux cas de patients d'une unité de syndrome
métabolique**

Stéphane Flamant

► **To cite this version:**

Stéphane Flamant. Essai de psychopathologie psychosomatique à partir de deux cas de patients d'une unité de syndrome métabolique. Psychologie et comportements. 2012. dumas-00903439

HAL Id: dumas-00903439

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00903439>

Submitted on 12 Nov 2013

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Essai de psychopathologie psychosomatique à partir de deux cas de patients d'une unité de syndrome métabolique

Résumé

Ce mémoire illustre la mise en œuvre de la méthode de psychosomatique intégrative, à partir de deux cas cliniques de patients de l'unité de syndrome métabolique du service d'endocrinologie-métabolisme du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière. Nous montrerons comment un outil de diagnostic, basé sur un questionnaire, peuvent faciliter et sécuriser le diagnostic.

Carole, 65 ans, illustre une névrose de caractère avec une rafale de problèmes somatiques. Elle est venue pour un bilan primaire de syndrome métabolique qui se voit confirmé associé à un diabète de type 2 et une probable hypothyroïdie.

Christian, 53 ans, présente aujourd'hui une névrose de comportement après avoir été diagnostiqué et traité auparavant pour une psychose bipolaire. Le diagnostic d'hypertriglycémie est confirmé après hospitalisation.

Si Carole est caractérisée par un fonctionnement irrégulier au niveau de la deuxième topique, nous trouvons chez Christian une insuffisance originelle du préconscient, signalant une première topique mal assurée. Chez Carole, il existe un affaiblissement fondamental de l'objet et une transformation de la libido objectale en libido narcissique, chez Christian il s'agit d'un Moi fragile car incomplètement constitué. Nous montrons l'existence d'un faisceau central commun des fixations-régressions chez Carole, alors qu'il n'y en a pas d'homogène chez Christian. Sur une base psychopathologique, les préconisations de psychothérapie psychosomatique peuvent être alors ajustées pour prendre en considération, pour l'une, l'état très avancé de la désorganisation progressive et, pour le second, une absence d'ambition élaboratrice.

Mots clés

Psychosomatique ; psychopathologie ; névrose de caractère ; névrose de comportement ; névrose actuelle ; troubles du narcissisme, de l'identité et du Soi ; syndrome métabolique ; diagnostic différentiel ; psychoneuroendocrinologie ; psychothérapie