



**HAL**  
open science

# Points de vue d'adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire : quelles attentes ont-ils de leur relation à leur médecin traitant

Géraldine Novoa

## ► To cite this version:

Géraldine Novoa. Points de vue d'adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire : quelles attentes ont-ils de leur relation à leur médecin traitant. Sciences du Vivant [q-bio]. 2019. dumas-02517075

**HAL Id: dumas-02517075**

**<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02517075v1>**

Submitted on 24 Mar 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Faculté des sciences  
médicales et paramédicales  
Aix-Marseille Université

**Points de vue d'adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire :  
Quelles attentes ont-ils de leur relation à leur médecin traitant ?**

# **T H È S E**

**Présentée et publiquement soutenue devant**

**LA FACULTÉ DES SCIENCES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES  
DE MARSEILLE**

**Le 6 Décembre 2019**

**Par Madame Géraldine NOVOA**

**Née le 1er décembre 1987 à Perpignan (66)**

**Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine**

**D.E.S. de MÉDECINE GÉNÉRALE**

**Membres du Jury de la Thèse :**

**Monsieur le Professeur POINSO François**

**Président**

**Monsieur le Professeur GARCIA Marc**

**Directeur**

**Monsieur le Professeur DA FONSECA David**

**Assesseur**

**Monsieur le Professeur GENTILE Gaétan**

**Assesseur**





**Points de vue d'adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire :  
Quelles attentes ont-ils de leur relation à leur médecin traitant ?**

# **T H È S E**

**Présentée et publiquement soutenue devant**

**LA FACULTÉ DES SCIENCES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES  
DE MARSEILLE**

**Le 6 Décembre 2019**

**Par Madame Géraldine NOVOA**

**Née le 1er décembre 1987 à Perpignan (66)**

**Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine**

**D.E.S. de MÉDECINE GÉNÉRALE**

**Membres du Jury de la Thèse :**

**Monsieur le Professeur POINSO François**

**Président**

**Monsieur le Professeur GARCIA Marc**

**Directeur**

**Monsieur le Professeur DA FONSECA David**

**Assesseur**

**Monsieur le Professeur GENTILE Gaétan**

**Assesseur**

# AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Président : Yvon BERLAND

## FACULTE DES SCIENCES MEDICALES ET PARAMEDICALES

Doyen Georges LEONETTI

Vice-doyen aux Affaires Générales et aux Sciences Médicales : Patrick DESSI

Vice-doyen aux Sciences Paramédicales : Philippe BERBIS

### Direction d'école :

- **Ecole de Médecine** : Jean-Michel VITON
- **Ecoles de Maïeutique** : Carole ZAKARIAN
- **Ecoles des Sciences de la Réadaptation** : Philippe SAUVAGEON
- **Ecoles des Sciences Infirmières** : Sébastien COLSON

### Asseseurs :

- aux Etudes : Kathia CHAUMOITRE
- à la Recherche : Jean-Louis MEGE
- aux Prospectives Hospitalo-Universitaires : Frédéric COLLART
- aux Enseignements Hospitaliers : Patrick VILLANI
- à l'Unité Mixte de Formation Continue en Santé : Fabrice BARLESI
- pour le Secteur Nord : Stéphane BERDAH
- aux centres hospitaliers non universitaires : Jean-Noël ARGENSON

### Chargés de mission :

- 1<sup>er</sup> cycle : Jean-Marc DURAND et Marc BARTHET
- 2<sup>ème</sup> cycle : Marie-Aleth RICHARD
- 3<sup>ème</sup> cycle DES/DESC : Pierre-Edouard FOURNIER
- Licences-Masters-Doctorat : Pascal ADALIAN
- DU-DIU : Véronique VITTON
- Stages Hospitaliers : Franck THUNY
- Sciences Humaines et Sociales : Pierre LE COZ
- Préparation à l'ECN : Aurélie DAUMAS
- Démographie Médicale et Filiarisation : Roland SAMBUC
- Relations Internationales : Philippe PAROLA
- Etudiants : Arthur ESQUER

Chef des services généraux : Déborah ROCCHICCIOLI

### Chefs de service :

- Communication : Laetitia DELOUIS
- Examens : Caroline MOUTTET
- Intérieur : Joëlle FAVREGA
- Maintenance : Philippe KOCK
- Scolarité : Christine GAUTHIER

### DOYENS HONORAIRES

M. Yvon BERLAND  
M. André ALI CHERIF  
M. Jean-François PELLISSIER

Mis à jour 01/01/2019

## PROFESSEURS HONORAIRES

MM	AGOSTINI Serge	MM	FAVRE Roger
	ALDIGHIERI René		FIECHI Marius
	ALESSANDRINI Pierre		FARNARIER Georges
	ALLIEZ Bernard		FIGARELLA Jacques
	AQUARON Robert		FONTES Michel
	ARGEME Maxime		FRANCOIS Georges
	ASSADOURIAN Robert		FUENTES Pierre
	AUFFRAY Jean-Pierre		GABRIEL Bernard
	AUTILLO-TOUATI Amapola		GALINIER Louis
	AZORIN Jean-Michel		GALLAIS Hervé
	BAILLE Yves		GAMERRE Marc
	BARDOT Jacques		GARCIN Michel
	BARDOT André		GARNIER Jean-Marc
	BERARD Pierre		GAUTHIER André
	BERGOIN Maurice		GERARD Raymond
	BERNARD Dominique		GEROLAMI-SANTANDREA André
	BERNARD Jean-Louis		GIUDICELLI Roger
	BERNARD Pierre-Marie		GIUDICELLI Sébastien
	BERTRAND Edmond		GOUDARD Alain
	BISSET Jean-Pierre		GOUIN François
	BLANC Bernard		GRILLO Jean-Marie
	BLANC Jean-Louis		GRISOLI François
	BOLLINI Gérard		GROULIER Pierre
	BONGRAND Pierre		HADIDA/SAYAG Jacqueline
	BONNEAU Henri		HASSOUN Jacques
	BONNOIT Jean		HEIM Marc
	BORY Michel		HOUEL Jean
	BOTTA Alain		HUGUET Jean-François
	BOURGEADE Augustin		JAQUET Philippe
	BOUVENOT Gilles		JAMMES Yves
	BOUYALA Jean-Marie		JOUVE Paulette
	BREMOND Georges		JUHAN Claude
	BRICOT René		JUIN Pierre
	BRUNET Christian		KAPHAN Gérard
	BUREAU Henri		KASBARIAN Michel
	CAMBOULIVES Jean		KLEISBAUER Jean-Pierre
	CANNONI Maurice		LACHARD Jean
	CARTOUZOU Guy		LAFFARGUE Pierre
	CAU Pierre		LAUGIER René
	CHABOT Jean-Michel		LE TREUT Yves
	CHAMLIAN Albert		LEVY Samuel
	CHARREL Michel		LOUCHET Edmond
	CHAUVEL Patrick		LOUIS René
	CHOUX Maurice		LUCIANI Jean-Marie
	CIANFARANI François		MAGALON Guy
	CLEMENT Robert		MAGNAN Jacques
	COMBALBERT André		MALLAN- MANCINI Josette
	CONTE-DEVOLX Bernard		MALMEJAC Claude
	CORRIOL Jacques		MARANINCHI Dominique
	COULANGE Christian		MARTIN Claude
	DALMAS Henri		MATTEI Jean François
	DE MICO Philippe		MERCIER Claude
	DESSEIN Alain		METGE Paul
	DELARQUE Alain		MICHOTÉY Georges
	DEVIN Robert		MILLET Yves
	DEVRED Philippe		MIRANDA François
	DJIANE Pierre		MONFORT Gérard
	DONNET Vincent		MONGES André
	DUCASSOU Jacques		MONGIN Maurice
	DUFOUR Michel		MONTIES Jean-Raoul
	DUMON Henri		NAZARIAN Serge
	ENJALBERT Alain		NICOLI René

MM NOIRCLERC Michel  
OLMER Michel  
OREHEK Jean  
PAPY Jean-Jacques  
PAULIN Raymond  
PELOUX Yves  
PENAUD Antony  
PENE Pierre  
PIANA Lucien  
PICAUD Robert  
PIGNOL Fernand  
POGGI Louis  
POITOUT Dominique  
PONCET Michel  
POUGET Jean  
PRIVAT Yvan  
QUILICHINI Francis  
RANQUE Jacques  
RANQUE Philippe  
RICHAUD Christian  
RIDINGS Bernard  
ROCHAT Hervé  
ROHNER Jean-Jacques  
ROUX Hubert  
ROUX Michel  
RUFO Marcel  
SAHEL José  
SALAMON Georges  
SALDUCCI Jacques  
SAN MARCO Jean-Louis  
SANKALE Marc  
SARACCO Jacques  
SASTRE Bernard  
SCHIANO Alain  
SCOTTO Jean-Claude  
SEBAHOUN Gérard  
SERMENT Gérard  
SERRATRICE Georges  
SOULAYROL René  
STAHL André  
TAMALET Jacques  
TARANGER-CHARPIN Colette  
THOMASSIN Jean-Marc  
UNAL Daniel  
VAGUE Philippe  
VAGUE/JUHAN Irène  
VANUXEM Paul  
VERVLOET Daniel  
VIALETES Bernard  
WEILLER Pierre-Jean

## PROFESSEURS HONORIS CAUSA

### 1967

MM. les Professeurs DADI (Italie)  
CID DOS SANTOS (Portugal)

### 1974

MM. les Professeurs MAC ILWAIN (Grande-Bretagne)  
T.A. LAMBO (Suisse)

### 1975

MM. les Professeurs O. SWENSON (U.S.A.)  
Lord J.WALTON of DETCHANT (Grande-Bretagne)

### 1976

MM. les Professeurs P. FRANCHIMONT (Belgique)  
Z.J. BOWERS (U.S.A.)

### 1977

MM. les Professeurs C. GAJDUSEK-Prix Nobel (U.S.A.)  
C.GIBBS (U.S.A.)  
J. DACIE (Grande-Bretagne)

### 1978

M. le Président F. HOUPHOUET-BOIGNY (Côte d'Ivoire)

### 1980

MM. les Professeurs A. MARGULIS (U.S.A.)  
R.D. ADAMS (U.S.A.)

### 1981

MM. les Professeurs H. RAPPAPORT (U.S.A.)  
M. SCHOU (Danemark)  
M. AMENT (U.S.A.)  
Sir A. HUXLEY (Grande-Bretagne)  
S. REFSUM (Norvège)

### 1982

M. le Professeur W.H. HENDREN (U.S.A.)

### 1985

MM. les Professeurs S. MASSRY (U.S.A.)  
KLINSMANN (R.D.A.)

### 1986

MM. les Professeurs E. MIHICH (U.S.A.)  
T. MUNSAT (U.S.A.)  
LIANA BOLIS (Suisse)  
L.P. ROWLAND (U.S.A.)

### 1987

M. le Professeur P.J. DYCK (U.S.A.)

### 1988

MM. les Professeurs R. BERGUER (U.S.A.)  
W.K. ENGEL (U.S.A.)  
V. ASKANAS (U.S.A.)  
J. WEHSTER KIRKLIN (U.S.A.)  
A. DAVIGNON (Canada)  
A. BETTARELLO (Brésil)

### 1989

M. le Professeur P. MUSTACCHI (U.S.A.)



**1990**

MM. les Professeurs J.G. MC LEOD (Australie)  
J. PORTER (U.S.A.)

**1991**

MM. les Professeurs J. Edward MC DADE (U.S.A.)  
W. BURGENDORFER (U.S.A.)

**1992**

MM. les Professeurs H.G. SCHWARZACHER (Autriche)  
D. CARSON (U.S.A.)  
T. YAMAMURO (Japon)

**1994**

MM. les Professeurs G. KARPATI (Canada)  
W.J. KOLFF (U.S.A.)

**1995**

MM. les Professeurs D. WALKER (U.S.A.)  
M. MULLER (Suisse)  
V. BONOMINI (Italie)

**1997**

MM. les Professeurs C. DINARELLO (U.S.A.)  
D. STULBERG (U.S.A.)  
A. MEIKLE DAVISON (Grande-Bretagne)  
P.I. BRANEMARK (Suède)

**1998**

MM. les Professeurs O. JARDETSKY (U.S.A.)

**1999**

MM. les Professeurs J. BOTELLA LLUSIA (Espagne)  
D. COLLEN (Belgique)  
S. DIMAURO (U. S. A.)

**2000**

MM. les Professeurs D. SPIEGEL (U. S. A.)  
C. R. CONTI (U.S.A.)

**2001**

MM. les Professeurs P-B. BENNET (U. S. A.)  
G. HUGUES (Grande Bretagne)  
J-J. O'CONNOR (Grande Bretagne)

**2002**

MM. les Professeurs M. ABEDI (Canada)  
K. DAI (Chine)

**2003**

M. le Professeur T. MARRIE (Canada)  
Sir G.K. RADDI (Grande Bretagne)

**2004**

M. le Professeur M. DAKE (U.S.A.)

**2005**

M. le Professeur L. CAVALLI-SFORZA (U.S.A.)

**2006**

M. le Professeur A. R. CASTANEDA (U.S.A.)

**2007**

M. le Professeur S. KAUFMANN (Allemagne)

## PROFESSEURS EMERITE

### 2008

M. le Professeur	LEVY Samuel	31/08/2011
Mme le Professeur	JUHAN-VAGUE Irène	31/08/2011
M. le Professeur	PONCET Michel	31/08/2011
M. le Professeur	KASBARIAN Michel	31/08/2011
M. le Professeur	ROBERTOUX Pierre	31/08/2011

### 2009

M. le Professeur	DJIANE Pierre	31/08/2011
M. le Professeur	VERVLOET Daniel	31/08/2012

### 2010

M. le Professeur	MAGNAN Jacques	31/12/2014
------------------	----------------	------------

### 2011

M. le Professeur	DI MARINO Vincent	31/08/2015
M. le Professeur	MARTIN Pierre	31/08/2015
M. le Professeur	METRAS Dominique	31/08/2015

### 2012

M. le Professeur	AUBANIAC Jean-Manuel	31/08/2015
M. le Professeur	BOUVENOT Gilles	31/08/2015
M. le Professeur	CAMBOULIVES Jean	31/08/2015
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2015
M. le Professeur	MATTEI Jean-François	31/08/2015
M. le Professeur	OLIVER Charles	31/08/2015
M. le Professeur	VERVLOET Daniel	31/08/2015

### 2013

M. le Professeur	BRANCHEREAU Alain	31/08/2016
M. le Professeur	CARAYON Pierre	31/08/2016
M. le Professeur	COZZONE Patrick	31/08/2016
M. le Professeur	DELMONT Jean	31/08/2016
M. le Professeur	HENRY Jean-François	31/08/2016
M. le Professeur	LE GUICHAOUA Marie-Roberte	31/08/2016
M. le Professeur	RUFO Marcel	31/08/2016
M. le Professeur	SEBAHOUN Gérard	31/08/2016

### 2014

M. le Professeur	FUENTES Pierre	31/08/2017
M. le Professeur	GAMERRE Marc	31/08/2017
M. le Professeur	MAGALON Guy	31/08/2017
M. le Professeur	PERAGUT Jean-Claude	31/08/2017
M. le Professeur	WEILLER Pierre-Jean	31/08/2017

### 2015

M. le Professeur	COULANGE Christian	31/08/2018
M. le Professeur	COURAND François	31/08/2018
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2016
M. le Professeur	MATTEI Jean-François	31/08/2016
M. le Professeur	OLIVER Charles	31/08/2016
M. le Professeur	VERVLOET Daniel	31/08/2016

**2016**

M. le Professeur	BONGRAND Pierre	31/08/2019
M. le Professeur	BOUVENOT Gilles	31/08/2017
M. le Professeur	BRUNET Christian	31/08/2019
M. le Professeur	CAU Pierre	31/08/2019
M. le Professeur	COZZONE Patrick	31/08/2017
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2017
M. le Professeur	FONTES Michel	31/08/2019
M. le Professeur	JAMMES Yves	31/08/2019
M. le Professeur	NAZARIAN Serge	31/08/2019
M. le Professeur	OLIVER Charles	31/08/2017
M. le Professeur	POITOUT Dominique	31/08/2019
M. le Professeur	SEBAHOUN Gérard	31/08/2017
M. le Professeur	VIALETTES Bernard	31/08/2019

**2017**

M. le Professeur	ALESSANDRINI Pierre	31/08/2020
M. le Professeur	BOUVENOT Gilles	31/08/2018
M. le Professeur	CHAUVEL Patrick	31/08/2020
M. le Professeur	COZZONE Pierre	31/08/2018
M. le Professeur	DELMONT Jean	31/08/2018
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2018
M. le Professeur	OLIVER Charles	31/08/2018
M. le Professeur	SEBBAHOUN Gérard	31/08/2018

**2018**

M. le Professeur	MARANINCHI Dominique	31/08/2021
M. le Professeur	BOUVENOT Gilles	31/08/2019
M. le Professeur	COZZONE Pierre	31/08/2019
M. le Professeur	DELMONT Jean	31/08/2019
M. le Professeur	FAVRE Roger	31/08/2019
M. le Professeur	OLIVER Charles	31/08/2019

**PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS**

AGOSTINI FERRANDES Aubert	CHINOT Olivier	GRIMAUD Jean-Charles
ALBANESE Jacques	CHOSSEGROS Cyrille	GROB Jean-Jacques
ALIMI Yves	<i>CLAVIERIE Jean-Michel Surnombre</i>	GUEDJ Eric
AMABILE Philippe	COLLART Frédéric	GUIEU Régis
AMBROSI Pierre	COSTELLO Régis	GUIS Sandrine
ANDRE Nicolas	COURBIERE Blandine	GUYE Maxime
ARGENSON Jean-Noël	COWEN Didier	GUYOT Laurent
ASTOUL Philippe	CRAVELLO Ludovic	GUYSS Jean-Michel
ATTARIAN Shahram	CUISSET Thomas	HABIB Gilbert
AUDOUIN Bertrand	CURVALE Georges	HARDWIGSEN Jean
AUQUIER Pascal	DA FONSECA David	HARLE Jean-Robert
AVIERINOS Jean-François	DAHAN-ALCARAZ Laetitia	<i>HOFFART Louis Disponibilité</i>
AZULAY Jean-Philippe	DANIEL Laurent	HOUVENAEGHEL Gilles
BAILLY Daniel	DARMON Patrice	JACQUIER Alexis
BARLESI Fabrice	D'ERCOLE Claude	JOURDE-CHICHE Noémie
BARLIER-SETTI Anne	D'JOURNO Xavier	JOUVE Jean-Luc
BARTHET Marc	DEHARO Jean-Claude	KAPLANSKI Gilles
BARTOLI Christophe	DELAPORTE Emmanuel	KARSENTY Gilles
BARTOLI Jean-Michel	DELPERO Jean-Robert	KERBAUL François
BARTOLI Michel	DENIS Danièle	KRAHN Martin
BARTOLOMEI Fabrice	DISDIER Patrick	LAFFORGUE Pierre
BASTIDE Cyrille	DODDOLI Christophe	LAGIER Jean-Christophe
BENSOUSSAN Laurent	DRANCOURT Michel	LAMBAUDIE Eric
BERBIS Philippe	DUBUS Jean-Christophe	LANCON Christophe
BERDAH Stéphane	DUFFAUD Florence	LA SCOLA Bernard
<i>BERLAND Yvon Surnombre</i>	DUFOUR Henry	LAUNAY Franck
BERNARD Jean-Paul	DURAND Jean-Marc	LAVIEILLE Jean-Pierre
BEROUD Christophe	DUSSOL Bertrand	LE CORROLLER Thomas
BERTUCCI François	EUSEBIO Alexandre	LECHEVALLIER Eric
BLAISE Didier	FAKHRY Nicolas	LEGRE Régis
BLIN Olivier	<i>FAUGERE Gérard Surnombre</i>	LEHUCHER-MICHEL Marie-Pascale
BLONDEL Benjamin	FELICIAN Olivier	LEONE Marc
BONIN/GUILLAUME Sylvie	FENOLLAR Florence	LEONETTI Georges
BONELLO Laurent	FIGARELLA/BRANGER Dominique	LEPIDI Hubert
BONNET Jean-Louis	FLECHER Xavier	LEVY Nicolas
<i>BOTTA/FRIDLUND Danielle Surnom</i>	FOURNIER Pierre-Edouard	MACE Loïc
BOUBLI Léon	<i>FRANCES Yves Surnombre</i>	MAGNAN Pierre-Edouard
BOUFI Mourad	FRANCESCHI Frédéric	<i>MATONTI Frédéric Disponibilité</i>
BOYER Laurent	FUENTES Stéphane	MEGE Jean-Louis
BREGÉON Fabienne	GABERT Jean	MERROT Thierry
BRETELLE Florence	GABORIT Bénédicte	METZLER/GUILLEMAIN Catherine
BROUQUI Philippe	GAINNIER Marc	MEYER/DUTOUR Anne
BRUDER Nicolas	GARCIA Stéphane	MICCALEF/ROLL Joëlle
BRUE Thierry	GARIBOLDI Vlad	MICHEL Fabrice
BRUNET Philippe	GAUDART Jean	MICHEL Gérard
BURTEY Stéphane	GAUDY-MARQUESTE Caroline	MICHEL Justin
CARCOPINO-TUSOLI Xavier	GENTILE Stéphanie	MICHELET Pierre
CASANOVA Dominique	GERBEAUX Patrick	MILH Mathieu
CASTINETTI Frédéric	GEROLAMI/SANTANDREA René	MOAL Valérie
CECCALDI Mathieu	GILBERT/ALESSI Marie-Christine	MONCLA Anne
CHAGNAUD Christophe	GIORGI Roch	MORANGE Pierre-Emmanuel
CHAMBOST Hervé	GIOVANNI Antoine	MOULIN Guy
CHAMPSAUR Pierre	GIRARD Nadine	MOUTARDIER Vincent
CHANEZ Pascal	GIRAUD/CHABROL Brigitte	<i>MUNDLER Olivier Surnombre</i>
CHARAFFE-JAUFFRET Emmanuelle	GONCALVES Anthony	NAUDIN Jean
CHARREL Rémi	GORINCOUR Guillaume	NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier
<i>CHARPIN Denis Surnombre</i>	GRANEL/REY Brigitte	NICOLLAS Richard
CHAUMOITRE Kathia	GRANVAL Philippe	OLIVE Daniel
CHIARONI Jacques	GREILLIER Laurent	OUAFIK L'Houcine

PAGANELLI Franck	ROCHE Pierre-Hugues	THOMAS Pascal
PANUEL Michel	ROCH Antoine	THUNY Franck
PAPAZIAN Laurent	ROCHWERGER Richard	TREBUCHON-DA FONSECA Agnès
PAROLA Philippe	ROLL Patrice	TRIGLIA Jean-Michel
<i>PARRATTE Sébastien Disponibilité</i>	ROSSI Dominique	TROPIANO Patrick
PELISSIER-ALICOT Anne-Laure	ROSSI Pascal	TSIMARATOS Michel
PELLETIER Jean	ROUDIER Jean	TURRINI Olivier
PERRIN Jeanne	SALAS Sébastien	VALERO René
PETIT Philippe	<i>SAMBUC Roland Surnombre</i>	VAROQUAUX Arthur Damien
PHAM Thao	SARLES Jacques	VELLY Lionel
PIERCECCHI/MARTI Marie-Dominique	SARLES/PHILIP Nicole	VEY Norbert
PIQUET Philippe	SARLON-BARTOLI Gabrielle	VIDAL Vincent
PIRRO Nicolas	SCAVARDA Didier	VIENS Patrice
POINSO François	SCHLEINITZ Nicolas	VILLANI Patrick
RACCAH Denis	SEBAG Frédéric	VITON Jean-Michel
RANQUE Stéphane	SEITZ Jean-François	VITTON Véronique
RAOULT Didier	SIELEZNEFF Igor	VIEHWEGER Heide Elke
REGIS Jean	SIMON Nicolas	VIVIER Eric
REYNAUD/GAUBERT Martine	STEIN Andréas	XERRI Luc
REYNAUD Rachel	TAIEB David	
RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth	THIRION Xavier	

---

#### **PROFESSEUR DES UNIVERSITES**

ADALIAN Pascal  
 AGHABABIAN Valérie  
 BELIN Pascal  
 CHABANNON Christian  
 CHABRIERE Eric  
 FERON François  
 LE COZ Pierre  
 LEVASSEUR Anthony  
 RANJEVA Jean-Philippe  
 SOBOL Hagay

#### **PROFESSEUR CERTIFIE**

BRANDENBURGER Chantal

#### **PRAG**

TANTI-HARDOUIN Nicolas

#### **PROFESSEUR ASSOCIE DE MEDECINE GENERALE A MI-TEMPS**

ADNOT Sébastien  
 FILIPPI Simon

## MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIEN HOSPITALIER

ACHARD Vincent ( <i>disponibilité</i> )	EBBO Mikaël	NGUYEN PHONG Karine
HERFI Sarah	FABRE Alexandre	NINOVE Laetitia
ANGELAKIS Emmanouïl ( <i>dispo oct 2018</i> )	FAURE Alice	NOUGAIREDE Antoine
ATLAN Catherine ( <i>disponibilité</i> )	FOLETTI Jean- Marc	OLLIVIER Matthieu
BARTHELEMY Pierre	FOUILLOUX Virginie	OVAERT Caroline
BEGE Thierry	FROMNOT Julien	PAULMYER/LACROIX Odile
BELIARD Sophie	GASTALDI Marguerite	PESENTI Sébastien
BERBIS Julie	GELSI/BOYER Véronique	RESSEGUIER Noémie
BERGE-LEFRANC Jean-Louis	GIUSIANO Bernard	REY Marc
BERTRAND Baptiste	GIUSIANO COURCAMBECK Sophie	ROBERT Philippe
BEYER-BERJOT Laura	GONZALEZ Jean-Michel	SABATIER Renaud
BIRNBAUM David	GOURIET Frédérique	SARI-MINODIER Irène
BONINI Francesca	GRAILLON Thomas	SAVEANU Alexandru
BOUCRAUT Joseph	GRISOLI Dominique	SECQ Véronique
BOULAMERY Audrey	GUERIN Carole	SUCHON Pierre
BOULLU/CIOCCA Sandrine	GUENOUN MEYSSIGNAC Daphné	TABOURET Emeline
BUFFAT Christophe	GUIDON Catherine	TOGA Caroline
CAMILLERI Serge	HAUTIER/KRAHN Aurélie	TOGA Isabelle
CARRON Romain	HRAIECH Sami	TOMASINI Pascale
CASSAGNE Carole	KASPI-PEZZOLI Elise	TOSELLO Barthélémy
CHAUDET Hervé	L'OLLIVIER Coralie	TROUSSE Delphine
CHRETIEN Anne-Sophie	LABIT-BOUVIER Corinne	TUCHTAN-TORRENTS Lucile
COZE Carole	LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina	VELY Frédéric
CUNY Thomas	LAGIER Aude ( <i>disponibilité</i> )	VION-DURY Jean
DADOUN Frédéric ( <i>disponibilité</i> )	LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude	ZATTARA/CANNONI Hélène
DALES Jean-Philippe	LEVY/MOZZICONACCI Annie	
DAUMAS Aurélie	LOOSVELD Marie	
DEGEORGES/VITTE Joëlle	MANCINI Julien	
DELLIAUX Stéphane	MARY Charles	
DESPLAT/JEGO Sophie	MASCAUX Céline	
DEVILLIER Raynier	MAUES DE PAULA André	
DUBOURG Grégory	MILLION Matthieu	
DUFOUR Jean-Charles	MOTTOLA GHIGO Giovanna	

## MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES

(mono-appartenants)

ABU ZAINEH Mohammad	DEGIOANNI/SALLE Anna	RUEL Jérôme
BARBACARU/PERLES T. A.	DESNUES Benoît	THOLLON Lionel
BERLAND/BENHAIM Caroline	MARANINCHI Marie	THIRION Sylvie
BOUCAULT/GARROUSTE Françoise	MERHEJ/CHAUVEAU Vicky	VERNA Emeline
BOYER Sylvie	MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte	
COLSON Sébastien	POGGI Marjorie	

## MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE

CASANOVA Ludovic  
GENTILE Gaëtan

## MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES DE MEDECINE GENERALE à MI-TEMPS

BARGIER Jacques  
BONNET Pierre-André  
CALVET-MONTREDON Céline  
GUIDA Pierre  
JANCZEWSKI Aurélie

## MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE à MI-TEMPS

MATHIEU Marion  
REVIS Joana

**PROFESSEURS DES UNIVERSITES et MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS  
PROFESSEURS ASSOCIES, MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES mono-appartenants**

<b>ANATOMIE 4201</b>	<b>ANTHROPOLOGIE 20</b>
<p>CHAMPSAUR Pierre (PU-PH) LE CORROLLER Thomas (PU-PH) PIRRO Nicolas (PU-PH)</p> <p>GUENOUN-MEYSSIGNAC Daphné (MCU-PH) <i>LAGIER Aude (MCU-PH) disponibilité</i></p> <p>THOLLON Lionel (MCF) (60ème section)</p>	<p>ADALIAN Pascal (PR)</p> <p>DEGIOANNI/SALLE Anna (MCF) VERNA Emeline (MCF)</p>
<b>ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 4203</b>	<b>BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE ; HYGIENE HOSPITALIERE 4501</b>
<p>CHARAFE/JAUFFRET Emmanuelle (PU-PH) DANIEL Laurent (PU-PH) FIGARELLA/BRANGER Dominique (PU-PH) GARCIA Stéphane (PU-PH) XERRI Luc (PU-PH)</p> <p>DALES Jean-Philippe (MCU-PH) GIUSIANO COURCAMBECK Sophie (MCU PH) LABIT/BOUVIER Corinne (MCU-PH) MAUES DE PAULA André (MCU-PH) SECQ Véronique (MCU-PH)</p>	<p>CHARREL Rémi (PU PH) DRANCOURT Michel (PU-PH) FENOLLAR Florence (PU-PH) FOURNIER Pierre-Edouard (PU-PH) NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier (PU-PH) LA SCOLA Bernard (PU-PH) RAOULT Didier (PU-PH)</p> <p>AHERFI Sarah (MCU-PH) <i>ANGELAKIS Emmanouil (MCU-PH) disponibilité octobre 2018</i> DUBOURG Grégory (MCU-PH) GOURIET Frédérique (MCU-PH) NOUGAIREDE Antoine (MCU-PH) NINOVE Laetitia (MCU-PH)</p> <p>CHABRIERE Eric (PR) (64ème section) LEVASSEUR Anthony (PR) (64ème section) DESNUES Benoit (MCF) ( 65ème section ) MERHEJ/CHAUVEAU Vicky (MCF) (87ème section)</p>
<b>ANESTHESIOLOGIE ET REANIMATION CHIRURGICALE ; MEDECINE URGENCE 4801</b>	<b>BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 4401</b>
<p>ALBANESE Jacques (PU-PH) BRUDER Nicolas (PU-PH) LEONE Marc (PU-PH) MICHEL Fabrice (PU-PH) VELLY Lionel (PU-PH)</p> <p>GUIDON Catherine (MCU-PH)</p>	<p>BARLIER/SETTI Anne (PU-PH) GABERT Jean (PU-PH) GUIEU Régis (PU-PH) OUAFIK L'Houcine (PU-PH)</p> <p>BUFFAT Christophe (MCU-PH) FROMNOT Julien (MCU-PH) MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH) SAVEANU Alexandru (MCU-PH)</p>
<b>ANGLAIS 11</b>	<b>BIOLOGIE CELLULAIRE 4403</b>
<p>BRANDENBURGER Chantal (PRCE)</p>	<p>ROLL Patrice (PU-PH)</p> <p>GASTALDI Marguerite (MCU-PH) KASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH) LEVY-MOZZICONACCI Annie (MCU-PH)</p>
<b>BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA REPRODUCTION ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5405</b>	
<p>METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH) PERRIN Jeanne (PU-PH)</p>	
<b>BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 4301</b>	<b>CARDIOLOGIE 5102</b>
<p>GUEDJ Eric (PU-PH) GUYE Maxime (PU-PH) <i>MUNDLER Olivier (PU-PH) Surnombre</i> TAIEB David (PU-PH)</p> <p>BELIN Pascal (PR) (69ème section) RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)</p> <p>CAMMILLERI Serge (MCU-PH) VION-DURY Jean (MCU-PH)</p> <p>BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)</p>	<p>AVIERINOS Jean-François (PU-PH) BONELLO Laurent (PU PH) BONNET Jean-Louis (PU-PH) CUISSSET Thomas (PU-PH) DEHARO Jean-Claude (PU-PH) FRANCESCHI Frédéric (PU-PH) HABIB Gilbert (PU-PH) PAGANELLI Franck (PU-PH) THUNY Franck (PU-PH)</p>
<b>BIostatistiques, Informatique Médicale ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604</b>	<b>CHIRURGIE DIGESTIVE 5202</b>
<p><i>CLAVERIE Jean-Michel (PU-PH) Surnombre</i> GAUDART Jean (PU-PH) GIORGI Roch (PU-PH)</p> <p>CHAUDET Hervé (MCU-PH) DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH) GIUSIANO Bernard (MCU-PH) MANCINI Julien (MCU-PH)</p> <p>ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section) BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)</p>	<p>BERDAH Stéphane (PU-PH) HARDWIGSEN Jean (PU-PH) SIELEZNEFF Igor (PU-PH)</p> <p>BEYER-BERJOT Laura (MCU-PH)</p>
	<b>CHIRURGIE GENERALE 5302</b>
	<p>DELPERO Jean-Robert (PU-PH) MOUTARDIER Vincent (PU-PH) SEBAG Frédéric (PU-PH) TURRINI Olivier (PU-PH)</p> <p>BEGE Thierry (MCU-PH) BIRNBAUM David (MCU-PH)</p>

<b>CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002</b>	GUERIN Carole (MCU PH)
ARGENSON Jean-Noël (PU-PH) BLONDEL Benjamin (PU-PH) CURVALE Georges (PU-PH) FLECHER Xavier (PU PH) <i>PARRATTE Sébastien (PU-PH) Disponibilité</i> ROCHWARGER Richard (PU-PH) TROPIANO Patrick (PU-PH)	<b>CHIRURGIE INFANTILE 5402</b>
OLLIVIER Matthieu (MCU-PH)	GUYS Jean-Michel (PU-PH) JOUVE Jean-Luc (PU-PH) LAUNAY Franck (PU-PH) MERRROT Thierry (PU-PH) VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH) FAURE Alice (MCU PH) PESENTI Sébastien (MCU-PH)
<b>CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702</b>	<b>CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 5503</b>
BERTUCCI François (PU-PH) CHINOT Olivier (PU-PH) COWEN Didier (PU-PH) DUFFAUD Florence (PU-PH) GONCALVES Anthony PU-PH) HOUVENAEGHHEL Gilles (PU-PH) LAMBAUDIE Eric (PU-PH) SALAS Sébastien (PU-PH) VIENS Patrice (PU-PH)	CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH) GUYOT Laurent (PU-PH)
SABATIER Renaud (MCU-PH) TABOURET Emeline (MCU-PH)	FOLETTI Jean-Marc (MCU-PH)
<b>CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103</b>	<b>CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛOLOGIE 5004</b>
COLLART Frédéric (PU-PH) D'JOURNO Xavier (PU-PH) DODDOLI Christophe (PU-PH) GARIBOLDI Vlad (PU-PH) MACE Loïc (PU-PH) THOMAS Pascal (PU-PH)	CASANOVA Dominique (PU-PH) LEGRE Régis (PU-PH)
FOUJLLOUX Virginie (MCU-PH) GRISOLI Dominique (MCU-PH) TROUSSE Delphine (MCU-PH)	BERTRAND Baptiste (MCU-PH) HAUTIER/KRAHN Aurélie (MCU-PH)
<b>CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104</b>	<b>GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201</b>
ALIMI Yves (PU-PH) AMABILE Philippe (PU-PH) BARTOLI Michel (PU-PH) BOUFI Mourad (PU-PH) MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH) PIQUET Philippe (PU-PH) SARLON-BARTOLI Gabrielle (PU PH)	BARTHET Marc (PU-PH) BERNARD Jean-Paul (PU-PH) <i>BOTTA-FRIDLUND Danielle (PU-PH) Surnombre</i> DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH) GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH) GRANDVAL Philippe (PU-PH) GRIMAUD Jean-Charles (PU-PH)
<b>HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202</b>	SEITZ Jean-François (PU-PH) VITTON Véronique (PU-PH)
LEPIDI Hubert (PU-PH)	GONZALEZ Jean-Michel (MCU-PH)
<i>ACHARD Vincent (MCU-PH) disponibilité</i> PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)	<b>GENETIQUE 4704</b>
<b>DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003</b>	BEROUD Christophe (PU-PH) KRAHN Martin (PU-PH) LEVY Nicolas (PU-PH) MONCLA Anne (PU-PH) SARLES/PHILIP Nicole (PU-PH)
BERBIS Philippe (PU-PH) GAUDY/MARQUESTE Caroline (PU-PH) GROB Jean-Jacques (PU-PH) RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)	NGYUEN Karine (MCU-PH) TOGA Caroline (MCU-PH) ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)
<b>DUSI</b>	
COLSON Sébastien (MCF)	
<b>ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5404</b>	
BRUE Thierry (PU-PH) CASTINETTI Frédéric (PU-PH) CUNY Thomas (MCU PH)	<b>GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403</b>
<b>EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION 4601</b>	AGOSTINI Aubert (PU-PH) BOUBLI Léon (PU-PH) BRETTELLE Florence (PU-PH) CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH) COURBIERE Blandine (PU-PH) CRAVELLO Ludovic (PU-PH) D'ERCOLE Claude (PU-PH)
AUQUIER Pascal (PU-PH) BOYER Laurent (PU-PH) GENTILE Stéphanie (PU-PH) <i>SAMBUC Roland (PU-PH) Surnombre</i> THIRION Xavier (PU-PH)	
BERBIS Julie (MCU-PH) LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH) RESSEGUIER Noémie (MCU-PH)	
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section) TANTI-HARDOUIN Nicolas (PRAG)	



IMMUNOLOGIE 4703	HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701
<p>KAPLANSKI Gilles (PU-PH) MEGE Jean-Louis (PU-PH) OLIVE Daniel (PU-PH) VIVIER Eric (PU-PH)</p> <p>FERON François (PR) (69ème section)</p> <p>BOUCAUT Joseph (MCU-PH) CHRETIEN Anne-Sophie (MCU PH) DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH) DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH) ROBERT Philippe (MCU-PH) VELY Frédéric (MCU-PH)</p> <p>BOUCAULT/GARROUSTE Françoise (MCF) 65ème section)</p>	<p>BLAISE Didier (PU-PH) COSTELLO Régis (PU-PH) CHIARONI Jacques (PU-PH) GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH) MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH) VEY Norbert (PU-PH)</p> <p>DEVILLIER Raynier (MCU PH) GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH) LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH) LOOSVELD Marie (MCU-PH) SUCHON Pierre (MCU-PH)</p> <p>POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)</p>
<b>MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503</b>	<b>MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603</b>
<p>BROUQUI Philippe (PU-PH) LAGIER Jean-Christophe (PU-PH) PAROLA Philippe (PU-PH) STEIN Andréas (PU-PH)</p> <p>MILLION Matthieu (MCU-PH)</p>	<p>BARTOLI Christophe (PU-PH) LEONETTI Georges (PU-PH) PELLISSIER-ALICOT Anne-Laure (PU-PH) PIERCECCHI-MARTI Marie-Dominique (PU-PH)</p> <p>TUCHTAN-TORRENTS Lucile (MCU-PH)</p> <p>BERLAND/BENHAIM Caroline (MCF) (1ère section)</p>
<b>MEDECINE D'URGENCE 4805</b>	<b>MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905</b>
<p>KERBAUL François (PU-PH) MICHELET Pierre (PU-PH)</p>	<p>BENSOUSSAN Laurent (PU-PH) VITON Jean-Michel (PU-PH)</p>
<b>MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU VIEILLISSEMENT ; MEDECINE GENERALE ; ADDICTOLOGIE 5301</b>	<b>MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602</b>
<p>BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH) DISDIER Patrick (PU-PH) DURAND Jean-Marc (PU-PH) <i>FRANCES Yves (PU-PH) Surnombre</i> GRANEL/REY Brigitte (PU-PH) HARLE Jean-Robert (PU-PH) ROSSI Pascal (PU-PH) SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH)</p> <p>EBBO Mikael (MCU-PH)</p> <p>GENTILE Gaëtan (MCF Méd. Gén. Temps plein)</p> <p>ADNOT Sébastien (PR associé Méd. Gén. à mi-temps) FILIPPI Simon (PR associé Méd. Gén. à mi-temps)</p> <p>BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps) BONNET Pierre-André (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps) CALVET-MONTREDON Céline (MCF associé Méd. Gén. à temps plein) GUIDA Pierre (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps) JANCZEWSKI Aurélie (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)</p>	<p>LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)</p> <p>BERGE-LEFRANC Jean-Louis (MCU-PH) SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)</p>
<b>NUTRITION 4404</b>	<b>NEPHROLOGIE 5203</b>
<p>DARMON Patrice (PU-PH) RACCAH Denis (PU-PH) VALERO René (PU-PH)</p> <p><i>ATLAN Catherine (MCU-PH) disponibilité</i> BELIARD Sophie (MCU-PH)</p> <p>MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)</p>	<p><i>BERLAND Yvon (PU-PH) Surnombre</i> BRUNET Philippe (PU-PH) BURTEY Stéphanne (PU-PH) DUSSOL Bertrand (PU-PH) JOURDE CHICHE Noémie (PU PH) MOAL Valérie (PU-PH)</p> <p>DUFOUR Henry (PU-PH) FUENTES Stéphane (PU-PH) REGIS Jean (PU-PH) ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH) SCAVARDA Didier (PU-PH)</p> <p>CARRON Romain (MCU PH) GRAILLON Thomas (MCU PH)</p>
<b>ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)</b>	<b>NEUROLOGIE 4901</b>
<p>CHABANNON Christian (PR) (66ème section) SOBOL Hagay (PR) (65ème section)</p>	<p>ATTARIAN Sharham (PU PH) AUDOIN Bertrand (PU-PH) AZULAY Jean-Philippe (PU-PH) CECCALDI Mathieu (PU-PH) EUSEBIO Alexandre (PU-PH) FELICIAN Olivier (PU-PH) PELLETIER Jean (PU-PH)</p>

<b>OPHTALMOLOGIE 5502</b>	<b>PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904</b>
DENIS Danièle (PU-PH) HOFFART Louis (PU-PH) <i>Disponibilité</i> MANTONI Frédéric (PU-PH) <i>Disponibilité</i>	DA FONSECA David (PU-PH) POINSO François (PU-PH)
<b>OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501</b>	<b>PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE - PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803</b>
DESSI Patrick (PU-PH) FAKHRY Nicolas (PU-PH) GIOVANNI Antoine (PU-PH) LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH) MICHEL Justin (PU-PH) NICOLLAS Richard (PU-PH) TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH) DEVEZE Arnaud (MCU-PH) <i>Disponibilité</i> REVIS Joana (MAST) (Orthophonie) (7ème Section)	BLIN Olivier (PU-PH) FAUGERE Gérard (PU-PH) <i>Surnombre</i> MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH) SIMON Nicolas (PU-PH) BOULAMERY Audrey (MCU-PH)
<b>PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502</b>	<b>PHILOSOPHIE 17</b>
RANQUE Stéphane (PU-PH)  CASSAGNE Carole (MCU-PH) L'OLLIVIER Coralie (MCU-PH) MARY Charles (MCU-PH) TOGA Isabelle (MCU-PH)	LE COZ Pierre (PR) (17ème section)  MATHIEU Marion (MAST)
<b>PEDIATRIE 5401</b>	<b>PHYSIOLOGIE 4402</b>
ANDRE Nicolas (PU-PH) CHAMBOST Hervé (PU-PH) DUBUS Jean-Christophe (PU-PH) GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH) MICHEL Gérard (PU-PH) MILH Mathieu (PU-PH) REYNAUD Rachel (PU-PH) SARLES Jacques (PU-PH) TSIMARATOS Michel (PU-PH)  COZE Carole (MCU-PH) FABRE Alexandre (MCU-PH) OVAERT Caroline (MCU-PH) TOSELLO Barthélémy (MCU-PH)	BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH) BREGÉON Fabienne (PU-PH) GABORIT Bénédicte (PU-PH) MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH) TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (PU-PH)  BARTHELEMY Pierre (MCU-PH) BONINI Francesca (MCU-PH) BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH) DADOUN Frédéric (MCU-PH) ( <i>disponibilité</i> ) DELLIAUX Stéphane (MCU-PH) REY Marc (MCU-PH)  RUEL Jérôme (MCF) (69ème section) THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)
<b>PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903</b>	
BAILLY Daniel (PU-PH) LANCON Christophe (PU-PH) NAUDIN Jean (PU-PH)	
<b>PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOLOGIE SOCIALE 16</b>	
AGHABABIAN Valérie (PR)	
<b>RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302</b>	<b>PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101</b>
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH) CHAGNAUD Christophe (PU-PH) CHAUMOTTRE Kathia (PU-PH) GIRARD Nadine (PU-PH) GORINCOUR Guillaume (PU-PH) JACQUIER Alexis (PU-PH) MOULIN Guy (PU-PH) PANUEL Michel (PU-PH) PETIT Philippe (PU-PH) VAROQUAUX Arthur Damien (PU-PH) VIDAL Vincent (PU-PH)	ASTOUL Philippe (PU-PH) BARLESI Fabrice (PU-PH) CHANEZ Pascal (PU-PH) CHARPIN Denis (PU-PH) <i>Surnombre</i> GREILLIER Laurent (PU-PH) REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)  MASCAUX Céline (MCU-PH) TOMASINI Pascale (MCU-PH)
<b>REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802</b>	<b>THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE; ADDICTOLOGIE 4804</b>
GAINNIER Marc (PU-PH) GERBEAUX Patrick (PU-PH) PAPAZIAN Laurent (PU-PH) ROCH Antoine (PU-PH)  HRAIECH Sami (MCU-PH)	AMBROSI Pierre (PU-PH) VILLANI Patrick (PU-PH)  DAUMAS Aurélie (MCU-PH)
<b>RHUMATOLOGIE 5001</b>	<b>UROLOGIE 5204</b>
GUIS Sandrine (PU-PH) LAFFORGUE Pierre (PU-PH) PHAM Thao (PU-PH) ROUDIER Jean (PU-PH)	BASTIDE Cyrille (PU-PH) KARSENTY Gilles (PU-PH) LECHEVALLIER Eric (PU-PH) ROSSI Dominique (PU-PH)

## Remerciements :

**À mon Directeur de thèse, M. le Professeur Marc Garcia,**

Pour avoir dirigé avec rigueur et grande disponibilité ce travail. Ce fut un honneur et un grand réconfort de vous avoir à mes côtés dans la réalisation de cette thèse. Recevez ici l'expression de ma sincère gratitude et de mon profond respect.

**À M. le Professeur François Poinso,**

Vous me faites l'honneur d'accepter la présidence de mon jury de thèse et de m'accorder un temps précieux. Veuillez trouver ici l'expression de ma reconnaissance et de mon profond respect.

**À M. le Professeur David Da Fonseca,**

Vous me faites l'honneur d'accepter de juger ce travail. Soyez assuré de mon profond respect et de ma gratitude.

**À M. le Docteur Gaëtan Gentile,**

Vous me faites l'honneur d'accepter de juger ce travail. Soyez assuré de mon profond respect et de ma gratitude.

**Au Docteur Ariane Molénat,**

Tu m'as offert ma première expérience en pédopsychiatrie, j'ai tant aimé mon premier semestre dans ton service que j'y suis restée ! Ta profonde gentillesse, ta disponibilité, ton écoute, ta générosité et ton sourire indélébile sont des exemples pour moi. Un grand merci d'avoir cru en moi et de m'accueillir dans cette famille.

**Au Docteur Laure Bera,**

Un très grand MERCI pour le temps précieux que tu m'as toujours accordé avec gentillesse et patience ainsi que pour ta relecture et tes conseils dans la réalisation de ce travail. J'admire le médecin que tu es... et ta garde-robe ! ;-)

**Au Docteur Clarence Hà,**

J'ai eu la chance d'apprendre beaucoup à tes côtés, tu m'as toujours fait confiance et pour cela je te remercie. J'espère que nous aurons encore l'occasion de travailler ensemble. Et je peux enfin te l'avouer... je n'aime pas la bière ! ;-)

**Au Docteur Jean Baret,**

Vous m'avez accueilli au sein de votre cabinet du Pontet pour m'apprendre la médecine de ville tout en m'initiant à l'oléiculture et pour cela je vous remercie. Ces six mois passés en votre compagnie ont été merveilleux. Je vous souhaite la plus belle des retraites !

**A toutes les équipes médicales et paramédicales** qui m'ont vu grandir pendant toutes ces années, et tout particulièrement celles du service de gériatrie et d'urgences de l'hôpital d'Orange, du S.M.A, du service de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie de l'hôpital d'Avignon, du service de psychiatrie infanto-juvénile du C.H.U de Nîmes et particulièrement l'hôpital de jour pour adolescents et le C.M.P.E.A est.

Mention spéciale à Audrey. Partager ton bureau durant six mois a été un vrai bonheur, je garde tant de bons souvenirs de notre colocation de bureau ! :-)

A tous mes co-internes, avec qui j'ai tant partagé, nuit et jour, semaine et week-end...

A Marion Bur, Vanessa N'Guyen et Marion Soleirol pour avoir facilité grandement mon recrutement !

Aux adolescents qui ont pris la peine de venir me rencontrer et de me livrer leur expérience. Merci d'avoir permis la concrétisation de ce travail.

Aux rencontres qui ont contribué de près ou de loin à ma réussite.

## **Je dédie ce travail aux personnes qui comptent le plus pour moi :**

A Pierre-Alban, mon mari, mon confident, mon meilleur-ami et le merveilleux père de mes enfants. Merci de toujours croire en moi et à mes idées les plus folles ! De me pousser à réaliser chaque projet et de t'appliquer à donner vie à nos rêves... Je n'aurais pu rêver meilleur allier pour traverser la vie... Je t'aime !

A mes filles, Lila-Rose & Livia et à mon fils, Lucas. Par ces trois matinées de décembre 2012 (à tout jamais mon plus beau cadeau d'anniversaire !), mai 2015 et avril 2017 vous avez changé ma vie. Vous repoussez chaque jour les frontières de ma fierté et je ne me laisserai jamais de vous regarder grandir. N'oubliez jamais à quel point je vous aime ! Maman.

A ma Maman, Maryse, qui nous a quitté beaucoup trop tôt. Merci pour cette enfance baignée d'amour et de douceur. Merci de m'avoir transmis ton courage et ta force pour exercer ce formidable métier. Je sais que de là où tu es, tu es fière de moi.

A mon Papa, Claude, que j'aime plus que tout, pour ta présence au quotidien, tes conseils avisés, ton regard juste, ton soutien à chaque étape de ma vie, et tes relectures ! C'est grâce à toi qu'aujourd'hui je suis là.

A Marion, ma jumelle, mon âme sœur. Quel beau cadeau que de naître à deux ! Merci de m'avoir toujours encouragée et soutenue, tout particulièrement cette année malgré les 19 000 km qui nous séparaient. Merci d'être la meilleure des sœurs et la meilleure des taties !

A Mathieu, mon grand-frère, que j'aime profondément, je te souhaite d'être heureux tout simplement !

A mes grands-parents, mamie Jacqueline, papy Adolphe, mamie Betty, papy Albert, vous avez une place immense dans mon cœur.

A mes tantes, oncles, cousins & cousine.

A toute ma belle-famille, si chère à mon cœur. Marie-Édith, Pierre, Maël, Florian ainsi que l'ensemble de la famille Bellard.

A Yannick, de notre rencontre sur les bancs d'Axone à aujourd'hui, ton amitié a toujours été précieuse !

A Priscilla, Grégory, Charly et Zoé, je vous adore ! Un merci tout particulier à toi Prisci, pour tous tes conseils durant cette année 2019 !

A mes amis : Aline, Marion, Marion, Franck, Thibaut, Rémi, Julien, Jordan. Et à vos minis : Enzo, Maëlle, Charlie, Nathan, Léa (& son futur petit frère). Vous comptez beaucoup pour moi !

À tous ceux que je n'ai pas cités mais auxquels je pense.

*« Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie »*

Albert Camus

*« - Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?  
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..." »*

Le Petit Prince, chapitre XXI, 1943.  
Antoine de Saint-Exupéry

*« L'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres ; rien n'est moins sensé que de vouloir y substituer les nôtres »*

Jean-Jacques Rousseau

# Table des matières

<b>I.</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>GENERALITES .....</b>	<b>3</b>
1.	DEFINITIONS (FIGURE 1) .....	3
2.	L'ADOLESCENCE.....	5
3.	ÉPIDEMIOLOGIE (FIGURE 2) .....	6
4.	ASPECTS CLINIQUES DES CONDUITES SUICIDAIRES .....	7
4.1	Facteurs de risque (Figure 3) .....	7
4.2	Facteurs de protection .....	9
5.	PRISE EN CHARGE DES CONDUITES SUICIDAIRES : RECOMMANDATIONS.....	9
6.	LE MEDECIN GENERALISTE FACE AU RISQUE SUICIDAIRE CHEZ L'ADOLESCENT (FIGURE 4)	10
<b>III.</b>	<b>MATERIEL ET METHODE .....</b>	<b>12</b>
1.	CHOIX DE LA METHODE .....	12
1.1	Étude qualitative .....	12
1.2	Entretien semi-dirigé.....	12
2.	ÉLABORATION DU GUIDE D'ENTRETIEN.....	13
3.	CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON.....	13
4.	REALISATION DES ENTRETIENS.....	14
5.	RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS.....	14
6.	METHODE D'ANALYSE DES DONNEES RECUEILLIES.....	15
7.	CONSIDERATIONS ETHIQUES (ANNEXE 1 ET 2).....	15
<b>IV.</b>	<b>RESULTATS .....</b>	<b>16</b>
1.	DESCRIPTION GENERALE.....	16
2.	ANALYSE THEMATIQUE DES ENTRETIENS .....	16
2.1	La consultation précédant le passage à l'acte suicidaire.....	16
2.2	Perception du médecin généraliste par les adolescents suicidaires .....	18
2.2.1	Un technicien du corps.....	18
2.2.2	Le médecin généraliste et les troubles d'ordre psychologique .....	19
2.3	Les facteurs positifs à une relation médecin généraliste – adolescent de qualité .....	22
2.3.1	Les qualités attendues du médecin généraliste.....	22
2.3.2	Qu'il soit un prescripteur raisonné.....	24
2.3.3	Qu'il s'assure de la continuité des soins.....	25
2.3.4	La salle d'attente.....	25
2.4	Les facteurs négatifs à une relation médecin généraliste – adolescent de qualité .....	25
2.4.1	Attitude du médecin perçue négativement par les adolescents.....	25
2.4.2	Le médecin traitant remplacé.....	26
2.4.3	La place des internes en consultation .....	27
2.4.4	L'attente chez le médecin généraliste.....	27
2.5	Les facteurs neutres à la relation.....	28
2.5.1	Le sexe du médecin généraliste .....	28
2.5.2	L'utilisation du tutoiement ou du vouvoiement .....	28

2.6	La place de l'accompagnant .....	29
2.7	Les bénéfices perçus à la consultation.....	30
2.8	Le secret médical .....	30
2.8.1	La connaissance du secret médical.....	30
2.8.2	L'importance du secret médical.....	31
2.9	Regard d'adolescents sur le suivi conjoint médecin généraliste et pédopsychiatre.....	32
<b>V.</b>	<b>DISCUSSION.....</b>	<b>33</b>
1.	LIMITES DE L'ETUDE.....	33
1.1	Limites liées au sujet de recherche.....	33
1.2	Limites liées à la chercheuse .....	34
2.	FORCES DE L'ETUDE .....	34
3.	ANALYSE DES RESULTATS .....	35
3.1	La consultation précédant le passage à l'acte suicidaire.....	35
3.2	Le rôle du médecin généraliste .....	36
3.3	Les qualités attendues du médecin généraliste.....	37
3.4	Les facteurs perçus négativement par les adolescents .....	37
3.5	Les facteurs neutres.....	38
3.6	L'ancienneté de la relation.....	38
3.7	Les bénéfices perçus à la consultation.....	38
3.8	La place des accompagnants en consultation.....	38
3.9	Le secret médical .....	39
3.10	Perspectives.....	40
<b>VI.</b>	<b>CONCLUSION.....</b>	<b>41</b>
<b>VII.</b>	<b>BIBLIOGRAPHIE .....</b>	<b>42</b>
<b>VIII.</b>	<b>INDEX DES ABREVIATIONS.....</b>	<b>46</b>
<b>IX.</b>	<b>ANNEXES.....</b>	<b>47</b>
	ANNEXE 1 : INSTITUTIONAL REVIEW BOARD (IRB).....	47
	ANNEXE 2 : LETTRE D'INFORMATION ET DE NON-OPPOSITION DESTINEE AU PATIENT.....	48
	ANNEXE 3 : GUIDE D'ENTRETIEN.....	51
<b>X.</b>	<b>SERMENT D'HIPPOCRATE .....</b>	<b>53</b>



## **I. Introduction**

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de 800 000 décès sont attribuables chaque année à un suicide dans le monde [1].

En France Métropolitaine, 8 948 décès par suicide ont été enregistrés en 2015 (soit 25 par jour, contre 9 pour les accidents de la route) [2].

Chez l'adolescent, le suicide reste un problème majeur de santé publique dans notre pays. Il constitue la deuxième cause de mortalité derrière les accidents de la voie publique dans cette tranche d'âge [2].

Dans ce contexte, plusieurs missions de santé publique ont vu le jour ; un programme national d'action contre le suicide a été mis en place entre 2011 et 2014 afin de mieux comprendre, prévenir et prendre en charge ce phénomène. En 2013, la création de l'Observatoire National du Suicide (ONS) est venue consolider et appuyer cette perspective.

Plus récemment, la stratégie nationale de santé a inscrit la santé mentale comme un axe de travail prioritaire, et a présenté ses orientations dans un plan national « priorité prévention ». Une feuille de route « santé mentale et psychiatrie » a été publiée en juin 2018 par la ministre de la santé Agnès Buzyn. Elle précise la déclinaison opérationnelle, dont le premier axe stratégique vise à « promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique, et prévenir le suicide » [3].

Le médecin généraliste, médecin de premier recours, est tout particulièrement impliqué dans le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des troubles psychiatriques et du risque suicidaire. Il est le professionnel de santé le plus fréquemment consulté par les adolescents. 75% des adolescents ont vu un médecin généraliste dans l'année [4]. Il est bien souvent le médecin de la famille dans sa globalité et connaît parfois l'adolescent depuis son plus jeune âge.

Pour autant, il n'est que rarement sollicité par le praticien hospitalier dans le suivi de ces derniers après un passage à l'acte suicidaire (moins de 10% des cas) [5]. Contrairement aux recommandations actuelles visant à placer le médecin généraliste comme pierre angulaire et coordinateur du parcours de soins des patients, on constate qu'il est peu ou pas inclus dans la prise en charge des adolescents après un passage à l'acte suicidaire.

Si la crise suicidaire reste un motif de consultation extrêmement rare en médecine de ville, la majorité des adolescents ont consulté un médecin généraliste dans le mois précédant leur tentative de suicide, dans la majorité des cas pour un motif somatique bénin [6] [7].

Derrière cette réalité quelle demande des adolescents tente de s'exprimer ? Quels sont leurs ressentis, leurs expériences, leurs attentes lors de ces consultations ? Au-delà des difficultés de communication ville-hôpital, l'objectif de ce travail était d'analyser à travers le vécu d'adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire, leurs attentes vis-à-vis du médecin généraliste, en matière de relation et de prise en charge.

## **II. Généralités**

### **1. Définitions (Figure 1)**

L'adolescence, du latin « adolescere » qui signifie l'être qui grandit, constitue une importante période de transition dans le cours du développement humain, et se caractérise par de

nombreuses transformations qui touchent tous les aspects du développement physique et psychique.

L'OMS définit l'**adolescence** comme « la période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, soit entre les âges de 10 et 19 ans ».

L'approche socio-anthropologique décrit l'adolescence avant tout comme un phénomène culturel : elle n'existe ni dans toutes les sociétés ni de tout temps et ne recouvre pas la même réalité au sein d'une même société. Les seuls invariants anthropologiques seraient la sortie de l'enfance et l'entrée dans l'âge adulte. Dans cet entre-deux, le déploiement d'une adolescence dépend de la manière dont la société perçoit le jeune lors de sa maturation sexuelle et régit son entrée progressive dans les responsabilités.

Le **suicide** (du latin *cidium* « meurtre » et *sui* « de soi-même ») est l'acte par lequel une personne se donne volontairement la mort.

La **tentative de suicide** est un comportement visant à se donner la mort, sans y parvenir.

La tentative de suicide est un symptôme, comparable à la nature vague et polysomographique de la fièvre. On peut la rencontrer dans la grande majorité des pathologies psychiatriques : dans les troubles psychotiques, dans tous les troubles de la personnalité, dans les troubles de l'humeur, chez les patients présentant une anorexie mentale, mais aussi chez des sujets ne réunissant pas les critères d'un diagnostic quelconque. Les problématiques familiales ou sociales offrent, elles aussi, un panel varié de profils d'adolescents suicidaires.

On appelle **suicidés** les sujets qui ont réalisé un suicide accompli, c'est-à-dire qui se sont volontairement donné la mort. Alors que les **suicidaires** ont des idées de suicide sans être passés à l'acte, et que les **suicidants** ont mis en acte leurs idées suicidaires sans que cette tentative de se donner la mort n'ait aboutie.

Il faut distinguer les automutilations des tentatives de suicides. Les automutilations consistent à s'infliger volontairement des actes douloureux sans intention de se donner la mort.

La dernière édition du manuel de classification des troubles mentaux de l'Association Américaine de Psychiatrie, le DSM V, publiée en 2013, répertorie les conduites suicidaires comme un trouble individualisé. Jusqu'alors, les tentatives de suicides n'étaient pas considérées comme une catégorie individualisée. C'est toujours le cas pour la classification internationale des maladies (CIM 10) où ni le suicide, ni la tentative de suicide ne sont répertoriés.

*Figure 1 : Critères diagnostiques des conduites suicidaires dans le DSM V*

<u>Critères diagnostiques - DSM V</u>
A- L'individu a fait une TS dans les 24 derniers mois B- L'acte ne remplit pas les critères de conduites auto-agressives non suicidaires, les conduites de scarifications sont exclues C- Le diagnostic ne s'applique pas aux idées suicidaires, ou aux conduites de préparation non abouties D- L'acte n'a pas eu lieu dans un état de confusion ou de délire E- L'acte n'a pas été entrepris uniquement dans un objectif politique ou religieux
<u>Spécifier si :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Actuel</b> : Moins de 12 mois depuis la dernière tentative</li><li>- <b>Début de rémission</b> : 12-24 mois depuis la dernière tentative</li></ul>

## **2. L'adolescence**

Le début de l'adolescence est marqué sur le plan physique par l'apparition des premiers signes pubertaires. L'entrée dans la puberté, est déclenchée par la maturation neuroendocrinienne de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, permettant le développement des caractères sexuels primaires (organes génitaux) et secondaires (seins, pilosité, voix, système musculaire). Les différents stades du développement pubertaire peuvent être cotés de I (stade pré-pubère) à V (stade adulte) selon la classification de Tanner. Le développement pubertaire est associé à une importante accélération de la vitesse de croissance.

Aux différentes transformations physiques s'associent une période de maturation psychologique. Cette période permet notamment la prise de conscience et l'adaptation de l'adolescent aux transformations anatomiques qu'il subit.

Différents travaux se sont penchés sur les transformations cérébrales à l'adolescence.

Le pédopsychiatre américain Jay Giedd, a montré dans ses différents travaux que le cerveau adolescent est le lieu d'une importante maturation au sein du cortex préfrontal, et ce jusqu'à l'âge de 20 à 25 ans [8]. Le cortex préfrontal est le siège des fonctions cérébrales exécutives qui régissent en partie le contrôle de soi, en permettant une adaptation contrôlée du comportement. Elles permettent à un sujet donné de ne pas se comporter de façon mécanique, impulsive ou stéréotypée, mais au contraire d'agir de façon volontaire, adaptée aux besoins de l'individu et aux contraintes de l'environnement. Cette immaturité cérébrale explique en partie certains comportements à risques plus fréquents à l'adolescence. « Tout se passe donc comme s'ils n'avaient pas les freins nécessaires à l'apaisement de leurs émotions » [9].

En parallèle, une réorganisation sociale s'opère. L'adolescent ressent le besoin d'appartenir à un nouveau groupe extérieur à la sphère familiale.

Pour la psychologue Edith Goldbeter-Merinfeld, l'appartenance à ce nouveau groupe contribue à « la construction d'une identité pleine et entière du jeune dans un contexte hors de la loi du père et plutôt groupal » [10].

Pour l'adolescent, le groupe social satisfait son besoin d'identification, de protection, d'exaltation et d'acteur social. Le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott écrira que « les jeunes adolescents sont des isolés rassemblés » [11].

Pour mener à bien son processus d'individualisation, l'adolescent a besoin de pouvoir compter sur une cellule familiale solide et sécurisante. C'est seulement avec un lien d'attachement stable et solide à sa famille qu'il pourra partir explorer de nouveaux attachements.

L'adolescence, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est apparue au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans les pays industrialisés. Auparavant, l'enfant passait sans intermédiaires des jupes de sa mère au monde adulte.

Dans certaines civilisations primitives, le passage de l'enfance à l'âge adulte est toujours marqué par un ensemble de cérémonies et de rites initiatiques permettant à l'enfant d'acquiescer sans transition son statut d'adulte au sein de la société [12].

### **3. Épidémiologie (Figure 2)**

L'entrée dans la puberté est marquée par une « explosion » de la prévalence des tentatives de suicide.

En France, bien qu'il diminue depuis 1990 (- 34% entre 1990 et 2006), le suicide représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Il se situe derrière les accidents de la voie publique. A noter cependant que certains de ces accidents pourraient représenter des équivalents suicidaires.

En France Métropolitaine, 373 décès par suicide ont été enregistrés en 2014 chez les 15-24 ans par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès de l'Inserm (CépiDc-Inserm), dont 281 chez les hommes et 92 chez les femmes. Le suicide représente dans cette tranche d'âge 16,2 % du total des décès, soit 5,0 pour 100 000 habitants tous sexes confondus [2].

En outre, on estime qu'il existe une sous-estimation d'environ 10 % du nombre de suicide en raison des suicides non repérés.

Le sexe ratio est très significatif puisque les garçons sont trois fois plus touchés par le suicide que les filles.

Trois modes de suicide prédominent chez les 15 - 24 ans : la pendaison, les armes à feu et les ingestions médicamenteuses. La pendaison est majoritaire pour les deux sexes, les armes à feu sont plus utilisées dans la population masculine, et l'ingestion médicamenteuse est retrouvée préférentiellement chez les femmes.


Au niveau Européen, il apparaît une grande disparité concernant le taux de suicide chez l'adolescent. La France est parmi les pays Européens ayant un taux élevé de suicide [2].

Cependant, il existe d'importantes disparités au niveau mondial, en matière de définition du suicide et d'exhaustivité des déclarations, qui imposent donc d'interpréter avec prudence ces données.

Des disparités sont également retrouvées à l'intérieur même de la France (figure 1), d'une région à l'autre. La Bretagne présente la position la plus alarmante pour les hommes comme pour les femmes avec un taux standardisé moyen de décès par suicide entre 2012 et 2014

supérieur à 47 % par rapport au taux moyen de France métropolitaine. Concernant la région Occitanie le taux de décès par suicide est relativement bas (inférieur de plus de 14 % au taux moyen de France métropolitaine).

*Figure 2 : Taux standardisés moyens de décès par suicide selon les régions entre 2012 et 2014  
Données INSERM 2014*



L'enquête ESCAPAD menée en France métropolitaine en 2014, a révélé que 2,7% de l'ensemble des jeunes de 17 ans déclaraient avoir fait une tentative de suicide ayant entraîné une hospitalisation, et 10,4% avoir pensé au moins une fois au suicide au cours des douze derniers mois [13].

## **4. Aspects cliniques des conduites suicidaires**

### **4.1 Facteurs de risque (Figure 3)**

Selon l'OMS, un facteur de risque est tout attribut, caractéristique ou exposition d'un sujet qui augmente la probabilité de développer une maladie ou de souffrir d'un traumatisme [14].

Dans le domaine des conduites suicidaires, des facteurs de risque ont été identifiés et sont décrits dans la conférence de consensus de l'HAS sur la crise suicidaire de 2000 [15].

*Figure 3. Facteurs de risque individuels et environnementaux de la dépression et du suicide*

<p><b><u>Les facteurs individuels</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Antécédents suicidaires du sujet</li> <li>❖ Présence ou antécédents de troubles psychiatriques : épisode dépressif majeur, troubles des conduites alimentaires, l'ensemble des troubles internalisés et des troubles externalisés (dont les conduites à risque, les fugues, consommation de toxiques, déscolarisation...)</li> <li>❖ Une pauvre estime de soi</li> <li>❖ Tempérament et style cognitif de l'individu (impulsivité, rigidité de la pensée, colère, agressivité)</li> <li>❖ Antécédents ou existence d'une maladie chronique ou handicapante</li> </ul>
<p><b><u>Les facteurs familiaux</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Présence de violence, d'abus physiques, psychologiques ou sexuels dans la vie de l'individu</li> <li>❖ Existence d'une relation conflictuelle entre les parents et l'individu</li> <li>❖ Pertes et abandons précoces</li> <li>❖ Problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme chez les parents</li> <li>❖ Présence de conflits conjugaux majeurs.</li> <li>❖ Comportement suicidaire de la part de l'un ou des deux parents</li> <li>❖ Problèmes de santé mentale chez l'un ou chez les deux parents</li> </ul>
<p><b><u>Les facteurs psychosociaux</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Présence de difficultés économiques persistantes</li> <li>❖ Isolement social et affectif de l'individu</li> <li>❖ Séparation et perte récente de liens importants, deuil</li> <li>❖ Placement dans un foyer d'accueil, en institution ou dans un centre de détention, traitement discriminatoire</li> <li>❖ Difficultés scolaires ou professionnelles</li> <li>❖ Effet de contagion</li> <li>❖ Difficulté avec la loi</li> <li>❖ Présence de problèmes d'intégration sociale</li> </ul>

Le rôle des troubles psychiatriques demeure au premier plan des facteurs de risque. L'épisode dépressif majeur apparaît comme la première cause de suicide chez l'adolescent, alors même que ce trouble est très présent dans la population adolescente avec une prévalence de 5 à 7 % [16]. Rappelons qu'un antécédent personnel de tentative de suicide est un facteur de risque principal.

Il est à noter que ces différents facteurs de risque ne sont pas indépendants, mais au contraire interagissent les uns avec les autres dans des mécanismes dynamiques et complexes. Le risque suicidaire global n'étant pas la somme des différents facteurs de risque mais une interaction dynamique et complexe des différents facteurs psychopathologiques et socio environnementaux. L'impact de chacun d'eux dépend de la présence ou de l'absence d'autres éléments.

#### **4.2 Facteurs de protection**

Différents facteurs de protection vis-à-vis du risque suicidaire ont été mis en évidence.

***Les stratégies de « coping »*** : le terme « coping » provient de l'anglais « to cope » qui signifie « affronter, faire face ». Le « coping » est le type de réponse produite par un individu face à une situation difficile. Il s'agit de l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux utilisés pour maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d'un individu [17]. Les stratégies de « coping » ont été décrites comme l'un des plus importants facteurs de protection contre le risque suicidaire.

***Une bonne estime de soi*** : l'estime de soi se définit comme l'attribution de traits positifs ou négatifs à sa valeur personnelle. Une bonne estime de soi est un facteur de protection important contre le risque de passage à l'acte suicidaire [18].

***Un environnement familial et social de qualité*** : Le soutien social est d'autant plus important à l'adolescence qu'il s'agit d'une période de la vie durant laquelle la principale tâche développementale est de se distancier de sa famille et d'investir des liens affectifs à l'extérieur du cercle familial [19]. Néanmoins, le soutien familial est reconnu comme un facteur avéré de protection contre les conduites suicidaires.

***Le concept de religiosité et de spiritualité*** : On retrouverait une plus grande proportion de sujets à même d'accepter le suicide et présentant des idéations suicidaires dans une population sans affiliation religieuse. Ainsi, le concept de religiosité et de spiritualité est un facteur de protection contre le développement et la persistance de conduites suicidaires chez les adolescents [20] [21].

### **5. Prise en charge des conduites suicidaires : Recommandations**

Une tentative de suicide chez un adolescent ne doit jamais être banalisée. Ça n'est jamais un acte anodin à mettre sur le compte de la « crise d'adolescence ». A court terme, elle expose au risque de complications somatiques potentiellement létales. A moyen et long terme, le risque principal est la récurrence. Le taux de récurrence chez l'adolescent est majeur la première année suivant une tentative de suicide. Son taux est estimé à 25% [22] [23].

Pour encadrer la prise en charge, des recommandations de bonnes conduites existent [24].

Elles ont été promulguées par l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé (ANAES) en 1998, actuelle Haute Autorité de Santé (HAS), et concernent les jeunes suicidants âgés de 11 à 20 ans.

Elles ont été reprises dans la conférence de consensus de 2000.

On peut les résumer ainsi :

- ❖ L'adolescent suicidant doit bénéficier lors de sa prise en charge d'une triple évaluation : somatique, sociale et psychologique.
- ❖ L'évaluation psychologique par un psychiatre doit être systématique dans les premières 24 heures.
- ❖ L'hospitalisation dans une unité adaptée doit être la règle. Des soins pluridisciplinaires somatiques et psychiques quotidiens doivent être débutés dès le début du séjour hospitalier.
- ❖ Il n'existe pas de consensus concernant la durée du séjour hospitalier. L'expérience montre qu'une semaine est bien souvent nécessaire pour mener l'ensemble de l'évaluation et préparer un projet de sortie.
- ❖ La sortie du suicidant doit être soigneusement préparée. Le suivi avec les intervenants extérieurs : médecin généraliste, psychiatre, psychologue, doit être bien organisé et planifié. Cette préparation est essentielle, elle conditionne la qualité ultérieure du suivi, l'adhésion de l'adolescent aux soins et permet ainsi de diminuer le risque de récurrence suicidaire.

## **6. Le médecin généraliste face au risque suicidaire chez l'adolescent** **(Figure 4)**

Le médecin généraliste a un champ d'action qui englobe l'individu, sa famille et sa communauté. Il assure les soins primaires, associés à des fonctions de continuité et de coordination des soins. En parallèle, il régit une mission essentielle de santé publique en assurant la prévention, l'information, l'éducation et la promotion de la santé de ses patients.

Au sein des disciplines médicales, la médecine générale et la psychiatrie partagent un grand nombre de caractéristiques. Ce sont des disciplines cliniques non centrées sur un organe ou une fonction, mais sur un individu où la relation soignant-soigné est au cœur du métier.

Un acte de médecine générale sur dix comporte un soutien psychothérapeutique comme principale composante [25]. Malgré ces chiffres, la reconnaissance du rôle du médecin généraliste dans la prise en charge de la santé mentale est aujourd'hui encore limitée.

Le médecin généraliste est quotidiennement confronté aux adolescents. Il est souvent le médecin de la famille et connaît parfois l'adolescent depuis son plus jeune âge.

En France, 80% des adolescents consultent au moins une fois par an leur médecin traitant [26], pour un motif essentiellement somatique ou administratif, mais rarement psychologique [27]. Mais les adolescents présentant des conduites à risque consultent significativement plus souvent leur médecin généraliste que les autres [28].

Dans l'étude SOCRATE 1 [29] qui s'intéresse aux adolescents en sortie de consultation chez leur médecin généraliste, seulement 6 à 7% des adolescents consultaient pour un motif psychologique. Parmi ceux consultant pour un motif « non psychologique », 17% évoquaient l'existence d'une problématique psychologique autre que le motif initial de consultation. La majorité d'entre eux (60%) envisageaient d'en parler au cours de la consultation, et 79% de ces derniers l'ont fait.



Concernant l'évolution du ressenti des adolescents lors de la consultation, les résultats rapportent qu'après une seule consultation auprès d'un médecin généraliste, le sentiment de l'adolescent d'être bien dans sa peau, de se sentir compris et écouté progresse significativement [29] [30]. L'impact du médecin généraliste est donc important même si celui-ci sous-estime bien souvent son influence [30].

Le mal être chez l'adolescent s'exprime par des symptômes très variés, dits « de rupture », qui peuvent être somatiques, psychologiques, comportementaux, sociaux ou familiaux. Les prises de risque peuvent entrer dans un processus « normal » de construction de l'adolescent mais leur précocité, leur intensité et leur répétition doivent alerter [31]. Le médecin généraliste a alors un rôle clé dans le dépistage de ces conduites.

De très nombreux travaux de recherche se sont intéressés aux adolescents et ont permis la création de guides [32] et de sites internet [33] facilitant leur prise en charge.

Différents outils d'aide au dépistage du risque suicidaire chez l'adolescent ont également été développés.

L'HAS a recommandé en 2005 et 2014 la réalisation du TSTS CAFARD.

Ce test se basant sur des données de 1999 a depuis été actualisé et simplifié pour devenir le BITS test.

Le BITS test est actuellement le test de référence pour le dépistage des problématiques suicidaires chez l'adolescent. Il cible à la fois les troubles internalisés et les conduites externalisées. Il permet de les dépister chez les jeunes de 13-18 ans en posant 4 questions simples et facilement abordables dans la conversation :

- ❖ As-tu été brimé, maltraité à l'école ? Et en dehors ?
- ❖ As-tu des insomnies ? Et des cauchemars ?
- ❖ Fumes-tu du tabac ? Tous les jours ?
- ❖ Es-tu stressé par le travail scolaire ? Et en famille ?

*Figure 4 : Grille du test BITS*

Thème	1 point	2 points	Score
<b>B</b> rimades	A l'école	Hors de l'école	/ 2
<b>I</b> nsomnies	Fréquentes	Cauchemars	/ 2
<b>T</b> abac	Irrégulier	Quotidien	/ 2
<b>S</b> tress	Scolaire (travail) OU familial	Scolaire (travail) ET familial	/ 2

Un score supérieur ou égal à 3 points doit amener le médecin à questionner l'adolescent sur des idées suicidaires, des actes suicidaires ou des scarifications.

Le BITS test est un outil de soutien à la relation, très facilement réalisable et qui ne nécessite qu'une ou deux minutes. Il permet d'identifier 13 % des adolescents ayant des problématiques suicidaires, (15% parmi les filles, 10% parmi les garçons) dont 2% seulement sont déjà connues du médecin [34] [35].

Durant mes études, j'ai eu la chance de passer une année dans le service de pédopsychiatrie pour adolescents du C.H.U de Nîmes. J'ai ainsi été sensibilisée à la question de la suicidalité chez l'adolescent, son repérage et sa prise en charge. En cabinet de médecine générale, les adolescents suicidaires sont difficile à repérer, ils se murent dans le silence, s'isolent progressivement et ont des difficultés à verbaliser leur souffrance. Différents travaux de recherche montrent que la majorité des adolescents ont consulté un médecin généraliste dans le mois précédant leur tentative de suicide, dans la majorité des cas pour un motif somatique bénin [6] [7]. Pour ces adolescents, la plainte somatique serait alors un moyen détourné, de trouver un espace refuge auprès d'un professionnel de santé, peut-être dans l'espoir conscient ou non d'être démasqués et aidés.

Pour répondre à la question de recherche suivante : « Qu'attendent les adolescents suicidaires de leurs médecins généralistes ? » nous nous sommes fixés pour objectif de recherche, d'analyser à travers le vécu d'adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire, leurs attentes vis-à-vis du médecin généraliste, en matière de relation et de prise en charge.

### **III. Matériel et méthode**

#### **1. Choix de la méthode**

##### **1.1 Étude qualitative**

L'approche qualitative vise à décrire, comprendre, approfondir plus qu'à répertorier les phénomènes observés. Son objectif est de donner sens, de comprendre des phénomènes sociaux et humains complexes, en s'inscrivant dans un paradigme compréhensif, dit aussi interprétatif. Elle permet d'étudier les relations entre plusieurs facteurs, de prendre en considération l'impact du contexte, notamment du contexte social.

La méthode qualitative m'a semblé être l'option la plus appropriée pour appréhender la suicidalité chez l'adolescent dans toute sa complexité individuelle, environnementale et socio-culturelle, et tenter ainsi de répondre à mon objectif de recherche.

##### **1.2 Entretien semi-dirigé**

J'ai choisi de mener des entretiens semi-dirigés, aussi appelés entretiens semi-structurés ou semi-directifs.

La réalisation de focus group ne me semblait pas adapté en raison de la sensibilité du sujet étudié.

L'entretien semi-dirigé a pour principal avantage de laisser l'interrogé répondre librement à différentes questions ouvertes, et ainsi d'aborder des thématiques éventuellement non retenues de prime abord, par l'enquêteur.

L'entretien comme méthode d'enquête a parfois fait l'objet de critiques récusant la validité de ses preuves du fait de la subjectivité des données fournies par l'interlocuteur. D'après le sociologue François Dubet, on peut au contraire « considérer que chaque individu est un acteur capable de discuter de son rapport au monde, et que le chercheur peut atteindre des faits sociaux à travers l'expérience de celui-ci » [36].

## **2. Élaboration du guide d'entretien**

Préalablement aux entretiens, nous avons rédigé une grille de questions ouvertes. Ce canevas d'entretien reprenait la liste des thèmes que nous souhaitions aborder. Pour chacun de ces thèmes, d'éventuelles sous questions de relance permettaient d'aborder les points importants, si le sujet ne les développait pas spontanément. Les différentes questions n'étaient pas développées systématiquement dans le même ordre et, selon les situations, de nouvelles questions pouvaient être posées.

La fonction du guide d'entretien était de soutenir l'entretien sans le figer.

Le guide d'entretien comportait six questions ouvertes. Il a été approuvé par un médecin généraliste et une pédopsychiatre après relecture.

Il abordait les thèmes suivants :

- La description de la consultation précédant leur passage à l'acte suicidaire
- Les éventuels obstacles à se confier à leur médecin généraliste
- Les attentes des adolescents concernant leur médecin généraliste
- La place de l'accompagnant en consultation
- Le secret médical

La première question, peu intrusive, avait pour objectif principal de créer un lien de confiance avec l'interviewé.

Le terme de « passage à l'acte » utilisé durant l'entretien a été expliqué à chaque participant en amont de l'étude.

Le guide d'entretien a été remanié à la suite des deux premiers entretiens « pilotes » en accord avec notre Directeur de thèse. Devant de légères difficultés de compréhension, certaines questions ont été reformulées.

L'ordre des questions a varié en fonction des entretiens.

## **3. Constitution de l'échantillon**

Contrairement à la recherche quantitative, la recherche qualitative ne s'inscrit pas dans la recherche d'une représentativité de l'échantillon au sens statistique du terme.

Notre démarche pour cette étude était d'obtenir un nombre de sujets le plus diversifié possible. Cette approche permet d'obtenir un ensemble de situations contrastées et ainsi d'éclairer différents aspects de la question traitée.

Les adolescents interviewés ont été recrutés parmi les patients pris en charge initialement par le service des urgences pédiatriques du C.H.U de Nîmes.

Les critères d'inclusion à l'étude étaient :

- Les adolescents âgés de 12 à 18 ans au moment du passage à l'acte ;
- Ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire dans les douze mois précédant l'entretien ;
- Ayant un médecin traitant déclaré ;
- Volontaires pour raconter leur histoire ;
- Avec accord du pédopsychiatre traitant pour participer à l'étude.

L'inclusion de nouveaux patients a été interrompue à saturation des données, c'est-à-dire lorsque tout nouvel entretien n'apportait pas de concept nouveau en rapport avec notre question de recherche. Nous avons atteint cette saturation des données au huitième entretien. Deux entretiens supplémentaires ont toutefois été réalisés pour vérifier la saturation des données et la non émergence de nouveaux thèmes.

#### **4. Réalisation des entretiens**

Les entretiens se sont déroulés dans un bureau médical du C.H.U de Nîmes au sein du service de pédopsychiatrie.

Les téléphones étaient coupés pour ne pas risquer de déranger le bon déroulement des entretiens. Pour chaque entretien, nous avons pris le temps de créer un climat serein, bienveillant et détendu propice à l'échange.

Après le recueil des autorisations de participation des adolescents et de leurs parents, et après nous être présentés, nous avons rappelé l'objectif de l'étude, expliqué le déroulement de l'entrevue et rassuré le sujet sur la confidentialité et l'anonymat de ses réponses.

Nous avons utilisé le tutoiement avec l'ensemble des adolescents afin d'éviter une distance entre le sujet et l'investigatrice qui aurait pu limiter nos échanges.

Les entretiens ont été enregistrés à l'aide de l'application « dictaphone » sur un smartphone puis transféré le jour même sur un ordinateur personnel. L'autorisation orale d'enregistrement audio a été demandée à chaque sujet avant le début de l'entretien.

Les différents enregistrements audio ont été détruits à la fin de l'étude.

#### **5. Retranscription des entretiens**

Les entretiens ont été retranscrits manuellement par l'investigatrice sous format numérique en document Word® le jour même de l'enregistrement. Aucune modification ni reformulation du texte n'a été faite à posteriori.

La communication non verbale ; les rires et les silences ont également été retranscrits entre « crochets » dans le texte. Ils permettent au lecteur de saisir au mieux les émotions de l'adolescent suscitées par son récit.

Les prénoms cités ont été remplacés par une simple lettre majuscule afin de préserver l'anonymat.

Les questions et les relances de l'investigatrice ont été retranscrites en bleu et en italique tandis que le récit du sujet apparaissait en caractères normaux.

## **6. Méthode d'analyse des données recueillies**

L'analyse des entretiens a débuté après le premier entretien et s'est poursuivie régulièrement au fur et à mesure des consultations. Elle a été effectuée à partir des *verbatim* retranscrits par l'investigatrice principale uniquement.

Chaque entretien a été d'abord analysé individuellement, phrase après phrase, de façon longitudinale. Ceci a permis d'en isoler les mots et expressions porteurs de sens : les unités de sens.

Afin d'obtenir une analyse la plus riche et exhaustive possible, chaque entretien a été lu à plusieurs reprises.

Les différentes unités de sens ont ensuite été classées en thèmes et sous-thèmes.

Ces thèmes et sous thèmes étaient ensuite hiérarchisés par ordonnancement logique, afin d'effectuer une analyse thématique.

Cette hiérarchisation permettait de donner du sens au phénomène étudié.

Les thèmes communs les plus pertinents ont été développés dans la partie résultats.

Chaque résultat mis en avant a ensuite été illustré par des extraits des *verbatim*.

## **7. Considérations éthiques (Annexe 1 et 2)**

Ce travail de recherche s'inscrivait dans le champ des sciences humaines et sociales et n'impliquait pas la personne humaine selon la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine (dite loi Jardé).

Il ne nécessitait donc pas l'avis d'un comité de protection des personnes.

Le projet de recherche a obtenu l'accord de réalisation du comité d'éthique du C.H.U de Nîmes présenté au mois de juin 2019 (Annexe 1).

Une information claire, loyale et complète, orale et écrite était adressée aux adolescents et à leurs représentants légaux (Annexe 2). Les consentements oraux des participants et de leurs représentants légaux étaient recueillis après une période de réflexion d'un mois.

Le consentement de participation au projet de recherche était simultanément recueilli auprès du pédopsychiatre traitant.

## **IV. Résultats**

### **1. Description générale**

Pour cette étude, 10 adolescents ont été interrogés, neuf filles et un garçon.

Les âges des adolescents s'échelonnaient de 13 à 18 ans, avec une moyenne d'âge de 14 ans et 8 mois.

Les entretiens se sont déroulés du 26 juillet au 19 septembre 2019.

La durée des entretiens a varié de 24 à 32 minutes.

### **2. Analyse thématique des entretiens**

#### **2.1 La consultation précédant le passage à l'acte suicidaire**

**La première partie de l'entretien interrogeait les adolescents sur la dernière consultation précédant leur passage à l'acte suicidaire auprès de leur médecin traitant. Pour une majorité d'adolescents, cette dernière consultation avait eu lieu dans le mois précédant le passage à l'acte suicidaire :**

E2 : « C'était quelques jours avant, je crois »

E3 : « C'était un vendredi, quelques jours avant mon hospitalisation »

E4 : « Je sais plus, il y a un mois à peu près »

E5 : « C'était quelques semaines avant mon passage aux urgences »

E7 : « Franchement, j'sais pas (*Silence*) deux semaines, peut être trois [*avant sa tentative de suicide*]»

E9 : « J'crois que c'était la semaine avant »

E10 : « Y'a un mois j'dirais »

**Parmi les adolescents interrogés, aucun n'était à l'origine de l'initiative de cette consultation. C'est dans la grande majorité des cas leur mère, qui avait sollicité le rendez-vous chez le médecin traitant.**

E2 : « C'est ma mère qui avait pris rendez-vous »

E3 : « J'en ai parlé à maman, comme elle devait y aller pour renouveler son traitement, elle m'a dit : " Du coup tu viens avec moi " »

E5 : « C'est habituellement plus ma mère qui prend rendez-vous pour moi »

E7 : « C'est ma mère qui avait pris le rendez-vous »

E9 : « C'est ma mère qui avait pris le rendez-vous »

**Cette consultation chez leur médecin généraliste était, dans la majorité des cas, motivée par un motif somatique :**

E1 : « Pour une gastro »

E3 : « Parce que mon asthme avait empiré »

E4 : « C'était quand je me suis cassée la cheville »

E5 : « J'y suis allée pour des douleurs du genou »

E10 : « J'y suis allée parce que j'étais malade, j'avais de la fièvre et mal au ventre »

**Pour un des adolescents, le motif de consultation concernait un trouble d'ordre psychologique :**

E9 : « Parce qu'elle était inquiète [...] Elle avait vu mes scarifications et elle pensait que je voulais me suicider »

**Pour un autre, la consultation était en rapport avec des troubles du sommeil :**

E7 : « Parce que j'dormais mal [...] Je m'endormais vers 2 ou 3 heures du matin »

**Pour certains adolescents, il n'a pas été possible de se remémorer les circonstances précises ayant motivé cette consultation précédant leur tentative de suicide :**

E2 : « Je sais plus vraiment pourquoi »

E6 : « (*Silence*) ça fait longtemps (*Silence*) je ne me rappelle pas bien de la dernière consultation (*Silence*) »

E8 : « Je n'y suis pas allée juste avant, j'avais pas envie de parler à ce moment-là, c'était trop installé »

**Parmi les adolescents qui ont consulté pour un motif somatique, plusieurs ont rapporté avoir été en situation de souffrance morale le jour de la consultation :**

E3 : « Pas très bien (*Silence*) j'avais déjà beaucoup d'idées sombres, comme la dernière fois (*Silence*) »

E7 : « Pas très bien (*Silence*) »

E10 : « Pas très bien (*Silence*) c'était compliqué au collège et un peu à la maison aussi »

**Pourtant parmi eux, aucun adolescent n'a rapporté avoir profité de cette consultation pour évoquer des difficultés d'ordre psychologique :**

E2 : « Non, je crois pas »

E3 : « Non »

E4 : « Non, pas vraiment »

E5 : « Non, je ne crois pas »

E10 : « Non, pas vraiment (*Silence*) »

**Pour l'adolescent dont la consultation était motivée par des inquiétudes sur sa santé mentale, l'échange ne s'est pas instauré de façon très productive avec son médecin traitant :**

E9 : « J'avais pas trop envie de lui parler [...] Il m'a demandé si j'avais des idées noires, des problèmes au lycée (*Silence*) il m'a conseillé de ne pas rester seul dans ma chambre, de reprendre rendez-vous avec la psy' »

Dans notre étude, une majorité des adolescents se sont rendus en consultation chez leur médecin généraliste dans le mois précédant le passage à l'acte suicidaire, mais ils n'étaient jamais à l'initiative de cette rencontre. Le motif de la consultation était dans la très grande majorité des cas somatique. Bien que des difficultés d'ordre psychologique étaient présentes au moment de la consultation, aucun adolescent ne les a évoqué. L'adolescent accompagné en consultation au motif d'une souffrance morale n'a pas souhaité se confier à son médecin généraliste lors de cette rencontre.

## **2.2 Perception du médecin généraliste par les adolescents suicidaires**

### **2.2.1 Un technicien du corps**

**Pour une majorité d'adolescents interrogés, le rôle premier du médecin généraliste est de soigner, au sens organique du terme. Le médecin apparaît alors comme un technicien du corps.**



E2 : « Qu'il nous soigne ? »

E3 : « Qu'il me soigne quand je suis malade »

E4 : « Qu'il me soigne quand je suis malade »

E5 : « He bien son métier est de nous soigner lorsque nous sommes malades tout d'abord »

E6 : « Ben, d'habitude je vais le voir quand je suis vraiment malade, ou si j'ai besoin d'un certificat pour le sport »

E7 : « Je vais la voir quand je suis malade »

E8 : « Quand je ne suis pas bien physiquement qu'il trouve comment apaiser mes douleurs »

E9 : « Qu'il me soigne quand je suis malade »

**Au centre de cette rencontre soignant-soigné, l'examen clinique apparaît comme un temps incontournable de la consultation :**

E1 : « Bien sûr [*que c'est important*] le médecin il examine toujours, sinon comment il peut savoir que tout va bien ?

E8 : « Il faut qu'il examine »

E9 : « C'est important qui nous examine, parce que si le médecin nous dit qu'on est en bonne santé, ça nous rassure, donc déjà ça va mieux »

**Mais parfois, un geste médical anodin comme la pesée, peut être un acte particulièrement anxiogène :**

E8 : « Oui, par contre j'aime pas quand il me pèse... mais il est obligé [...] Depuis mon hospitalisation il faut que j'aille chez mon MG me peser une fois par mois [...] Ça ne me dérange pas qu'il voit mon poids, c'est pour moi en fait (*Silence*) je me pèse déjà trop à la maison »

Le médecin généraliste est perçu par les adolescents de notre étude comme un médecin somaticien, utilisant l'examen clinique comme outil principal de sa consultation. Bien que cet examen soit un temps attendu de la consultation par les adolescents, il peut comporter une part anxiogène.

### **2.2.2 Le médecin généraliste et les troubles d'ordre psychologique**

**Lors du rendez-vous ayant précédé leur passage à l'acte suicidaire, la majorité des adolescents ont rapporté ne pas avoir profité de cette consultation pour aborder leurs difficultés psychologiques.**

**Les motifs évoqués étaient multiples, pour certains, le médecin généraliste n'a pas pour mission d'accueillir la souffrance psychique :**

E4 : « Parce que je ne savais pas que ça servait à ça aussi (*Rires*) »

E5 : « De mon côté, ça ne m'est jamais arrivé de penser à ça, mais ça ne me semble pas inadapté »

E6 : « C'est pas son métier je trouve »

**Ce rôle serait plutôt perçu comme celui des psychologues ou des psychiatres :**

E3 : « Ben, j'avais pas très envie d'en parler, et j'ai plus l'habitude de voir mon psy pour parler quand ça ne va pas, parce que c'est leur métier »

E4 : « Je préfère en parler à mon psychiatre »

E7 : « J'avais pas envie de lui en parler, je me sens pas à l'aise avec elle [...] C'est pas trop son métier, elle est pas psy' »

**Plusieurs adolescents verbalisent ne pas avoir recherché d'aide en amont de leur passage à l'acte :**

E1 : « Je ne sais pas (*Silence*) j'y ai pas pensé [...] Avant [*sa tentative de suicide*] j'étais vraiment "dans mon truc" j'y ai pas pensé. Je cherchais pas vraiment de solution »

E8 : « Je n'y suis pas allée juste avant, j'avais pas envie de parler à ce moment-là, c'était trop installé »

**Pour une des adolescentes, ce serait au médecin de créer l'opportunité de se confier en questionnant son patient :**

E10 : « Ca s'est pas présenté, j'étais pas très bien ce jour-là et elle ne m'a pas posé de question particulière »

**Lorsqu'ils font face à des difficultés d'ordre psychologique, les adolescents déclarent se tourner vers leurs amis :**

E3 : « Mes amis surtout »

E8 : « Je suis sortie dans mon village et j'espérais croiser des copines [...] elles auraient pu m'aider à aller mieux »

E10 : « J'en ai parlé à ma meilleure amie »

**Ou bien vers un adulte en qui ils ont confiance :**

E1 : « Je suis allée voir la conseillère conjugale de ma mère [...] je la connais depuis longtemps, je me sens à l'aise avec elle »

**Ou encore un professionnel de santé repéré comme compétent dans cette tâche :**

E1 : « Mais si j'avais dû voir un médecin, je serais plutôt allée voir le Pr Tran [...] je le connais depuis longtemps, il me suit depuis mes six ans pour une maladie rare. J'ai confiance en lui, il me connaît bien, il connaît ma famille »

E6 : « De l'infirmière du lycée, d'une psychologue ou d'un psychiatre »

Dans notre étude, une partie des adolescents n'ont pas recherché d'aide extérieure en amont de leur tentative de suicide, le suicide apparaissait pour ces patients comme une issue inévitable.

D'autres adolescents ont recherché une aide extérieure auprès d'amis, d'un adulte en qui ils ont confiance ou d'un professionnel de santé décrit comme spécifique dans cette fonction comme un psychologue ou un pédo-psychiatre.

**Toutefois pour certains adolescents, le médecin généraliste représente une personne ressource et est perçu comme un interlocuteur de choix face à des difficultés d'ordre psychologique :**

E3 : « Je préférerais le voir lui pour changer ou renouveler mon traitement plutôt que les pédopsychiatres [...] parce qu'il me connaît depuis longtemps et c'est plus facile de me confier à lui. Quand je me suis faite harcelée au collège je suis de suite allée le voir et il m'a rassuré et il a trouvé des solutions »

E8 : « La plupart du temps, j'ai besoin d'une ordonnance, pour un test de grossesse ou autre et j'en profite pour me confier »

E10 : « On discute de choses et d'autres. Quand elle me pose des questions je lui réponds, du coup elle sait quand même beaucoup de choses [...] c'est aussi ma santé, donc c'est normal qu'elle sache des choses »

**Les adolescents évoquent une plus grande confiance et une facilité à se confier à leur médecin traitant s'il est connu depuis la petite enfance :**

E1 : « [*Le médecin généraliste*] d'avant il me suivait depuis que j'étais toute petite. J'y allais très souvent, parfois juste pour lui parler parce qu'il était à l'écoute. C'était comme un deuxième papa, il m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles. »

E3 : « Parce qu'il me connaît depuis longtemps et c'est plus facile de me confier à lui. Quand je me suis faite harcelée au collège je suis de suite allée le voir et il m'a rassuré et il a trouvé des solutions »

E5 : « Mon médecin actuel est plus distant, j'étais plus à l'aise avec celui qui me suivait avant, il me connaissait depuis que j'étais petite. Celui-ci je ne le connais pas trop, il ne me connaît pas trop (*Silence*) c'est plus compliqué (*Silence*) »

E10 : « Je la connais depuis longtemps, je lui fais confiance »

Pour plusieurs adolescents rencontrés, leur médecin généraliste représente une personne ressource en situation de difficultés d'ordre psychologique. L'ancienneté de la relation est un facteur important dans la confiance qu'ils accordent à leur médecin traitant. Dans notre étude, un médecin généraliste connu depuis la petite enfance est toujours identifié comme une personne ressource.

### **En consultation de routine, lorsque leur médecin généraliste questionne spontanément les adolescents sur leur bien-être, ces derniers ne rapportent pas s'en trouver gênés :**

E3 : « Oui (*Silence*) ça me dérange pas (*Silence*) mon médecin il me demande souvent comment je vais sur le plan du moral, il reçoit les lettres de l'hôpital alors il sait que ça ne va pas toujours »

E9 : « Le mien quand je le vois on discute aussi, il me pose des questions, c'est parce qu'il me connaît depuis longtemps, il connaît toute ma famille

E10 : « Quand elle me pose des questions je lui répond, du coup elle sait quand même beaucoup de choses »

## **2.3 Les facteurs positifs à une relation médecin généraliste – adolescent de qualité**

### **2.3.1 Les qualités attendues du médecin généraliste**

**Les adolescents rapportent attendre de leur médecin généraliste un ensemble de qualités humaines qu'ils jugent nécessaires à une relation de qualité :**

#### **- L'empathie ou l'écoute non jugeante :**

E1 : « Qu'il soit à l'écoute, ça c'est important »

E4 : « Qu'il écoute vraiment ce que je lui dis »

E6 : « Alors déjà qu'il m'écoute, qu'il soit à l'écoute »

E8 : « qu'il soit à l'écoute »

E9 : « Il me regarde, il m'écoute »

E10 : « Qu'elle m'écoute »

**- La bienveillance :**

E3 : « Qu'il soit gentil »

E7 : « Calme, gentille, patiente »

E9 : « Il est gentil »

E10 : « Souriante, gentille, jeune »

**- La douceur :**

E1 : « Il faut qu'il parle doucement, calmement »

E7 : « Calme, gentille, patiente »

**- De la considération pour son interlocuteur :**

E6 : « Qu'il me prenne au sérieux dans ce que je dis [...] qu'il me parle comme à une adulte, pas comme à une enfant. Qu'il ne parle pas toujours à mes parents mais plutôt à moi »

E9 : « Il me prend au sérieux quoi »

E10 : « Qu'elle se souvienne des maladies ou de ce que j'ai pu lui raconter à d'autres consultations »

**- Des capacités de communication :**

E3 : « Qu'il me parle »

E10 : « Elle m'explique ce que j'ai [...] ça rassure, parfois les médecins on leur parle pendant dix minutes mais eux ne nous disent rien alors finalement on comprend pas toujours ce qu'on a »

**- Des capacités d'analyse :**

E1 : « Qu'il analyse les choses et qu'il nous les explique ensuite »

E6 : « Si je lui parle d'un problème, qu'il arrive à cerner ce que j'ai »

### **- Un rôle de conseiller :**

E1 : « Qu'il nous donne des conseils »

E4 : « Qu'il écoute vraiment ce que je lui dis pour ensuite me conseiller au mieux »

### **- L'utilisation de l'humour :**

E1 : « Il essaye de me mettre à l'aise, tout ça, de me faire rigoler »

E3 : « Qu'il me fasse sourire »

E8 : « Qu'il rigole aussi, qu'il fasse de l'humour, ça détend pendant la consultation »

### **- Qu'il prenne le temps :**

E3 : « Qu'il prenne le temps (*Silence*) pas trop de temps pour ne pas gêner les autres personnes qui attendent mais un peu quand même »

E5 : « Ensuite, bon c'est un médecin, il n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais le temps qu'on puisse bien discuter, échanger tous les deux, une bonne demi-heure ça me semble adapté. Donc s'il va trop vite, j'aurais l'impression qu'il ne s'intéresse pas vraiment à ma situation (*Silence*) »

E6 : « Ben la durée de la consultation aussi c'est important (*Silence*) si j'ai beaucoup de chose à lui dire et qu'il se dépêche, je vais pas me sentir écoutée »

E7 : « Moi j'aime pas quand ils sont pressés, j'ai l'impression de les déranger [...] disons que j'ai l'impression qu'il va vite pour que je sorte, comme si ça l'intéressait pas c'que j'dis »

Pour faciliter le dialogue des adolescents sur leurs difficultés d'ordre psychologique, le médecin généraliste doit adopter une attitude d'écoute bienveillante et sans jugement. Les adolescents sont sensibles au temps que leur médecin traitant leur consacre car ils ont conscience de sa charge de travail.

### **2.3.2 Qu'il soit un prescripteur raisonné**

#### **Une adolescente évoque attendre de son médecin généraliste l'utilisation raisonnée des thérapeutiques médicamenteuses :**

E8 : « Qu'il trouve des solutions autre que des médicaments [...] des exercices de respiration, parfois mon médecin il me prescrit des médicaments mais il me demande d'abord d'essayer des exercices de relaxation pendant deux jours [...] ou des choses plus saines, à base de plantes »

### **2.3.3 Qu'il s'assure de la continuité des soins**

**Deux adolescents rapportent apprécier lorsque leur médecin généraliste sollicite spontanément un prochain rendez-vous en fonction de ce qui a pu être échangé en consultation :**

E6 : « Si pendant la consultation je lui ai dit des choses importantes j'aime bien qu'il me dise qu'il veut me revoir [...] ça me donne l'impression qu'il est là, qu'il est présent, qu'il s'en fiche pas de ce que je lui ai raconté »

E9 : « il a voulu me revoir quelques jours après [...] j'ai trouvé ça bien, j'ai senti qu'il se préoccupait vraiment de moi, de ma situation. Je me suis senti écouté, soutenu »

**Pour une adolescente, le rôle du médecin généraliste est d'orienter vers un spécialiste en fin de consultation lorsque des difficultés psychologiques ont été exprimées :**

E5 : « Ensuite, en fin de consultation si je me suis confiée sur des problèmes personnels, j'aimerais qu'il me redirige vers un psychologue adapté ou un psychiatre »

Lorsqu'un adolescent rapporte des difficultés d'ordre psychologique à son médecin généraliste, il apprécie qu'un rendez-vous ultérieur soit programmé par ce dernier, auprès de lui-même, d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue.

### **2.3.4 La salle d'attente**

**Pour une adolescente, la salle d'attente est un élément important de la consultation :**

E1 : « La salle d'attente c'est important, il faut que ça donne envie d'attendre (*Rires*) [...] il faut que ça soit grand, pour pas qu'on soit serré, des coins pour s'asseoir, avec des livres et des magazines, les deux ! »

## **2.4 Les facteurs négatifs à une relation médecin généraliste – adolescent de qualité**

### **2.4.1 Attitude du médecin perçue négativement par les adolescents**

**Lors des entretiens, j'ai demandé aux adolescents d'imaginer la pire consultation possible chez leur médecin généraliste.**

**Différentes caractéristiques, perçues comme péjoratives ont été décrites :**

- **Une attitude « pressante » de la part de leur médecin généraliste :**

E1 : « "- Vous avez quoi ? – Ca, ça, ça, ok ! Je vous mets ça et au revoir !" Sans t'examiner, prendre le temps de te parler, de prendre le temps. [...] c'est serré parce qu'il a beaucoup de patients mais au moins prendre un petit peu le temps »

E4 : « Qu'il aille vite, qu'il fasse pas attention à ce que je raconte, qu'il me regarde pas, qu'il fasse que taper sur son clavier (*Silence*) »

E10 : « Elle m'examinera genre "vite fait bien fait" »

- **Une distance trop importante dans la relation :**

E5 : « Alors c'est évident, mais il serait froid, distant »

E6 : « Qu'il ne me regarde pas »

E10 : « Elle serait désagréable, elle me regarderait pas »

- **Un manque de confiance du médecin envers son patient :**

E6 : « Alors que je lui dise des choses et qu'il ne me croit pas, qu'il contredise mes paroles »

- **Du jugement :**

E5 : « Ensuite, si je sens un peu dans son regard qu'il y a du jugement, ça va beaucoup me déranger, ça me bloque quoi »

E8 : « Qu'il me juge aussi, quand je lui parle de mes scarifications par exemple »

- **Un manque de considération du médecin envers son patient adolescent :**

E10 : « Elle discuterait qu'avec ma mère »

### **2.4.2 Le médecin traitant remplacé**

**Pour la totalité des adolescents, une consultation auprès d'un médecin généraliste remplaçant leur médecin habituel n'est pas propice aux confidences. Le patient adolescent se sentira alors moins à l'aise pour aborder des problématiques personnelles :**

E1 : « C'est pas la même chose, c'est pas celui que je connais, je vais pas être à l'aise comme si j'étais avec mon médecin »

E3 : « Comme je le connais pas, c'est pas pareil, je peux pas lui parler (*Silence*) c'est gênant »

E6 : « Ben c'était pas très grave mais j'étais quand même moins à l'aise qu'avec mon docteur habituel. Surtout quand il m'a examiné »



E8 : « Si c'était un remplaçant je n'irais pas le voir de toute façon, c'est pas pareil, il ne me connaît pas [...] on ne se connaît pas, je m'vois pas lui raconter ma vie »

E9 : « Ben ça reste un médecin mais on s'connait pas donc c'est sûr on discute pas trop »

E10 : « C'est pas pareil parce que je la connais moins mais je l'aime bien aussi, ça me dérange pas de la voir elle »

### **2.4.3 La place des internes en consultation**

**Pour les adolescents ayant été confronté à la présence d'un interne lors d'une consultation chez leur médecin généraliste, ce second interlocuteur entrave la qualité de la consultation.**

E4 : « C'est plus difficile, ça me dérange, ils sont trois adultes, c'est trop. Quand c'est comme ça, je parle pas, je réponds pas à toutes les questions, juste à celles pas importantes. Ça me stresse quand je le vois écrire celui à côté »

**Une adolescente rapporte avoir le sentiment d'être reléguée au second plan de la consultation, le rôle de « formateur » du médecin étant alors au premier plan :**

E1 : « C'est pas du tout pareil avec eux [*les internes*], le médecin il est plus occupé à expliquer à la personne, il n'a pas trop trop de temps pour moi »

**Malgré tout, si une relation de confiance existe entre elle et son médecin traitant, la présence de l'interne ne gênera pas le fond de la consultation :**

E1 : « C'est un petit peu plus compliqué mais si le médecin je le connais depuis longtemps, je reste à l'aise »

<p>La relation qu'entretient un adolescent avec son médecin généraliste est unique et non transposable. Ainsi, lorsque ce dernier se trouve remplacé par un autre médecin, l'adolescent en manque de confiance dans la relation se trouvera en difficulté pour se confier sur ses difficultés d'ordre psychologique. Il en est de même lorsqu'un interne assiste le médecin traitant.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **2.4.4 L'attente chez le médecin généraliste**

**Dans leur réflexion autour de la « pire consultation imaginable », certains adolescents ont abordé la question des retards chez leur médecin :**

E8 : « Alors il y aurait 4 heures d'attente (*Rires*) »

E9 : « Alors déjà j'attends pas en salle d'attente »

**Un temps d'attente régulièrement trop long n'incite pas les adolescents à se rendre en consultation chez leur médecin traitant :**

E8 : « Ben parfois j'aimerais aller le voir pour lui parler de quelque chose, mais j'y vais pas parce que je sais que je vais attendre très longtemps »

**2.5 Les facteurs neutres à la relation**

Différents facteurs ont été décrits comme des caractéristiques sans importances pour les adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire :

**2.5.1 Le sexe du médecin généraliste**

**Les adolescents interrogés n'attachent que peu d'importance au sexe de leur médecin généraliste :**

E2 : « Non, homme ou femme, peu importe »

E4 : « Non, ça reste un médecin, tant qu'il est gentil et à l'écoute c'est tout ce qui compte »

E6 : « Non, c'est pareil »

E8 : « Non, c'est pareil »

E9 : « Non, ça reste un médecin, c'est pareil »

**2.5.2 L'utilisation du tutoiement ou du vouvoiement**

**De même, l'utilisation du tutoiement ou du vouvoiement influence peu la qualité de la consultation d'après les adolescents interrogés :**

E3 : « Le mien il me tutoie je crois, mais c'est pas très important »

E5 : « Qu'il me vouvoie ou me tutoie c'est un peu la même chose »

E9 : « Ca m'est égal, dans les deux cas je me sentirai à l'aise »

Les adolescents de notre étude n'accordent aucune importance au sexe de leur médecin généraliste ainsi qu'à l'utilisation par ce dernier du tutoiement ou du vouvoiement pour s'adresser à eux.

## **2.6 La place de l'accompagnant**

**Les adolescents interrogés, rapportent majoritairement préférer se trouver seul en consultation auprès de leur médecin généraliste. Cette relation duelle favorise le libre-échange et les confidences envers leur médecin. L'abord de sujet plus personnel s'en trouve facilité :**

E1 : « S'il y a maman je vais me retenir de parler. Si elle n'est pas là je vais me lâcher (*Rires*) »

E4 : « Ca me dérange, je préfère être seule, j'arrive pas à parler quand il y a quelqu'un »

E6 : « Ben ça dépend [...] de pourquoi il vient [...] par exemple si je veux lui demander la pilule ça va m gêner qu'il y ait ma mère »

**Pour certains adolescents, le contenu de la consultation peut être complètement modifié par la présence ou non d'un accompagnant :**

E6 : « Si y'a ma mère, je dis rien »

**Pour certains adolescents, la peur de blesser leur accompagnant peut être un frein à la confiance :**

E4 : « J'étais plus à l'aise, j'avais peur de faire de la peine à ma famille d'accueil (*Silence*) [...] je voulais pas qu'ils pensent que j'ai essayé de me suicider parce que je suis chez eux (*Silence*) je les aime bien, c'est pas eux le problème mais la situation, ne plus voir ma mère, tout ça (*Silence*) »

E9 : « C'était bien, je voulais pas lui faire de peine ou qu'elle s'inquiète trop [*sa maman*] »

**En présence d'un parent, certains adolescents se sentent reléguer au second plan de la consultation :**

E5 : « J'aime qu'elle m'accompagne, mais ensuite quand je suis dans son cabinet c'est quand même mieux si je suis seule. J'ai remarqué que quand ma mère est présente durant la consultation, le médecin et elles parlent beaucoup ensemble et parfois je me sens un peu mise à l'écart »

**Deux adolescents préfèrent toutefois être accompagnés :**

E2 : « Je préfère qu'elle reste [*sa maman*] »

E3 : « Je préfère qu'elle soit là [*sa maman*], ça me dérange pas »

**Les adolescents expriment très majoritairement préférer que ce soit le médecin qui demande à l'accompagnant de sortir :**

E4 : « je préfère que ça soit le médecin qui le fasse »

E5 : « Je préfère que ça soit le médecin qui demande à me voir seule »

### **C'est inconfortable pour les adolescents de le demander eux-mêmes :**

E1 : « Je ne vais pas oser lui demander de sortir, je vais peut-être lui faire des regards (*Rires*) »

## **2.7 Les bénéfices perçus à la consultation**

### **Plusieurs adolescents rapportent ressentir des bénéfices immédiats en sortie de consultation chez leur médecin généraliste :**

E2 : « Ca m'a fait du bien [*d'échanger à propos de mutilations auto-infligées*], d'habitude personne ne m'en parle (*Silence*) »

E3 : « Quand je suis sortie de sa pièce je me sentais plus légère »

E8 : « Bien, ça m'apaise de lui parler, il me connaît depuis longtemps »

E9 : « Bien, des fois juste de parler d'un truc ça libère »

## **2.8 Le secret médical**

### **2.8.1 La connaissance du secret médical**

#### **Les adolescents interrogés ont une définition plus ou moins précise du secret médical :**

E1 : « C'est par exemple si je dis quelque chose à un médecin, il va le garder pour lui »

E3 : « Oui, c'est quand je dis quelque chose à un médecin, il est obligé de le garder pour lui, il n'a pas le droit d'en parler à mes parents ou à une autre personne »

E4 : « On peut se confier et ils le disent pas c'est ça ? »

E5 : « Oui, oui, oui, c'est la clause de confidentialité qui existe entre moi et un médecin [...] ça n'est pas sensé sortir de la pièce de consultation »

E6 : « Alors, le secret médical c'est quand on parle de certaines choses à un adulte, il ne doit pas le répéter »

E7 : « Ben c'est quand on dit quelque chose à un médecin il n'a pas le droit de le répéter »

E10 : « C'est une règle, les médecins ils doivent garder secret tout ce que le patient lui dit »

**Certains adolescents évoquent l'existence d'une loi régissant le secret médical :**

E9 : « Oui, c'est une loi qui interdit aux médecins de répéter ce qu'on leur dit »

**Une adolescente a déclaré que le secret médical appartenait au cadre déontologique du médecin, ce dernier ayant prêté serment :**

E10 : « C'est un truc déontologique, c'est lié au serment d'Hippocrate je crois »

**Pour une adolescente seulement, le secret médical n'était pas une notion connue :**

E2 : « Non, c'est quoi ? »

**Pour plusieurs adolescents, la notion de levée du secret médical en fonction de la gravité des faits est connue :**

E1 : « Mais si c'est quelque chose de grave, il va peut-être demander des conseils à d'autres médecins pour savoir s'il faut le dire ou pas »

E3 : « Sauf si c'est quelque chose qui me met en danger »

E5 : « A part si c'est quelque chose de dangereux pour moi ou de dangereux pour les autres »

**Certains médecins réaffirment l'existence du secret médical lors de la consultation :**

E9 : « Oui, mon médecin il le dit souvent : "Tu peux m'en parler, ça restera entre nous" »

**2.8.2 L'importance du secret médical**

**Pour les adolescents, le secret médical a une grande importance dans la relation à leur médecin traitant.**

**Elle permet de les rassurer :**

E1 : « Ca me rassure »

**Plusieurs adolescents rapportent que l'assurance d'une confidentialité durant la consultation majore la confiance qu'ils accordent à leur médecin généraliste :**

E2 : « Ca peut être utile, surtout pour se sentir en confiance avec le médecin »

E5 : « Oui ! Je pense que oui ! (*Rires*) ça me permet d'être plus en confiance en fait »

E10 : « Ça me permet de répondre plus honnêtement au médecin quand elle me pose des questions. Par exemple, si elle me demande si j'ai déjà bu de l'alcool ou autre, je peux lui faire confiance, je sais qu'elle ne le répètera pas »

**Pour deux adolescentes, le secret médical favorise la confiance :**

E6 : « Oui, très important, sinon on ne répondrait pas à ses questions de la même façon, c'est sûr »

E9 : « C'est utile, disons que si ça existait pas on se confierait pas forcément à notre médecin, on lui dirait pas tout, on aurait peur que certaines choses soient répétées ou sortent du bureau du médecin »

**Pour autant l'existence du secret médical n'est pas le seul élément permettant aux adolescents de se confier à leur médecin :**

E4 : « Oui, c'est important, c'est sûr, mais il faut quand même être en confiance à la base avec son médecin, le secret médical ça fait pas tout »

E7 : « Oui mais ça fait pas tout [...] si j'ai pas envie de me confier à ce médecin, même si je sais qu'il existe le secret médical ça change rien, j'aurais pas envie de parler quand même »

**Parallèlement, certains adolescents rapportent douter parfois du respect du secret médical par certains médecins :**

E1 : « Mais j'espère que vraiment il garde le secret »

E3 : « Quand je connais pas trop le médecin, je suis jamais sûre (*Silence*) »

E3 : « Oui, mais il faut avoir confiance en son médecin pour être sûr qu'il le respecte bien ! »

Recevoir les adolescents seuls en consultation, après en avoir fait la demande à leur accompagnant, et leur rappeler systématiquement leur droit au secret médical, permettra de créer un climat propice aux confidences où les adolescents en situation de souffrance psychologique pourront, s'ils le souhaitent, se livrer sur leurs difficultés.

**2.9 Regard d'adolescents sur le suivi conjoint médecin généraliste et pédopsychiatre**

**Dans le cadre d'un suivi conjoint médecin généraliste et pédopsychiatre dans les suites d'une tentative de suicide, certains adolescents scindent totalement les rôles des différents intervenants. Le médecin généraliste est alors le médecin du corps et le pédopsychiatre celui de l'esprit :**

E5 : « Ensuite, en fin de consultation si je me suis confiée sur des problèmes personnels, j'aimerais qu'il me redirige vers un psychologue adapté ou un psychiatre »

E7 : « Ben, c'est pas trop son métier, elle est pas psy' »

**A contrario, d'autres adolescents rapportent se livrer avec plus d'honnêteté à leur médecin généraliste car l'enjeu y est différent :**

E8 : « Mon médecin quand je vais le voir je peux lui parler librement. J'ai pas peur qu'il m'hospitalise (*Silence*) alors qu'à l'hôpital, je ne dis pas tout parce que je sais que sinon ils vont m'hospitaliser [...] pour mon médecin la solution c'est pas l'hospitalisation, il va essayer de m'aider autrement, je lui confie plus facilement des choses »

Les adolescents suivis conjointement par leur médecin traitant et un pédopsychiatre attribuent à chacun des rôles propres et distincts. Bien que le médecin généraliste soit très souvent identifié comme un médecin somaticien, certains adolescents se confient à lui avec plus d'honnêteté car les enjeux y sont différents.

## **V. Discussion**

### **1. Limites de l'étude**

#### **1.1 Limites liées au sujet de recherche**

Ce travail de recherche revenait sur un sujet particulièrement sensible de l'histoire de vie des adolescents : leur tentative de suicide.

Pour certains adolescents interrogés, il a pu être particulièrement difficile d'aborder ce sujet-là avec une personne inconnue, par pudeur ou par tabou.

Dans ce contexte, il existe donc un risque de biais déclaratif.

Le recrutement des adolescents s'est révélé particulièrement difficile. J'ai essuyé de nombreux refus. Le sujet particulièrement intime et sensible de l'étude était probablement un frein à l'acceptation par les adolescents de participer à l'étude. Les autres freins potentiels concernent la période estivale de réalisation des entretiens où une baisse de l'activité est classiquement observée en pédopsychiatrie, et la structure hospitalière où se déroulaient les entretiens dont peu d'adolescents « raffolent ».

Nous avons recruté nos participants au sein du C.H.U de Nîmes, parmi les adolescents pris en charge initialement dans le service d'urgences pédiatriques pour une tentative de suicide.

En recrutant des adolescents dans différents services d'urgences pédiatriques de différents hôpitaux, j'aurais contribué à améliorer la validité externe de l'étude. Mais cela était difficilement réalisable en pratique.

Certaines situations évoquées durant les entretiens étaient des situations du passé pouvant donc entraîner un biais de mémorisation sur les données récoltées.

## **1.2 Limites liées à la chercheuse**

Cette étude est le premier travail de recherche qualitative que je réalise. Je n'avais auparavant aucune expérience dans la conduite d'entretiens semi-directifs.

Malgré la rigueur méthodologique que je me suis appliquée à suivre, cela a pu entraîner un biais de méthode ou d'intervention.

Afin de limiter ce risque, j'ai effectué un travail de recherche et de lecture approfondi sur la conduite et l'analyse des résultats en recherche qualitative [40] [41] [42].

J'ai aussi bénéficié de l'aide de mon directeur de thèse, le Pr. Marc GARCIA, très expérimenté en matière de recherche qualitative.

Durant le déroulement des entretiens, malgré mon application pour demeurer la plus neutre possible dans mon attitude et dans la formulation de mes propos, il est difficile d'affirmer que je n'ai pas influencé de quelque manière que ce soit les réponses de certains des interviewés.

Afin de limiter le biais d'interprétation des données, j'ai été la plus rigoureuse possible dans mon recueil de données, en enregistrant numériquement les entretiens et dans la retranscription des entretiens en *verbatim*. J'ai inclus les silences et les rires afin de mieux saisir l'état émotionnel du sujet.

L'annotation des expressions non verbales durant les entretiens aurait permis de réduire d'avantage le biais d'interprétation des données.

Pour se faire, il aurait fallu être deux interviewers : un premier qui anime l'entretien, en posant les questions et en effectuant les relances, et un second, responsable de l'enregistrement audio et notant les aspects non verbaux des entretiens. J'ai fait le choix de ne pas ajouter de second interviewer durant les entretiens afin de prioriser les confidences et la qualité des échanges en relation duelle.

Une double analyse des entretiens par deux chercheurs différents aurait permis par triangulation, d'augmenter la validité interne de l'étude.

## **2. Forces de l'étude**

La principale force de notre étude est liée à l'originalité de son sujet. En effet différents travaux se sont intéressés aux difficultés rencontrées lors d'une consultation adolescent – médecin généraliste : « Étude qualitative, auprès des lycéens de la Somme, des difficultés rencontrées lors d'une consultation en médecine générale » [37] « Attentes et vécu des adolescents au décours d'une consultation de médecine générale » [38]. Une autre thèse a analysé « La prise en charge du risque suicidaire de l'adolescent en cabinet de médecine générale : Vécus et représentations des médecins généralistes. Étude qualitative auprès de médecins généralistes de la région Rouen Elbeuf » [39]. Mais aucun travail de recherche en soins primaires, ne s'était interrogé sur les attentes des adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire concernant leur relation à leur médecin généraliste.

C'est pourquoi notre étude est intéressante pour la pratique professionnelle des médecins généralistes.



Le choix de réaliser une étude qualitative nous a permis d'atteindre notre objectif principal, en interrogeant les expériences et les ressentis des adolescents, nous avons pu répondre à notre question de recherche.

L'élaboration du guide d'entretien avec l'aide de mon directeur de thèse et la relecture de celui-ci par une pédopsychiatre du C.H.U de Nîmes, sa modification après les deux premiers entretiens, et l'accord de participation demandé à chaque pédopsychiatre traitant, a permis d'augmenter par la qualité méthodologique, la validité interne de l'étude.

Le choix de réaliser des entretiens semi-dirigés a permis une promiscuité, une approche intime dans la relation. L'approche en relation duelle, a permis une liberté de parole, une expression de leurs expériences et de leurs attentes facilitée par cette promiscuité.

L'arrêt du recueil de données a été réalisé après l'obtention de la saturation des données, cela a permis d'augmenter la validité interne de l'étude.

La validation du projet de recherche par le comité d'éthique du C.H.U de Nîmes a permis d'appuyer la qualité, et la rigueur méthodologique utilisée tout au long de ce travail.

### **3. Analyse des résultats**

#### **3.1 La consultation précédant le passage à l'acte suicidaire**

Le médecin généraliste est le professionnel de santé le plus consulté par les adolescents. Même si ces derniers consultent peu (entre 2 et 2,5 fois en moyenne par an), ils sont 75 % à avoir consulté un médecin généraliste dans l'année [4]. Les motifs de consultation sont essentiellement somatiques (75%), administratifs ou préventifs (19%) mais rarement psychologiques (6%) [43] [44].

Différentes études ont mis en évidence, que la plupart des adolescents ont consulté un médecin généraliste dans les mois précédant leur tentative de suicide, dans la majorité des cas pour un motif somatique bénin [6] [7].

Parmi les adolescents interrogés dans notre étude, une majorité s'est rendue en consultation auprès de leur médecin traitant dans le mois précédant leur passage à l'acte suicidaire.

De la même façon, le motif de consultation était très majoritairement somatique.

Lors de cette consultation, les difficultés psychologiques n'ont été abordées par aucun des adolescents interrogés, alors même qu'elles étaient déjà présentes pour certains d'entre eux.

En médecine adolescente, le motif de consultation initial est régulièrement un « faux-ami ». Le médecin doit savoir le dépasser et s'attacher à rechercher des problématiques sous-jacentes.

Il peut alors s'aider de guides d'entretiens validés.

Nous en citerons deux :

- **Le guide d'entretien HEADS**

Il permet d'explorer l'environnement, l'éducation, l'alimentation, les loisirs, les addictions, la sexualité, les idées suicidaires, la sécurité et les violences des adolescents.

**H** = *Home* (Environnement)

**E** = *Education* (Ecole)

**A** = *Activities* (activités)

**D** = *Drugs* (Drogues)

**S** = *Sexuality* (Sexualité)

**S** = *Suicide* (Suicide)

**S** = *Safety* (Sécurité)

Dans ce questionnaire, on retrouve les questions suivantes abordant le champ des idées suicidaires :

- ❖ T'es-tu déjà senti très déprimé?
- ❖ As-tu déjà pensé que la vie ne valait pas la peine d'être vécue?
- ❖ As-tu déjà pensé à te faire du mal, à te blesser volontairement?

- **Le BITS test**

L'utilisation du BITS test en consultation permet de dépister rapidement et facilement des problématiques suicidaires chez les adolescents. Il est détaillé dans le paragraphe II.6.

L'INPES a édité en 2009 un guide intitulé « Entre-nous » [32]. Cette brochure est un outil d'aide à la consultation destiné aux professionnels de la santé. Un des objectifs de ce guide est d'aider les médecins à aborder des sujets sensibles en consultation. Des formules simples et facilement reproductibles comme « et à part ça, tout va bien ? » sont proposées.

Il serait intéressant de diffuser largement ce guide, disponible en format numérique, dans le but de sensibiliser un grand nombre de médecins aux spécificités de la consultation adolescente.

L'ensemble de ces outils peuvent être d'une grande aide pour dépister certaines problématiques sous-jacentes et permettre au médecin d'ouvrir le dialogue.

### **3.2 Le rôle du médecin généraliste**

Pour les adolescents interrogés, le rôle premier du médecin généraliste est de soigner au sens organique du terme.

Pour plusieurs de ces adolescents, le médecin généraliste n'a pas pour rôle de prendre en charge la souffrance psychologique de ses patients. Ce rôle serait celui des psychiatres et des psychologues.

Cette donnée se retrouve dans la littérature médicale scientifique [45]. Le Pr. Philippe Binder et ses collaborateurs, affirment dans une étude publiée en 2010 que seulement 32% des adolescents pensent que leur médecin généraliste peut les aider en cas de dépression [43].

Il serait intéressant que les médecins généralistes réaffirment auprès de leurs jeunes patients que la santé est un équilibre à la fois physique, mental et social. Ceci dans le but de leur rappeler qu'il est leur interlocuteur privilégié en cas de pathologie physique, mais aussi de souffrance psychologique ou de problèmes relationnels.

D'autres adolescents ne sont pas opposés à se confier à leur médecin généraliste mais cela sera facilité si le médecin lui-même pose les bonnes questions.

Cette notion est énoncée dans la littérature : Selon le Pr. Philippe Binder et ses collaborateurs, un adolescent sur six entre 12 et 20 ans n'exprimerait pas son mal être en consultation [27]. Toujours selon lui, l'adolescent souhaite que le médecin perçoive son mal être sans qu'il doive le formuler lui-même [43].

### **3.3 Les qualités attendues du médecin généraliste**

Dans notre étude, les adolescents sont sensibles au temps qu'on leur consacre. Ils attendent de la part de leur médecin généraliste une écoute attentive sans jugement, assortie d'un ensemble de qualités humaines que sont : la bienveillance, la douceur, et la considération.

De la même façon, le médecin devra analyser puis expliquer à son jeune patient les différents éléments de la consultation, et lui délivrer ensuite si nécessaire des conseils.

L'utilisation de l'humour est citée par plusieurs adolescents comme permettant d'instaurer un climat détendu, propice aux échanges.

Ceci est confirmé par différentes études. R. de Tournemire évoque que le médecin doit adopter une attitude ouverte, respectueuse et empathique [46]. Dans une autre publication, l'adolescent est décrit comme sensible à l'attention et au respect que lui porte son médecin généraliste [47].

### **3.4 Les facteurs perçus négativement par les adolescents**

A l'inverse, un ensemble de caractéristiques ont été décrites par les adolescents de l'étude comme néfaste à l'établissement d'une relation de qualité entre un adolescent et son médecin généraliste.

Ces facteurs sont : une attitude jugée « pressante » de la part du médecin, une distance trop importante dans la relation, un manque de confiance du médecin envers son patient et un sentiment de jugement.

Ces éléments font échos en miroir, aux caractéristiques attendues par les adolescents de l'étude de leur médecin généraliste.

### **3.5 Les facteurs neutres**

Le sexe du médecin est décrit comme sans importance par les adolescents de notre étude.

De même, l'utilisation par le médecin généraliste du tutoiement ou du vouvoiement n'a pas d'importance pour les adolescents de notre étude.

### **3.6 L'ancienneté de la relation**

Parmi les adolescents de notre étude, suivis depuis la petite enfance par le même médecin généraliste, une relation de confiance existe favorisant les confidences de l'adolescent envers son médecin généraliste.

Cette donnée est confirmée dans la littérature [48].

Ainsi, lorsque le médecin traitant se trouve remplacé par un autre médecin, les adolescents ne se disent pas à l'aise pour se confier sur des problématiques personnelles, et vont plus facilement s'en tenir au motif de consultation « premier ».

### **3.7 Les bénéfices perçus à la consultation**

Pour plusieurs des adolescents de notre étude, le simple fait de se rendre en consultation et d'échanger avec leur médecin améliore leur état psychologique.

Cette donnée est connue de la littérature [30] et semble importante à diffuser à l'ensemble des médecins généralistes, car c'est en étant pleinement conscient de leur « pouvoir » qu'ils seront les plus à même de le mettre en pratique.

### **3.8 La place des accompagnants en consultation**

Pour la quasi-totalité des adolescents de notre étude, c'est leur mère qui est à l'origine de la prise de rendez-vous auprès du médecin traitant.

Parmi les dix entretiens réalisés, une adolescente seulement a déclaré se rendre parfois seule chez le médecin. La grande majorité des participants étaient accompagnés lors des consultations, par leur mère essentiellement.

Différents travaux de recherche ont démontré le rôle particulier joué par la mère dans la santé des adolescents. Une étude publiée en 2010 par le Pr Philippe Binder, médecin généraliste, et ses collaborateurs rapporte que 80% des consultations réalisées auprès des jeunes de 12 à 20 ans se sont déroulées en présence de la mère, contre 10% en présence du père [27].

Selon deux autres études, même à l'approche de la majorité, les deux tiers des rendez-vous médicaux sont sollicités par les parents [49] [50].

La majorité des adolescents interrogés dans notre étude souhaitent que le médecin fasse sortir leur accompagnant au cours de la consultation. Comme l'ont exprimé certains adolescents, l'absence de leur parent en consultation favorise les confidences.

De même, une grande majorité des adolescents de notre étude souhaitent que ce soit le médecin qui fasse sortir le parent accompagnateur.

L'HAS recommande de recevoir les adolescents de préférence seuls, sans leurs parents [51].

Les parents sont d'une aide précieuse dans l'évaluation globale de l'adolescent et ne doivent bien sûr pas être exclus de la consultation.

Une consultation rythmée en trois temps semble l'idéal pour aborder le motif premier de la consultation, assurer une mission de prévention rapide, puis aborder des sujets plus intimes comme la sexualité ou les troubles psychologiques :

En première partie de consultation, l'adolescent et son accompagnateur sont reçus ensemble. Puis à la demande du médecin, le parent sort et la consultation se poursuit avec l'adolescent seul. Enfin pour le dernier temps, les éléments importants de la consultation sont exposés au parent toujours en présence de l'adolescent. Les éléments rapportés au parent ne le seront qu'avec l'accord préalable de l'adolescent.

Le frein principal à l'application de cette consultation « type » est le manque de temps dont dispose le médecin généraliste dans sa pratique quotidienne.

La création d'une « consultation complexe » valorisée financièrement pour les médecins généralistes permettrait de lever partiellement ce frein.

### **3.9 Le secret médical**

Le secret médical est une notion connue par la quasi-totalité des adolescents interrogés dans notre étude.

Ils lui accordent une grande importance dans la relation adolescent-médecin généraliste. Cette confidentialité rassure et favorise les confidences en majorant la confiance accordée au médecin.

Certains adolescents rapportent douter parfois du respect du secret médical.

Il semble donc important de rappeler ce droit au secret régulièrement en début de consultation et de préciser qu'il est valable pour les patients mineurs comme majeurs.

Il est important de commencer à délivrer une information claire sur le secret médical aux adolescents et à leurs parents dès le début de la puberté, à un âge où l'enfant ne ressent pas encore le besoin de confidentialité.

Ainsi, cela permettra aux parents d'intégrer l'existence légale de ce droit au secret, afin de les préparer aux futures consultations et d'éviter les situations conflictuelles.

### 3.10 Perspectives

Il n'existe pas, à ce jour en France, de consultations obligatoires de l'adolescent comme on les connaît dans la petite enfance, ni même de recommandations en terme de fréquence du suivi médical.

Pourtant la mission du médecin généraliste est particulièrement complexe à l'adolescence et les sujets à aborder ne manquent pas : antécédents, plainte somatique éventuelle, examen clinique, scolarité, relations familiales, amicales et amoureuses, développement pubertaire et sexualité, comportements à risque, idées suicidaires ou tentatives de suicide passées.

D'où l'idée de proposer un suivi semestriel par le médecin généraliste, afin d'assurer les missions de prestation de soins et de prévention de la santé. Mais aussi de renforcer le lien entre les adolescents et leur médecin généraliste, afin de permettre une alliance optimale.

Ceci serait d'autant plus intéressant chez les adolescents présentant des facteurs de risque suicidaire ou ayant déjà réalisé un passage à l'acte suicidaire, dans le cadre de la prévention secondaire.

La mise en place d'une telle mesure permettrait également de légitimer aux yeux des adolescents, de leurs parents et des médecins l'importance d'aborder en consultation outre l'aspect somatique mais aussi les plans psychologiques et relationnels des adolescents.

## **VI. Conclusion**

Le médecin généraliste est le professionnel de santé le plus consulté par les adolescents, il est en première ligne pour dépister chez ces derniers, une souffrance morale et assurer la prévention primaire ou secondaire du suicide.

Une majorité des adolescents ont consulté un médecin généraliste dans les semaines qui ont précédé leur passage à l'acte suicidaire, dans la plupart des cas, pour un motif d'ordre somatique. Dans notre étude, cette donnée a été retrouvée, et aucun des adolescents n'avaient profité de cette consultation pour se confier sur leurs difficultés d'ordre psychologique, alors qu'elles étaient présentes.

Pour permettre aux adolescents de se confier, le contexte de la consultation est essentiel. Un médecin disponible, calme, à l'écoute, empathique et non jugeant permettra à son patient de se sentir considéré et de se livrer plus aisément sur des difficultés d'ordre psychologique. L'ancienneté de la relation sera également un atout important pour le médecin, car un lien de confiance est préétabli entre lui et son jeune patient.

La crainte de la non-confidentialité et la présence d'un tiers en consultation sont des freins majeurs pour les adolescents à évoquer leurs problématiques psychologiques.

Le médecin doit s'attacher à mener systématiquement sa consultation en plusieurs temps, dont un sans les parents et rappeler régulièrement, avant même le début de l'adolescence, le droit au secret médical notamment chez le sujet mineur.

Enfin, le médecin généraliste doit s'attacher à rechercher, à chaque consultation auprès d'un adolescent, une demande secondaire parfois imprécise ou ambivalente. Il peut s'aider pour cela d'outils de dépistage validés comme le BITS-test ou plus simplement de questions de relance : « Et à part ça ? » ; « Oui mais encore ? ».

Ceci semble d'autant plus important chez les adolescents présentant des facteurs de risque de suicide ou ayant déjà réalisé un passage à l'acte suicidaire.

L'instauration d'une consultation semestrielle des adolescents, permettrait de renforcer l'alliance, d'aborder des sujets de prévention et de rechercher des conduites à risques ou des idées suicidaires. Le médecin pourra aussi, lors de cette consultation, réaffirmer auprès de l'adolescent et de sa famille, qu'il est l'interlocuteur privilégié en cas de problématique ou de questionnement sur leur santé physique, mais aussi psychologique et relationnelle.

Ceci dans le but de ne pas faire de cette rencontre médecin – adolescent un rendez-vous manqué.

## VII. Bibliographie

[1] OMS, Organisation Mondiale de le Santé. Santé mentale : données et statistiques sur le suicide.

[En ligne] [https://www.who.int/mental\\_health/prevention/suicide/suicideprevent/fr/](https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/fr/)

[2] CépiDc-Inserm, centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès. Données épidémiologiques sur les décès par suicide. Fiche 1.

[En ligne] <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche1-4.pdf>

[3] Ministère des Solidarités et de la Santé. Santé mentale et psychiatrie : Agnès Buzyn présente sa feuille de route pour changer le regard sur la santé mentale et les personnes atteintes de troubles psychiques.

[En ligne] <https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiqués-de-presse/article/sante-mentale-et-psychiatrie-agnes-buzyn-presente-sa-feuille-de-route-pour>

[4] Choquet M, Ledoux S. Attentes et comportements des adolescents. Paris : Inserm ; 1998.

[5] Fanello S, Paul P, Delbos V, Gohier B, Jousset N, Duverger P et al. Pratiques et attentes des médecins généralistes à l'égard des conduites suicidaires. Santé publique. 2002;14(3):263-73.

[6] Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry. 2002;159(6):909-916.

[7] Saini P, Chantler K, Kapur N. General practionners' perspectives on primary care consultations for suicidal patients. Health Soc Care Community. 2016;24(3):260-269.

[8] Giedd JN, Blumenthal J, Jeffries NO, Castellanos FX, Liu H, Zijdenbos A et al. Brain development during childhood and adolescence : a longitudinal MRI study. Nat Neurosci. 1999;2(10):861-863.

[9] Courtecuisse V. L'adolescent malade, ce qu'il faut savoir : violence des secrets, secrets des violences. Paris : Armand Colin; 2005.

[10] Goldbeter-Mérinfeld E. L'adolescence en contexte : introduction. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux. 2008;40(1):5.

[11] Winnicott DW, Monod C, Pontalis JB. Jeu et réalité. Paris : Gallimard; 2002.

[12] Le Breton D. Une brève histoire de l'adolescence. Paris : JC. Béhar; 2013.

[13] OFDT, Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tentatives de suicide et pensées suicidaires chez les jeunes Français. Résultats des enquêtes ESCAPAD 2014 et ESPAD 2015.

[En ligne] <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche3-10.pdf>

[14] OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Thèmes de santé : Facteurs de risque.



[En ligne] [https://www.who.int/topics/risk\\_factors/fr/](https://www.who.int/topics/risk_factors/fr/)

[15] HAS, Haute Autorité de Santé – La crise suicidaire : reconnaître et prendre en charge. [En ligne] [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_271964/fr/la-crise-suicidaire-reconnaitre-et-prendre-en-charge](https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271964/fr/la-crise-suicidaire-reconnaitre-et-prendre-en-charge)

[16] Renaud J, Berlim MT, McGirr A, Toussignant M, Turecki G. Current psychiatric morbidity, aggression/impulsivity, and personality dimensions in child and adolescent suicide : a case control study. *J Affect Disord.* 2008;105(1-3):221-228.

[17] Mirkovic B, Labelle R, Guilé JM, Belloncle V, Bodeau N, Knafo A, et al. Coping Skills Among Adolescent Suicide Attempters : Results of a Multisite Study. *Can J Psychiatry.* 2015;60(2 suppl 1):S37-45.

[18] Walsh E, Eggert LL. Suicide risk and protective factors among youth experiencing school difficulties. *Int J Ment Health Nurs.* 2007;16(5):349-359.

[19] King CA, Merchant CR. Social and interpersonal factors relating to adolescent suicidality : a review of the literature. *Arch Suicide Res.* 2008;12(3):181-196.

[20] Anglin DM, Gabriel KOS, Kaslow NJ. Suicide acceptability and religious well-being : A comparative analysis in African American suicide attempters and non-attempters. *Journal of psychology and theology.* 2005;33(2):140-150.

[21] Chu JP, Goldblum P, Floyd R, Bongar B. The cultural theory and model of suicide. *Applied and preventive psychology.* 2010;14(1-4):25-40.

[22] Hawton K, Bergen H, Kapur N, Cooper J, Steeg S, Ness J et al. Repetition of self-harm and suicide following self-harm in children and adolescents : findings from the multicentre study of self-harm in England. *J Child Psychol Psychiatry.* 2012;53(12):1212-1219.

[23] Bridge JA, Goldstein TR, Brent DA. Adolescent suicide and suicidal behavior. *J Child Psychol Psychiatry.* 2006;47(3-4):372-394.

[24] HAS, Haute Autorité de Santé – La crise suicidaire : reconnaître et prendre en charge. [En ligne] [https://www.has-sante.fr/jcms/c\\_271964/fr/la-crise-suicidaire-reconnaitre-et-prendre-en-charge](https://www.has-sante.fr/jcms/c_271964/fr/la-crise-suicidaire-reconnaitre-et-prendre-en-charge)

[25] Kandel O, Duhot D, Very G, Lemasson JF, Boisnault P. Existe-t-il une typologie des actes effectués en médecine générale ? *Revue Prat Med Gen.* 2004;18:781-784.

[26] Tylee A, Haller DM, Graham T, Churchill R, Sanci LA. Youth-friendly primary-care services : how are we doing and what more needs to be done? *Lancet.* 2007;369(9572):1565-1573.

- [27] Binder P, Caron C, Jouhet V, Goasdoué E, Marcelli D, Ingrand P. Adolescents consulting a GP accompanied by a third party : comparative analysis of representations and how they evolve through consultation. *Fam Pract.* 2010;27(5):556-562.
- [28] Wandji C. Que confient les adolescents à risque à leur médecin généraliste et à quelles conditions ? Thèse d'exercice. Université de Poitiers. 2013.
- [29] Binder P, Jouhet V, Valette T, Goasdoué E, Marcelli D, Ingrand P. Interactions adolescent-médecin généraliste en consultation : évolution du mal-être ressenti et influence de la formation du médecin. Étude SOCRATE 1. *Revue Prat.* 2009;59(8):25–31.
- [30] Berkhout C, Tudrej B, Heintz AL, Rehman MB, Marcelli D, Ingrand P, Binder P. Bien qu'ils n'en soient pas conscients, les médecins généralistes améliorent le bien-être de leurs patients adolescents. *Exercer.* 2018;144:264-265.
- [31] Courtois R. Les conduites à risque à l'adolescence : repérer, prévenir, prendre en charge. Paris : Dunod; 2011.
- [32] Entre nous – Guide d'intervention pour les professionnels de santé : comment initier et mettre en œuvre une démarche d'éducation pour la santé avec un adolescent ?  
[En ligne] [http://www.medecin-ado.org/addeo\\_content/documents\\_annexes/121-4-entrenousinpes.pdf.pdf](http://www.medecin-ado.org/addeo_content/documents_annexes/121-4-entrenousinpes.pdf.pdf)
- [33] Un adolescent peut en cacher un autre.  
[En ligne] [www.medecin-ado.org](http://www.medecin-ado.org)
- [34] Favre AS. Dépistage des idées ou acte suicidaire et automutilation chez les adolescents de 13 à 18 ans. Validation du BITS-test en médecine générale sur 17 sites francophone. Thèse d'exercice. Université de Poitiers. 2017.
- [35] Binder P, Heintz A-L, Haller DM, Favre A-S, Tudrej B, Ingrand P, Vanderkam P. Detection of adolescent suicidality in primary care : an international utility study of the bullying-insomnia-tobacco-stress test. *Early Intervention in Psychiatry.* 2019;1–7.
- [36] François Dubet, Olivier Cousin, Éric Macé, Sandrine Rui, 2013, Pourquoi moi ? L'expérience des discriminations. Paris : Le Seuil; 2013.
- [37] Fourrier – Wisniewski M. Étude qualitative, auprès des lycéens de la Somme, des difficultés rencontrées lors d'une consultation en médecine générale. Thèse d'exercice. Université d'Amiens. 2016.
- [38] Papagiorgiou M. Attentes et vécu des adolescents au décours d'une consultation de médecine générale. Thèse d'exercice. Université de Nantes. 2016.
- [39] Spiegel FX. La prise en charge du risque suicidaire de l'adolescent en cabinet de médecine générale : Vécus et représentations des médecins généralistes. Étude qualitative auprès de médecins généralistes de la région Rouen Elbeuf. Thèse d'exercice. Université de Rouen. 2017.
- [40] Aubin-Auger I. Introduction à la recherche qualitative. *Exercer* 2008;84:142-145.

- [41] Blanchet A. L'enquête et ses méthodes : l'entretien. Paris : A. Colin 3ème édition ; 2015.
- [42] Oude-Engberink A, Lognos B, Clary B, David M, Bourrel G. La méthode phénoméno-pragmatique : une méthode pertinente pour l'analyse qualitative en santé. *Exercer*. 2013;105:4-11.
- [43] Binder P. Comment aborder l'adolescent en médecine générale ? *Revue Prat*. 2005;55:1073-1077.
- [44] Paulus D, Doumenc M, Pestiaux D. Adolescents : quelles portes d'entrées dans la consultation ? *Revue Prat Med Gen*. 2003;17:1048.
- [45] Lacotte-Marly E. Les jeunes et leur médecin traitant, pour une meilleure prise en charge des conduites à risque. Thèse d'exercice. Université de Paris V. 2004.
- [46] Tournemire R de. L'adolescent en consultation. *EMC Pédiatrie*. 2018;13(4):1-9.
- [47] Stheneur C, Alvin P, Boudaillez B, Gronnier P, Jacquin P, Picherot G, et al. La première consultation avec un adolescent. *Archives de pédiatrie*. 2009;16(19):1309-1312.
- [48] Lacotte Marly E. Les jeunes et leur médecin traitant : pour une meilleure prise en charge des conduites à risque. Thèse d'exercice. Université de Paris V. 2004.
- [49] Choquet M, Ledoux S, Menke H. Approche différentielle de la santé des adolescents : le vécu du jeune et la perception du médecin. In : « Les adolescents et leur santé ». Vanves : CNTERHI;1990:121-135.
- [50] Choquet M, Askevis M, Manfredi R, Ledoux S, Fraisse F. Les adolescents face aux soins : la consultation, l'hospitalisation. Paris: Inserm; 1992:1-76.
- [51] HAS, Haute Autorité de Santé - Manifestations dépressives à l'adolescence : repérage, diagnostic et prise en charge en soins de premier recours.  
[En ligne] [https://www.has-sante.fr/jcms/c\\_1782013/fr/manifestations-depressives-a-l-adolescence-reperage-diagnostic-et-prise-en-charge-en-soins-de-premier-recours](https://www.has-sante.fr/jcms/c_1782013/fr/manifestations-depressives-a-l-adolescence-reperage-diagnostic-et-prise-en-charge-en-soins-de-premier-recours)

## **VIII. Index des abréviations**

ANAES : Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CIM : Classification Internationale des Maladies

DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

HAS : Haute Autorité de Santé

INPES : Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONS : Observatoire National du Suicide

## IX. Annexes

### Annexe 1 : Institutional Review Board (IRB)



#### Interface Recherche Bioéthique Institutional Review Board

Président :

**Pr. Thierry LAVABRE BERTRAND**  
Chef de service Laboratoire De Cytologie  
Clinique Et Cytogénétique

Vice Président :

**Pr. Jean Yves LEFRANT**  
Chef de service FOREVA

**Mme Sophie GRANIER**  
Chargée de Missions DRCI  
Coordinatrices des ARCs/TECs

Secrétariat :

Tél.: 04.66.68.50.08  
Fax.: 04.66.68.34.00  
[irb@chu-nimes.fr](mailto:irb@chu-nimes.fr)

N° Fiche [19.022]

### Interface Recherche Bioéthique Institutional Review Board

Les études qualifiées de Recherche Biomédicales selon l'article L1121-1 du code de la santé publique doivent être présentées au CPP et ne pourront être examinées par l'IRB

**Titre complet de l'étude :**



Points de vue d'adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire : Quelles attentes ont-ils de leur relation à leur médecin traitant ?

**Promoteur :** CHU de Nîmes

**Investigateur Principal et Service :** Géraldine NOVOA-TEXIER - Interne en DES de Médecine Générale.

**Investigateur Secondaire :** Dr Marc GARCIA – Médecin Généraliste.

- Étude Monocentrique :  Oui  Non
- Type de Recherche :  Diagnostique  Physiopathologique  
 Épidémiologique  Thérapeutique  
 Autre : **Recherche qualitative**
- Type d'étude :  Étude descriptive transversale  Suivi de Cohorte  
 Étude épidémiologique  Étude Observationnelle  
 Autres :
- Étude déjà débutée :  Oui  Non  
Si oui, Date début :
- Transmission d'un protocole :  Oui  Non
- Transmission d'un article en cours de soumission :  Oui  Non
- Projet ne relevant pas de la Loi Huriet-Sérusclat modifiée :  Oui  Non
- Validation méthodologique du projet par le BESPIM :  Oui  Non

<b>AVIS de l'IRB</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Favorable	<input type="checkbox"/> Défavorable
	<input type="checkbox"/> Non compétent	<input type="checkbox"/> Différé
<b>Document fourni :</b> Diaporama de présentation et protocole simplifié		
<b>Code de l'étude attribué par l'IRB :</b> 19.22.01		
 <b>CHU de Nîmes</b> Service de Cytologie Clinique Pr Thierry LAVABRE-BERTRAND N°RPPS : 10003214102		

Une copie du présent avis est envoyée au bureau de la DRCI du CHU de Nîmes

## Annexe 2 : Lettre d'information et de non-opposition destinée au patient



# LETTRE D'INFORMATION ET DE NON- OPPOSITION DESTINEE AU PATIENT

### **Promoteur de l'étude :**

CHU de Nîmes  
Place du Professeur Debré  
30029 Nîmes Cedex 09

Titre de l'étude :

### Points de vue d'adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire : Quelles attentes ont-ils de leur relation à leur médecin traitant ?

Madame, Monsieur,

Le Service de Pédopsychiatrie du CHU de Nîmes réalise une étude ayant pour but de recueillir oralement le ressenti, l'expérience, les attentes d'adolescents ayant réalisés un passage à l'acte suicidaire.

#### Objectifs de l'étude

La participation à ce recueil de données a pour objectifs de recueillir, lors d'un entretien d'environ 30 minutes, votre ressenti et vos attentes vis-à-vis de la relation patient-médecin traitant.

Aucune contrainte ou obligation supplémentaire ne vous sera imposée.

Votre participation ne modifie en rien votre prise en charge médicale habituelle. Cette étude consistera uniquement à recueillir des informations concernant vos attentes vis à vis de votre médecin traitant. Elle ne nécessite aucune visite ni prélèvement ni examen de quelque nature que ce soit et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité.

**En l'absence de réception d'opposition de votre part dans le mois suivant la présentation de cette note d'information, nous considérerons que vous acceptez de participer à cette étude.**

Votre refus ne modifiera en rien la relation avec votre médecin.

#### QUELS SONT VOS DROITS ?

Dans le cadre de la recherche, un traitement informatique de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre d'analyser les résultats de la recherche au regard des objectifs de l'étude. Le responsable du traitement des données est le CHU de Nîmes. Le médecin de l'étude et autres personnels de l'étude recueilleront des informations à votre sujet. Ces informations, appelées « Informations personnelles », sont consignées. Seules les informations strictement nécessaires au traitement et à la finalité de la recherche seront recueillies. Afin d'assurer la

confidentialité de vos informations personnelles, ni votre nom ni aucune autre information qui permettrait de vous identifier directement ne seront saisis. Vous serez uniquement identifié(e) par un code. Le code est utilisé pour que le médecin de l'étude puisse vous identifier si nécessaire.

Conformément aux dispositions de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles) et au règlement général sur la protection des données (règlement UE 2016/679), vous disposez des droits suivants sur les données que nous collectons dans le cadre de cette étude :

- le droit de demander des informations sur le traitement de vos données.
- le droit de demander la rectification des données qui vous concernent si celles-ci sont inexacts ou incomplètes. Pendant que nous examinons votre demande, vous avez le droit de limiter le traitement de vos données,
- le droit de demander à ce que vos données vous soient transférées à vous ou à quelqu'un d'autre dans un format couramment utilisé,
- le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel, à tout moment, sans avoir à justifier votre décision.

Aucune autre donnée ne sera ensuite collectée après manifestation de refus de participation à l'essai.

- Si vous manifestez votre refus de participation à l'essai, vous pouvez demander l'effacement de vos données déjà collectées s'il n'existe aucune autre exigence légale qui requière leur utilisation. Veuillez noter cependant que vos données qui auront été déjà traitées seront conservées pour ne pas rendre impossible ou compromettre la réalisation des objectifs de la recherche (Articles 17.3.c & 17.3.d. du RGPD).

Vous pouvez exercer ces droits en le demandant par écrit auprès du médecin de l'étude. Le promoteur répondra à vos demandes dans la mesure du possible conformément à ses autres obligations légales et réglementaires et lorsque la loi l'exige.

Vous disposez également d'un droit d'opposition à la transmission des données couvertes par le secret professionnel susceptibles d'être utilisées dans le cadre de cette recherche et d'être traitées.

Vos données seront conservées jusqu'à la rédaction du rapport final de la recherche. Elles seront ensuite archivées durant 15 ans.

Si vous avez d'autres questions au sujet du recueil, de l'utilisation de vos informations personnelles ou des droits associés à ces informations, veuillez contacter le Délégué à la Protection des données du CHU de Nîmes ([dpd@chu-nimes.fr](mailto:dpd@chu-nimes.fr)) ou le médecin de l'étude.

**Pour tout renseignement concernant cette étude ou pour exprimer votre refus de participation, vous pouvez contacter**

**Nom et coordonnées du porteur du projet :**

Géraldine NOVOA-TEXIER  
CHU de Nîmes  
Place du Professeur Debré  
30029 Nîmes Cedex 09  
Tel : 04.66.68.40.72

**Soyez assurée que votre participation nous est extrêmement précieuse. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous apportez ainsi à la recherche médicale.**



## Annexe 3 : Guide d'entretien

### Guide d'entretien

(en bleu sont notées les éventuelles questions de relance)

Bonjour, je m'appelle Géraldine Novoa – Texier, je suis étudiante en médecine, je mène actuellement un travail de recherche pour ma thèse. Pour ce travail, je m'intéresse aux points de vue d'adolescents ayant réalisé un passage à l'acte suicidaire et à leurs attentes quant à leur relation à leur médecin traitant.

Je te remercie d'avoir accepté de me rencontrer pour échanger autour de cette question.

Je ne suis bien sûr, pas là pour te juger mais pour t'écouter et apprendre de ton expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et tu as tout le temps nécessaire pour me répondre. Cet entretien sera enregistré mais complètement anonyme. Tu peux, si tu le souhaites arrêter l'entretien à tout moment sans avoir à te justifier.

- As-tu des questions par rapport à ça ?
- Peux-tu me dire ton âge et me rappeler où tu en es de tes études ?
- Peux-tu me raconter la dernière consultation chez ton médecin généraliste (MG) avant ton passage à l'acte ?
  1. Si aucune consultation n'a précédé le passage à l'acte suicidaire :
    - a. Pourquoi ne pas être allée voir ton MG ?
    - b. Vers quelle personne t'es-tu tournée à ce moment-là ?
  2. Si une consultation a eu lieu dans les semaines précédant le passage à l'acte suicidaire :
    - a. Qu'attendais-tu de cette consultation ?
    - b. Qui avait pris le RDV et quel était le motif de la consultation ?
    - c. Est-ce qu'une autre personne était présente à cette consultation ? Qu'en as-tu pensé ?
    - d. Quels sujets ont été abordés ?
    - e. Qu'as-tu pensé de la durée de la consultation ?
    - f. Comment te sentais-tu en sortant de la consultation ? Avais-tu abordé tous les sujets souhaités avec lui / elle ?
- Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de ton médecin généraliste ?
  1. Quelle attitude attends-tu de lui ?
  2. A quelle fréquence le vois-tu en consultation ? Qu'en penses-tu ?
  3. A quels domaines de ta santé aimerais-tu qu'il s'intéresse spontanément ?
  4. A ton avis que peut-il t'apporter ? Quel est son rôle ?
- Peux-tu me décrire ce qui serait pour toi une consultation idéale chez ton médecin traitant ?
  1. Quelles personnes seraient présentes ? Qu'en penses-tu ?

2. Quelle attitude aurait ton MG ?
  3. Quels sujets aborderiez-vous ?
  4. Quelle serait la durée de la consultation ?
- Peux-tu à présent me décrire la pire consultation imaginable chez ton médecin traitant ?
  - Est-ce-que tu sais ce qu'est le secret médical ?
    1. Est-ce que c'est important pour toi ?

## **X. Serment d'Hippocrate**

### **SERMENT D'HIPPOCRATE**

Au moment d'être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité.

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité.

J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.

Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.

Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.

Admis(e) dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.

Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.

J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.

Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j'y manque.



