Atteintes rénales dans la maladie de Castleman de l'enfant, 4 cas français avec microangiopathie thrombotique

Élie Cousin

► To cite this version:

Élie Cousin. Atteintes rénales dans la maladie de Castleman de l'enfant, 4 cas français avec microangiopathie thrombotique. Sciences du Vivant [q-bio]. 2019. dumas-02569936

HAL Id: dumas-02569936

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02569936>

Submitted on 10 May 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

THESE D'EXERCICE / UNIVERSITE DE RENNES 1
sous le sceau de l'Université Bretagne Loire

Thèse en vue du
DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE

présentée par

Elie COUSIN

**Atteintes rénales dans la
maladie de Castleman de
l'enfant, 4 cas français avec
microangiopathie
thrombotique**

**Thèse soutenue à Rennes
le 07/03/2019**

devant le jury composé de :

Virginie GANDEMER

Professeur - CHU Rennes / Présidente

Cécile VIGNEAU

Professeur - CHU Rennes / Juge

Patrick PLADYS

Professeur - CHU Rennes / Juge

Sophie TAQUE

Docteur - CHU Rennes / Directrice de thèse

THESE D'EXERCICE / UNIVERSITE DE RENNES 1
sous le sceau de l'Université Bretagne Loire

Thèse en vue du
DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE

présentée par

Elie COUSIN

Né le 05/01/1990 à Châteaubriant

**Atteintes rénales dans la
maladie de Castleman de
l'enfant, 4 cas français avec
microangiopathie thrombotique**

**Thèse soutenue à Rennes le
07/03/2019**

devant le jury composé de :

Virginie GANDEMER

Professeur - CHU Rennes / Présidente

Cécile VIGNEAU

Professeur - CHU Rennes / Juge

Patrick PLADYS

Professeur - CHU Rennes / Juge

Sophie TAQUE

Docteur - CHU Rennes / Directrice de thèse

Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers

Nom Prénom	Sous-section CNU
ANNE-GALIBERT Marie-Dominique	Biochimie et biologie moléculaire
BARDOU-JACQUET Edouard	Gastroentérologie; hépatologie; addictologie
BELAUD-ROTUREAU Marc-Antoine	Histologie; embryologie et cytogénétique
BELLISSANT Eric	Pharmacologie fondamentale; pharmacologie clinique; addict
BELOEIL Hélène	Anesthésiologie-réanimation; médecine d'urgence
BENDAVID Claude	Biochimie et biologie moléculaire
BENSALAH Karim	Urologie
BEUCHEE Alain	Pédiatrie
BONAN Isabelle	Médecine physique et de réadaptation
BONNET Fabrice	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques; gynécologie médicale
BOUDJEMA Karim	Chirurgie générale
BOUGET Jacques Professeur des Universités en surnombre	Thérapeutique; médecine d'urgence; addictologie
BOUGUEN Guillaume	Gastroentérologie; hépatologie; addictologie
BOURGUET Patrick Professeur des Universités Emérite	Biophysique et médecine nucléaire
BRASSIER Gilles	Neurochirurgie
BRETAGNE Jean-François Professeur des Universités Emérite	Gastroentérologie; hépatologie; addictologie
BRISOT Pierre Professeur des Universités Emérite	Gastroentérologie; hépatologie; addictologie
CARRE François	Physiologie
CATROS Véronique	Biologie cellulaire
CATTOIR Vincent	Bactériologie-virologie; hygiène hospitalière
CHALES Gérard Professeur des Universités Emérite	Rhumatologie
CORBINEAU Hervé	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

CUGGIA Marc	Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication
DARNAULT Pierre	Anatomie
DAUBERT Jean-Claude Professeur des Universités Emérite	Cardiologie
DAVID Véronique	Biochimie et biologie moléculaire
DAYAN Jacques (Professeur associé)	Pédopsychiatrie; addictologie
DE CREVOISIER Renaud	Cancérologie; radiothérapie
DECAUX Olivier	Médecine interne; gériatrie et biologie du vieillissement; addictologie
DESRUES Benoît	Pneumologie; addictologie
DEUGNIER Yves Professeur des Universités en surnombre + Consultanat	Gastroentérologie; hépatologie; addictologie
DONAL Erwan	Cardiologie
DRAPIER Dominique	Psychiatrie d'adultes; addictologie
DUPUY Alain	Dermato-vénéréologie
ECOFFEY Claude	Anesthésiologie-réanimation; médecine d'urgence
EDAN Gilles	Neurologie
FERRE Jean Christophe	Radiologie et imagerie Médecine
FEST Thierry	Hématologie; transfusion
FLECHER Erwan	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
FREMOND Benjamin	Chirurgie infantile
GANDEMER Virginie	Pédiatrie
GANDON Yves	Radiologie et imagerie Médecine
GANGNEUX Jean-Pierre	Parasitologie et mycologie
GARIN Etienne	Biophysique et médecine nucléaire
GAUVRIT Jean-Yves	Radiologie et imagerie Médecine
GODEY Benoit	Oto-rhino-laryngologie

GUGGENBUHL Pascal	Rhumatologie
GUIGUEN Claude Professeur des Universités Emérite	Parasitologie et mycologie
GUILLE François	Urologie
GUYADER Dominique	Gastroentérologie; hépatologie; addictologie
HAEGELEN Claire	Anatomie
HOUOT Roch	Hématologie; transfusion
HUSSON Jean-Louis Professeur des Universités Emérite	Chirurgie orthopédique et traumatologique
HUTEN Denis Professeur des Universités Emérite	Chirurgie orthopédique et traumatologique
JEGO Patrick	Médecine interne; gériatrie et biologie du vieillissement; addictologie
JEGOUX Franck	Oto-rhino-laryngologie
JOUNEAU Stéphane	Pneumologie; addictologie
KAYAL Samer	Bactériologie-virologie; hygiène hospitalière
KERBRAT Pierre, RETRAITE	Cancérologie; radiothérapie
LAMY DE LA CHAPELLE Thierry	Hématologie; transfusion
LAVIOLE Bruno	Pharmacologie fondamentale; pharmacologie clinique; addictologie
LAVOUE Vincent	Gynécologie-obstétrique; gynécologie médicale
LE BRETON Hervé	Cardiologie
LE GUEUT Mariannick Professeur des Universités en surnombre + consultanat	Médecine légale et droit de la santé
LE TULZO Yves	Réanimation; médecine d'urgence
LECLERCQ Christophe	Cardiologie
LEDERLIN Mathieu	Radiologie et imagerie Médecine
LEGUERRIER Alain Professeur des Universités Emérite	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
LEJEUNE Florence	Biophysique et médecine nucléaire
LEVEQUE Jean	Gynécologie-obstétrique; gynécologie médicale

LIEVRE Astrid	Gastroentérologie; hépatologie; addictologie
MABO Philippe	Cardiologie
MAHE Guillaume	Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire
MALLEDANT Yannick Professeur des Universités Emérite	Anesthésiologie-réanimation; médecine d'urgence
MENER Eric (Professeur associé)	Médecine générale
MEUNIER Bernard	Chirurgie digestive
MICHELET Christian Professeur des Universités en surnombre	Maladies infectieuses; maladies tropicales
MOIRAND Romain	Gastroentérologie; hépatologie; addictologie
MORANDI Xavier	Anatomie
MOREL Vincent (Professeur associé)	Epistémologie clinique
MOSSER Jean	Biochimie et biologie moléculaire
MOURIAUX Frédéric	Ophtalmologie
MYHIE Didier (Professeur associé)	Médecine générale
ODENT Sylvie	Génétique
OGER Emmanuel	Pharmacologie fondamentale; pharmacologie clinique; addictologie
PARIS Christophe	Médecine et santé au travail
PERDRIGER Aleth	Rhumatologie
PLADYS Patrick	Pédiatrie
RAVEL Célia	Histologie; embryologie et cytogénétique
REVEST Matthieu	Maladies infectieuses; maladies tropicales
RICHARD de LATOUR Bertrand (Professeur associé)	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
RIFFAUD Laurent	Neurochirurgie
RIOUX-LECLERCQ Nathalie	Anatomie et cytologie pathologiques
ROBERT-GANGNEUX Florence	Parasitologie et mycologie

ROPARS Mickaël	Chirurgie orthopédique et traumatologique
SAINT-JALMES Hervé	Biophysique et médecine nucléaire
SAULEAU Paul	Physiologie
SEGUIN Philippe	Anesthésiologie-réanimation; médecine d'urgence
SEMANA Gilbert	Immunologie
SIPROUDHIS Laurent	Gastroentérologie; hépatologie; addictologie
SOMME Dominique	Médecine interne; gériatrie et biologie du vieillissement; addictologie
SOULAT Louis (Professeur associé)	Thérapeutique; médecine d'urgence; addictologie
SULPICE Laurent	Chirurgie générale
TADIÉ Jean Marc	Réanimation; médecine d'urgence
TARTE Karim	Immunologie
TATTEVIN Pierre	Maladies infectieuses; maladies tropicales
TATTEVIN-FABLET Françoise (Professeur associé)	Médecine générale
THIBAULT Ronan	Nutrition
THIBAULT Vincent	Bactériologie-virologie; hygiène hospitalière
THOMAZEAU Hervé	Chirurgie orthopédique et traumatologique
TORDJMAN Sylvie	Pédopsychiatrie; addictologie
VERHOYE Jean-Philippe	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
VERIN Marc	Neurologie
VIEL Jean-François	Epidémiologie, économie de la santé et prévention
VIGNEAU Cécile	Néphrologie
VIOLAS Philippe	Chirurgie infantile
WATIER Eric	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique; brûlologie
WODEY Eric	Anesthésiologie-réanimation; médecine d'urgence

Maîtres de Conférences des Universités - Praticiens Hospitaliers

Nom Prénom	Sous-section CNU
ALLORY Emmanuel (Maître de conférence associé des universités de MG)	Médecine générale
AME-THOMAS Patricia	Immunologie
AMIOT Laurence (Baruch)	Hématologie; transfusion
ANSELMi Amédéo	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
BEGUE Jean-Marc	Physiologie
BERTHEUIL Nicolas	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie
BOUSSEMART Lise	Dermato-vénéréologie
CABILLIC Florian	Biologie cellulaire
CAUBET Alain	Médecine et santé au travail
CHHOR-QUENIART Sidonie (Maître de conférence associé des universités de MG)	Médecine générale
DAMERON Olivier	Informatique
DE TAYRAC Marie	Biochimie et biologie moléculaire
DEGEILH Brigitte	Parasitologie et mycologie
DROITCOURT Catherine	Dermato-vénéréologie
DUBOURG Christèle	Biochimie et biologie moléculaire
DUGAY Frédéric	Histologie; embryologie et cytogénétique
EDELINE Julien	Cancérologie; radiothérapie
FIQUET Laure (Maître de conférence associé des universités de MG)	Médecine générale

Nom Prénom	Sous-section CNU
GARLANTEZEC Ronan	Epidémiologie, économie de la santé et prévention
GOUIN Isabelle épouse THIBAUT	Hématologie; transfusion
GUILLET Benoit	Hématologie; transfusion
JAILLARD Sylvie	Histologie; embryologie et cytogénétique
KALADJI Adrien	Chirurgie vasculaire; médecine vasculaire
LAVENU Audrey	Sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques
LE GALL François	Anatomie et cytologie pathologiques
LEMAITRE Florian	Pharmacologie fondamentale; pharmacologie clinique; addictologie
MARTINS Pedro Raphaël	Cardiologie
MATHIEU-SANQUER Romain	Urologie
MENARD Cédric	Immunologie
MOREAU Caroline	Biochimie et biologie moléculaire
MOUSSOUNI Fouzia	Informatique
NAUDET Florian	Thérapeutique ; médecine d'urgence ; addictologie
PANGAULT Céline	Hématologie; transfusion
RENAUT Pierrick (maître de conférence associé des universités de MG)	Médecine générale
ROBERT Gabriel	Psychiatrie d'adultes; addictologie
SCHNELL Frédéric	Physiologie

Nom Prénom**Sous-section CNU**

THEAUDIN Marie épouse SALIOU

Neurologie

TURLIN Bruno

Anatomie et cytologie pathologiques

VERDIER Marie-Clémence
(Lorne)Pharmacologie fondamentale; pharmacologie clinique;
addictologie

ZIELINSKI Agata

I. Remerciements

Je tiens à remercier Mme le Professeur GANDEMER qui me fait l'honneur de présider ce jury de thèse.

Je remercie Mme le Professeur VIGNEAU et M. le Professeur PLADYS pour avoir jugé ce travail.

Je remercie Mme le Docteur TAQUE pour m'avoir proposé ce projet de thèse et pour son encadrement.

Merci à ma famille et à mes amis pour leur soutien.

II. Table des matières

I.	Remerciements	10
II.	Table des matières	11
III.	Liste des documents annexés.....	12
IV.	Liste des illustrations.....	12
V.	Résumé	13
VI.	Abréviations	14
VII.	Introduction	15
	La maladie de Castleman :	15
	Caractéristiques cliniques :	15
	Caractéristiques en anatomo-pathologie :	15
	Les microangiopathies thrombotiques :	18
	Caractéristiques cliniques :	18
	Physiopathologie :	18
	Caractéristiques en anatomo-pathologie :	19
VIII.	Matériel et Méthodes:	21
IX.	Résultats	21
	1) CAS n°1 :	21
	2) CAS n°2	22
	3) CAS n°3	23
	4) CAS n°4	23
X.	Discussion :	30
XI.	Conclusion.....	34
XII.	Références	36
XIII.	Annexe 1 : Schéma d'un ganglion lymphatique	39
XIV.	Annexe 2 : Article publié dans <i>Pediatric Blood and Cancer</i>	40
XV.	Annexe 3 : Poster présenté à la société de néphrologie pédiatrique en Novembre 2017	46

III. Liste des documents annexés

Annexe 1: Schéma d'un ganglion lymphatique

Annexe 2: Article *Pediatric Blood and Cancer*

Annexe 3 : Poster SNP Novembre 2017

IV. Liste des illustrations

Figure 1 : Atteinte ganglionnaire dans la maladie de Castleman multicentrique (centre de Référence Maladies Rares « Maladie de Castleman » labellisé le 9 Mai 2017)

Figure 2 : Classification des microangiopathies thrombotiques en fonction de l'activité ADAMTS 13 (*Sadler JE. 2008*)

Tableau 1 : Caractéristiques des patients (*Cousin E. et al 2018*)

Figure 3 : Coupes histologiques des adénopathies et biopsies rénales pour chacun des cas (*Cousin E. et al 2018*)

Figure 4 : Algorithme thérapeutique pour la prise en charge du syndrome de Castleman multicentrique idiopathique de l'adulte (*Van Rhee F et al 2018*)

V. Résumé

L'hyperplasie ganglionnaire angiofolliculaire ou maladie de Castleman (MC) dans sa forme pédiatrique est une pathologie peu fréquente et mal comprise du ganglion lymphatique. Les atteintes rénales associées à la MC ont déjà été rapportées chez l'adulte mais n'ont jamais été décrites précisément chez l'enfant. Nous rapportons quatre cas français d'enfants avec polyadénopathie, organomégalie, anasarque, hypertension artérielle et insuffisance rénale aiguë évoquant une MC dans sa forme multicentrique (MCM) avec atteinte rénale. Pour tous les cas, l'étude anatomo-pathologique des biopsies rénales montrait une microangiopathie thrombotique diffuse (MAT) et le diagnostic de MCM était confirmé par l'examen histologique d'une adénopathie. Le traitement par corticothérapie et/ou rituximab a été rapidement efficace et a permis une amélioration rapide de la fonction rénale sans rechute à ce jour dans tous les cas. Les objectifs de ce travail étaient de décrire les lésions rénales associées à la maladie de Castleman et de déterminer après étude bibliographique, une conduite thérapeutique.

Mots clés : maladie de Castleman, microangiopathie thrombotique

VI. Abréviations

MC : Maladie de Castleman

MCM : Maladie de Castleman avec atteinte Multicentrique

MCL : Maladie de Castleman avec atteinte Localisée

VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine

HHV8 : Herpès Virus Humain type 8

MAT : Microangiopathie Thrombotique

IL-6 : Interleukine 6

ADAMTS 13 : *A disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type 1 repeats*

VII.Introduction

L'hyperplasie ganglionnaire angiofolliculaire ou maladie de Castleman (MC) dans sa forme pédiatrique est une pathologie peu fréquente et mal comprise du ganglion lymphatique. Cette pathologie est classée dans le groupe des syndromes lymphoprolifératifs atypiques, un groupe hétérogène de pathologies caractérisé par un processus d'hyperréactivité du système immunitaire d'origine méconnue. La forme multicentrique de la maladie peut s'accompagner d'une atteinte rénale, jamais encore décrite en pédiatrie.

La maladie de Castleman :

Caractéristiques cliniques :

Deux formes cliniques de MC sont décrites. La MC avec atteinte localisée (MCL) est la forme la plus communément rencontrée. Cette pathologie concerne plus fréquemment des sujets jeunes (< 30 ans) et correspond à la forme la plus incidente en pédiatrie. Les patients consultent le plus souvent devant l'apparition d'une adénopathie périphérique volumineuse ou pour une gêne respiratoire secondaire à l'apparition d'une tumeur médiastinale isolée. Le traitement de la forme localisée de la MC est la résection chirurgicale de la tumeur. Les rechutes sont exceptionnelles. La forme multicentrique de la maladie de Castleman (MCM) est moins fréquente et souvent secondaire chez l'adulte aux infections par le VIH ou HHV8. De rares cas pédiatriques de la MCM avec infection par le VIH ou HHV8 ont été rapportés [1,2]. Pour les formes de MCM VIH négatif et HHV8 négatif, on retiendra le terme de MCM idiopathique (iMCM). Les patients présentent dans la majorité des cas une altération de l'état général avec fièvre, asthénie, polyadénopathie, organomégalie, anasarque, et lésions cutanées diffuses. Plus rarement, des atteintes neurologiques, endocrines ou rénales ont été rapportées [3]. Les analyses biologiques mettent en évidence le plus souvent une hypergammaglobulinémie, une anémie, une thrombocytopénie et parfois des désordres auto-immuns [4,5]. La forme multicentrique de la maladie de Castleman est difficile à traiter et d'évolution variable. Chez l'adulte, la médiane de survie est estimée à 26 mois [6]. La MCM aurait un meilleur pronostic chez l'enfant dans les quelques séries décrites [2].

Caractéristiques en anatomo-pathologie :

Il existe trois types histologiques distincts de MCM. La forme vasculo-hyaline, la plus fréquente, est caractérisée par la présence de petits follicules hyalinisés et par une prolifération vasculaire interfolliculaire. La forme avec prolifération plasmocytaire est caractérisée par

l'abondance de plasmocytes sur les coupes histologiques des ganglions atteints. Enfin, le troisième type de MCM correspond à la forme mixte dans laquelle des éléments caractéristiques des deux formes histologiques décrites ci-dessus existent sur un même échantillon [7] (Figure 1).

Figure 1 : Atteintes ganglionnaires dans la maladie de Castleman multicentrique (centre de Référence Maladies Rares « Maladie de Castleman » labellisé le 9 Mai 2017)

La forme vasculo-hyaline est caractérisée par la présence de centres germinatifs appauvris en cellules lymphoïdes et l'apparition de cellules dendritiques folliculaires proéminentes (FDC). La forme dite "plasmocytaire" présente des centres germinatifs hyperplasiques avec une prolifération de plasmocytes. La barre noire représente 60 μm (A,E), 200 μm (B-D). (A) : centre germinatif en régression. (B) : cellules dendritiques folliculaires proéminentes dans le centre germinatif. (C) : vaisseaux sanguins pénétrant le centre germinatif. (D) : hyperplasie du centre germinatif. (E) : prolifération plasmocytaire.

Le pronostic de la MCM est réservé et le traitement doit faire appel le plus souvent à la corticothérapie intensive et à la chimiothérapie prolongée [8-9].

Les microangiopathies thrombotiques :

Caractéristiques cliniques :

Le terme de microangiopathie thrombotique (MAT) désigne une lésion de l'endothélium des petites artérioles et des capillaires artériolaires entraînant la formation d'agrégats plaquettaires et de thromboses. La thrombopénie et l'anémie hémolytique résultent de la consommation des plaquettes et de la fragmentation des hématies dans les vaisseaux lésés. Cette lésion est commune à deux ensembles cliniques : le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) et le syndrome hémolytique et urémique (SHU). Le PTT, plus fréquent chez l'adulte, associe une fièvre, un purpura et une atteinte neurologique prédominante alors que les signes rénaux sont inconstants. À l'inverse, le SHU touche surtout le jeune enfant et l'atteinte rénale est constante alors que les signes neurologiques sont plus rares. La survenue d'un SHU au décours d'une diarrhée infectieuse caractérise la forme typique, épidémique en opposition au SHU non-diarrhéique ou atypique. Les manifestations cliniques du SHU et du PTT sont liées à la distribution particulière des lésions de la microcirculation. Une MAT peut aussi se développer au cours de nombreuses autres maladies. On distingue ainsi les MAT associées aux infections bactériennes avec production de vérotoxine, aux infections virales (en particulier au virus de l'immunodéficience humaine ou VIH), aux cancers et aux drogues anticancéreuses, à la transplantation d'organes et aux traitements immunosuppresseurs, aux radiations ionisantes, au lupus érythémateux disséminé (LED), au syndrome primaire des anticorps antiphospholipides (APL), à la grossesse et au post-partum, à l'hypertension artérielle maligne et à la sclérodermie, à la maladie de Castleman et au syndrome POEMS (neuropathie périphérique (P), une anomalie des plasmocytes (M), et d'autres manifestations paranéoplasiques, dont une organomégalie (O), des endocrinopathies (E) et des altérations cutanées (S). Il existe aussi des formes idiopathiques et des formes familiales. (Figure 2) [10-11].

Physiopathologie :

L'activation des cellules endothéliales des petits vaisseaux est essentielle à la formation des agrégats plaquettaires et des thromboses caractéristiques des MAT. L'endothélium a deux fonctions essentielles : il constitue la principale barrière à la migration des cellules sanguines vers le secteur

tissulaire et il exerce une action anticoagulante. En effet, l'endothélium normal produit la prostacycline, le monoxyde d'azote, la thrombomoduline, la protéine S et l'activateur tissulaire du plasminogène. Ces facteurs préviennent l'activation plaquettaire et la formation de fibrine. De plus, la surface endothéliale est recouverte d'un glycocalyx très riche en héparane-sulfate qui lie l'antithrombine III, elle-même inhibitrice de la thrombine. L'endothélium peut être directement activé par des anticorps spécifiques, des toxines bactériennes comme les vérotoxines, des toxiques chimiques ou des facteurs mécaniques. L'endothélium peut aussi être indirectement activé par l'action des cytokines, en particulier du TNF α et de l'IL-1 β . Elles sont libérées par les macrophages et les cellules avoisinantes en réponse à un agent infectieux, une endotoxine bactérienne ou des complexes immuns. L'activation endothéliale entraîne la production de chimiokines et stimule l'expression des molécules d'adhérence leucocytaire et l'activité procoagulante. En effet, l'endothélium activé sécrète le facteur von Willebrand (vWF) et le facteur tissulaire activant la voie extrinsèque de la coagulation. Toutes ces molécules contrebalancent l'action anticoagulante normale de l'endothélium. L'activité procoagulante est nettement prépondérante dans les MAT.

Caractéristiques en anatomo-pathologie :

Sur la biopsie rénale, d'un point de vue anatomo-pathologique, l'altération endothéliale s'étend de l'artériole afférente au flocculus glomérulaire. Toutefois, l'intensité et la diffusion des lésions sont très variables au sein d'une même biopsie. L'atteinte des tubes et de l'interstitium est constante, souvent sévère, avec nécrose épithéliale tubulaire et œdème interstitiel. Les glomérules atteints sont volumineux, avec des flocculus denses et des lumières capillaires peu visibles. Les parois capillaires sont épaissies en raison de l'élargissement de l'espace sous-endothélial. Les cellules endothéliales sont très turgescentes et bombent dans la lumière capillaire. Les cellules mésangiales sont aussi turgescentes, mais ne prolifèrent pas. La matrice extracellulaire mésangiale est œdémateuse et fibrillaire. Son expansion dans l'espace sous-endothélial donne, sur les imprégnations argentiques, un aspect en double contour à la paroi capillaire périphérique. L'œdème mésangial est parfois si important que la matrice extracellulaire est raréfiée réalisant au maximum un aspect de mésangiolyse. Certaines lumières glomérulaires sont obstruées par des hématies agglutinées, des polynucléaires et des thrombi plaquettaires ou fibrineux. Les podocytes ont un cytoplasme abondant, chargé de gouttelettes hyalines et de vacuoles. L'atteinte de l'artériole pré-glomérulaire est constante et réalise au maximum des thromboses fibrineuses ou faites d'hématies

agglutinées, de matériel hyalin et de débris cellulaires. En résumé, l'analyse morphologique montre que la lésion endothéliale est constante et primordiale et que la thrombose n'est que la conséquence de cette dernière. L'immunofluorescence montre surtout la présence de fibrine le long des parois glomérulaires et, de façon plus intense, dans les thromboses glomérulaires et artériolaires. Des filaments endomembraneux d'IgM, de C3 et de C1q sont souvent présents dans les glomérules ainsi que dans les lumières et les parois artériolaires [11].

Figure 2 : Classification des microangiopathies thrombotiques en fonction de l'activité ADAMTS 13 (Coppo P 2005, Sadler JE. 2008) [10].

VIH : virus de l'immunodéficience humaine. SCAP : syndrome catastrophique des antiphospholipides, TIH : thrombopénie induite par l'héparine, MVO : maladie veino-occlusive, CIVD : coagulation intravasculaire disséminée

A ce jour, les atteintes rénales dans la MC pédiatrique n'ont jamais été décrites précisément. Dans cette étude, nous rapportons quatre cas français de MCM pédiatrique idiopathique avec atteinte rénale secondaire à une microangiopathie thrombotique. Ce travail a été valorisé par une publication dans la revue *Pediatric Blood and Cancer* en février 2018 et par un poster présenté à la Société Française de Néphrologie Pédiatrique en novembre 2017. L'article dans sa version publiée et le poster sont fournis en annexe.

VIII. Matériel et Méthodes

Suite au diagnostic d'un cas rennais de MCM, nous avons, *via* la *mailing list* de la société française de néphrologie pédiatrique, recueilli tous les cas pédiatriques français de MCM avec atteinte rénale. Nous présentons ci-après le détail de chacun des cas : le premier cas diagnostiqué et suivi au CHU de Saint Pierre de la Réunion, le deuxième cas au CHU de Rennes, le troisième cas au CHU Necker/Enfants malades de Paris et le quatrième cas au CHU Robert Debré de Paris. Pour chacun des cas, les consentements pour la participation à l'étude des enfants et des titulaires de l'autorité parentale ont été recueillis avant publication.

IX. Résultats

Pour tous les cas présentés ci-après, les caractéristiques cliniques, biologiques, radiologiques, les traitements et complications sont résumés dans le tableau 1.

1) CAS n°1 :

Un garçon de 17 ans a été admis en urgences au CHU de Saint Pierre de la Réunion pour fièvre, diarrhée et vomissements (dans un contexte de prise d'un traitement par anti-inflammatoire non stéroïdiens). Les analyses biologiques retrouvaient une insuffisance rénale aiguë, un syndrome néphrotique impur et anémie microcytaire arégénérative avec présence de schizocytes. La tomodensitométrie mettait en évidence un épanchement pleural gauche, un épanchement péricardique, une hépato-splénomégalie et des adénopathies cervicales, axillaires et latéro-aortiques gauche. Le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire permettaient d'éliminer le diagnostic de lymphome. L'analyse histologique d'une adénopathie cervicale était en faveur d'une prolifération plasmocytaire profuse compatible avec une MCM dans sa forme dite "à prolifération plasmocytaire" (Figure 3A, images 1,2). La sérologie VIH était négative tout comme la PCR HHV8. La PCR EBV était positive avec 900 copies/ml. La sérologie EBV était en faveur d'une infection ancienne (Ac anti VCA et EBNA IgG positifs, Ac anti VCA de type IgM négatifs). La

ponction biopsie rénale retrouvait des lésions de microangiopathie thrombotique (MAT) avec mésangiolyse et occlusion artériolaire (Figure 3A, image 3,4).

Le patient a été traité par un bolus intraveineux de méthylprédnisolone ($1\text{g}/1,73\text{m}^2$) associé à une injection d'étoposide ($100\text{ mg}/\text{m}^2$) suivi de quatre injections de rituximab ($375\text{mg}/\text{m}^2/\text{semaine}$). La corticothérapie a ensuite été relayée *per os* à la dose initiale de $1\text{mg}/\text{kg}/\text{jour}$, régulièrement diminuée pour atteindre $3\text{ mg}/\text{jour}$ après 6 mois de traitement. La corticothérapie a été arrêtée définitivement après 9 mois de traitement sans rechute à ce jour. La créatinine a atteint le maximum de $330\mu\text{mol}/\text{L}$ à J21. Le taux de créatinine était de $88\mu\text{mol}/\text{L}$ à M6 (clairance CKD EPI : $110\text{ml}/\text{min}$). L'hypertension artérielle a été efficacement traitée par l'association d'un inhibiteur calcique, de furosémide et d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion.

2) CAS n°2

Une fille de 14 ans a été admise en urgences au CHU de Rennes pour des vomissements associés à des douleurs des fosses lombaires, une hypertension artérielle, une fièvre et des adénopathies cervicales. Les analyses biologiques retrouvaient une insuffisance rénale aiguë, un syndrome néphrotique et une anémie modérée avec présence de schizocytes. L'échographie confirmait de nombreuses adénopathies cervicales bilatérales, mais aussi axillaires et sus-claviculaires associées à une hépatosplénomégalie et une ascite modérée. La tomodensitométrie confirmait un tableau d'anasarque avec un épanchement pleural bilatéral, péricardique et abdominal ainsi que la présence d'adénopathies retro-péritonéales. Le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire permettaient d'éliminer le diagnostic de lymphome. L'analyse histologique d'une adénopathie cervicale était compatible avec une MCM dans sa forme vasculo-hyaline. La sérologie VIH était négative tout comme les PCR HHV8 et EBV. La sérologie EBV était en faveur d'une infection ancienne. La ponction biopsie rénale mettait en évidence des lésions de MAT avec mésangiolyse et occlusions artériolaires avec dépôts de C3 (Figure 3B, image 1,2).

La patiente a été traitée par trois bolus de méthylprédnisolone ($1\text{g}/1,73\text{m}^2$) relayés par une corticothérapie orale à la dose quotidienne initiale de $1\text{mg}/\text{kg}$ régulièrement diminuée pour atteindre $0,1\text{mg}/\text{kg}/\text{jour}$ après 6 mois de traitement. La corticothérapie a été arrêtée définitivement après 8 mois de traitement, sans rechute à ce jour. Le taux de créatinine était normalisé après 3 mois de traitement. L'hypertension artérielle a été contrôlée initialement par un inhibiteur calcique remplacé secondairement par un inhibiteur de l'enzyme de conversion pour favoriser l'action de néphroprotection.

3) CAS n°3

Une fille de 16 ans a été admise en urgences au CHU Necker/enfants malade de Paris pour des céphalées avec asthénie, hypertension artérielle, fièvre et œdème diffus. Les analyses biologiques montraient une anémie microcytaire arégénérative avec présence de schizocytes et une insuffisance rénale aiguë avec syndrome néphrotique. La tomodensitométrie mettait en évidence une anasarque avec un épanchement pleural bilatéral, péricardique et abdominal, une hépatosplénomégalie et des adénopathies retro-péritonéales. Le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire étaient normaux. L'analyse histologique d'une adénopathie cervicale était en faveur d'une MCM dans sa forme vasculo-hyaline (Figure 3C, image 1,2). La sérologie VIH était négative tout comme la PCR HHV8. La PCR EBV était positive avec 5000 copie/ml avec une sérologie compatible avec une infection ancienne. La ponction biopsie rénale retrouvait des lésions de MAT avec mésangiolyse, des dépôts d'IgM, de C3 et de C1q ainsi qu'un épaississement de la membrane basale glomérulaire donnant un aspect de double contours sans prolifération extra-capillaire sur les glomérules étudiés (Figure 3C, image 3,4). L'immunofixation HHV8 était négative sur l'échantillon étudié.

La patiente a été traitée initialement par 5 séances de plasmaphérèse de J4 à J10 et 24h d'hémodiafiltration à J10 devant la persistance de l'anurie et l'évolution défavorable du syndrome œdémateux généralisé. Après la confirmation du diagnostic de MCM, la patiente a reçu un traitement par corticoïdes *per os* à la dose initiale de 1mg/kg/jour associé à la trétinoïne 30mg 2 fois par jour pendant 5 mois. La dose de corticoïde a été régulièrement diminuée pour atteindre 0,25mg/kg/jour après 6 mois de traitement puis définitivement arrêtée après 30 mois de traitement sans rechute à ce jour. La créatinine a atteint le maximum de 279µmol/L à J10. Le taux de créatinine était à 71µmol/L à J40. L'hypertension artérielle a été contrôlée par l'association d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion et d'un inhibiteur calcique.

4) CAS n°4

Une fille de 14 ans a été admise en urgence au CHU Robert Debré de Paris pour dyspnée, douleurs abdominales avec diarrhées, syndrome œdémateux généralisé avec prise de poids de 4kg et fièvre. Les analyses biologiques montraient une anémie microcytaire arégénérative avec présence de schizocytes, une thrombopénie et insuffisance rénale aiguë. La tomodensitométrie confirmait

l'anasarque avec un épanchement pleural bilatéral, une volumineuse ascite, une hépatosplénomégalie et des adénopathies cervicales, axillaires et abdominales (mésentériques et péri-iliaques multiples). La tomographie par émission de positons (TEP-TDM) montrait un hypermétabolisme modéré des adénopathies. Le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire étaient normaux permettant d'exclure le diagnostic de lymphome. L'analyse histologique d'une adénopathie cervicale était compatible avec une MCM dans sa forme vasculo-hyaline (Figure 3D, image 1,2). L'analyse en immunofluorescence de l'adénopathie était négative pour le virus EBV. Les sérologies VIH et EBV étaient négatives. Les PCR HHV8 et EBV étaient négatives. Il existait une élévation significative du niveau sanguin d'interleukine 6 (IL-6) à 28,9pg/ml, (valeur normale inférieure à 7pg/ml). La ponction biopsie rénale révélait des lésions de MAT avec mésangiolyse et dépôts d'IgM sans prolifération extra-capillaire sur les glomérules étudiés (Figure 3D, image 3,4).

La patiente a été traitée par une corticothérapie orale débutée à la dose initiale de 2 mg/kg/jour. Devant l'absence d'amélioration, un traitement par rituximab (4 injections de 375mg/m²/semaine) a été initié à J10 permettant une nette amélioration clinique. La dose de corticoïde a été régulièrement diminuée puis stoppée dès J15. Les niveaux sériques de créatinine étaient normalisés après un mois de traitement sans rechute à ce jour. L'hypertension artérielle a été contrôlée par un inhibiteur calcique.

Tableau 1 : Caractéristiques des patients (*Cousin E et al 2018*))

	Cas n°1	Cas n°2	Cas n°3	Cas n°4
Age	17 ans	14 ans	16 ans	14 ans
Genre	Garçon	Fille	Fille	Fille
Symptômes	Diarrhées Vomissements Œdèmes HTA Fièvre Polyadénopathie Hépatosplénomégalie	Vomissements Œdèmes HTA Douleurs lombaires Fièvre Polyadénopathie Hépatosplénomégalie	Céphalées Vomissements Œdèmes Oligurie HTA Douleurs lombaires Fièvre Polyadénopathie Hépatosplénomégalie	Dyspnée Œdèmes Oligurie Douleurs abdominales Diarrhées Fièvre Polyadénopathie Hépatosplénomégalie
Résultats biologiques				
Hémoglobine (g/dl) [12-15]	10.7	11.8	9.3	5.6
Plaquettes (G/l) [140-400]	165	219	186	150
Schizocytes [négatif]	positif	positif	positif	négatif
Créatinine (μmol/l) [40-68]	181	90	165	113
Urée (mmol/l) [2.5-7.5]	23	8.9	12	17.4
Protéinurie (g/l) [0-0.15]	1.58	4.5	2.89	0.67

Albumine (g/l) [>35]	23.6	20	24.5	24
Tests autoimmuns				
Complément	normal	normal	normal	normal
Anticorps anti-nucléaire	négatif	négatif	négatif	négatif
ANCA	négatif	négatif	négatif	négatif
Myélogramme et biopsie ostéomédullaire	lymphome écarté	lymphome écarté	lymphome écarté	lymphome écarté
Tomodensitométrie	Ascite Epanchement pleural Epanchement péricardique	Ascite Epanchement pleural bilatéral Epanchement péricardique	Ascite Epanchement pleural bilatéral Epanchement péricardique	Ascite Epanchement pleural bilatéral Polyadenopathie abdominale
Biopsie ganglionnaire	Prolifération plasmocytaire	Forme vasculo-hyaline	Forme vasculo-hyaline	Forme vasculo-hyaline
Biopsie rénale	Lésions diffuses de MAT avec mésangiolyse et occlusion vasculaire	Lésions diffuses de MAT avec mésangiolyse et dépôts de C3 sans prolifération extra-capillaire	Lésions diffuses de MAT avec épaississement de la membrane basale glomérulaire et aspect de double contours, mésangiolyse et dépôts d'IgM, C3 et C1q sans prolifération extra-capillaire	Lésions diffuses de MAT avec mésangiolyse et dépôts d'IgM sans prolifération extra-capillaire

Traitement initial	1 bolus de méthylprédnisolone IV 1g/1.73m ² puis prédnisolone PO 1mg/kg/jour Etoposide 100mg/m ² 4 dose de Rituximab : 375mg/m ² /semaine	3 bolus de méthylprédnisolone IV 1g/1.73m ² puis prédnisolone PO 1mg/kg/jour	5 séances de plasmaphérèse de J4 à J10 pour traiter la MAT Hémodiafiltration 24 heures devant la persistance de l'anurie et l'évolution défavorable du syndrome œdémateux	Corticothérapie : prédnisolone PO 2mg/kg/jour puis 4 doses de Rituximab 375mg/m ² /semaine devant l'absence d'amélioration
Complications	PRES syndrome	Péritonite Hyperkaliémie transitoire Diabète induit par la corticothérapie	Embolie pulmonaire Infection de cathéter central Hyperkaliémie transitoire HTIC	Aucune
Evolution	Corticothérapie : 3mg/jour à M6, arrêt complet à M9 sans rechute Créatinine normalisée à 1 an de suivi	Corticothérapie : 0.1 mg/kg/jour à M6 et arrêt complet à M8 sans rechute. Créatinine normalisée à 3 mois de suivi	Corticothérapie : 0.25mg/kg à M6 et arrêt complet à M30 sans rechute Créatinine normalisée à 2 mois de suivi	Arrêt de la corticothérapie à J15 sans rechute Créatinine normalisée à 1 mois de suivi
Traitement HTA	Inhibiteur calcique Furosémide Inhibiteur de l'enzyme de conversion	Inhibiteur calcique finalement remplacé par un inhibiteur de l'enzyme de conversion	Inhibiteur du SRAA et inhibiteur calcique	Inhibiteur calcique

Figure 3 : Coupes histologiques des adénopathies et biopsies rénales pour chacun des cas (*Cousin E et al 2018*)

Légende figure 3 :

(A) Cas n°1: coupe histologique de biopsie rénale montrant des lésions de MAT et biopsie ganglionnaire, (1) occlusion de la lumière d'une artériole rénale par un épaissement mixoïde de l'intima (Masson's trichrome stain, $\times 200$), (2) glomérule avec mésangiolyse diffuse (Jones Method, $\times 400$), (3) hyperplasie folliculaire en "bulbe d'oignon" (Hematoxylin/Eosin (H&E) stain, $\times 100$), (4) prolifération plasmocytaire interfolliculaire.

(B) Cas n°2 : coupe histologique de biopsie rénale montrant des lésions de MAT : (1) paroi capillaire épaissie avec dépôts transparents sous-endothéliaux (Masson's trichrome stain, $\times 200$), (2) (Marinozzi staining, $\times 400$);

(C) Cas n°3 : coupe histologique de biopsie rénale montrant des lésions de MAT et biopsie ganglionnaire (1) glomérule avec mésangiolyse diffuse (Masson's trichrome stain, $\times 200$), (2) (Jones Method, $\times 400$), (3) hyperplasie folliculaire en "bulbe d'oignon" (H&E stain, $\times 200$), (4) prolifération plasmocytaire interfolliculaire (H&E stain, $\times 400$)

(D) Cas n°4 : coupe histologique de biopsie rénale montrant des lésions de MAT et biopsie ganglionnaire : (1,2) glomérules avec mésangiolyse diffuse (periodic acid-Schiff $\times 200$ /JonesMethod, $\times 200$), (3,4) hyperplasie folliculaire en bulbe d'oignon (H&E stain, $\times 100$ /Masson's trichrome stain, $\times 100$)

X. Discussion

Nous rapportons quatre cas français de MCM pédiatrique idiopathique avec atteinte rénale secondaire à une MAT. Les analyses histologiques des biopsies ganglionnaires étaient compatibles avec une forme vasculo-hyaline dans trois cas et montraient une prolifération plasmocytaire dans un cas. D'un point de vu anatomo-pathologique, le diagnostic de MC doit rester un diagnostic d'exclusion et nécessite des analyses immunohistochimiques, de cytométrie en flux et de génétique moléculaire rigoureuses. La mise en corrélation de ces résultats avec l'examen clinique, avec les données biologiques et radiologiques est essentielle pour écarter les autres hémopathies bénignes ou malignes. Le diagnostic de MC sera retenu devant l'absence d'argument histologique en faveur d'un lymphome et devant l'absence de prolifération clonale [12].

La MC pédiatrique est une pathologie rare. *Parez et al.* [2] ont rapporté 83 cas dont 46 filles et 37 garçons âgés de 2 mois à 17 ans (des adolescents dans la majorité des cas). Le motif de recours aux soins était l'apparition d'une polyadénopathie pour 21 patients (26%) et une altération de l'état général pour 35 patients (45%). La MC était localisée pour 72 patients (87%) et multicentrique pour 11 patients (13%). Trente-deux patients présentaient une forme vasculo-hyaline, 14 patients (24%) présentaient une forme à prolifération plasmocytaire et 13 patients (22%) présentaient une forme mixte. Dans cette étude, les auteurs ne donnent pas de description d'atteinte rénale.

Chez l'adulte, l'atteinte rénale en cas de MC est exceptionnelle dans les formes localisées mais parfois décrite dans les formes multicentriques. Les atteintes rénales se manifestent le plus souvent par une protéinurie modérée associée à une insuffisance rénale aiguë modérée. La biopsie rénale est rarement réalisée. Les données de la littérature rapportent des lésions rénales très hétérogènes dans la MCM avec par ordre de fréquence : des amyloses rénales, des MAT, des glomérulonéphrites avec prolifération mésangiale, des glomérulonéphrites membranoprolifératives, des glomérulonéphrites avec prolifération extra-capillaire, des néphropathies tubulo-interstitielles et des néphropathies à lésions glomérulaires minimales [12,13]. Pour les 4 cas rapportés dans notre étude, la biopsie rénale a été réalisée devant la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë. Elle mettait en évidence des lésions de MAT dans tous les cas avec mésangiolyse, occlusion vasculaire et des dépôts sous-endothéliaux pour 3/4 cas (C3 pour le cas n°2; IgM, C3, et C1q pour le cas n°3; IgM pour le cas n°4). Sur les échantillons étudiés, il n'existait pas de prolifération extra-capillaire.

Pour les quatre cas pédiatriques présentés, la MCM n'était pas associée à une infection par le VIH ou HHV8 et les tests biologiques ne révélaient pas d'anomalie du bilan autoimmunitaire. Dans la littérature chez l'adulte, une infection par HHV8 existe dans approximativement 50% des cas pour

les patients VIH négatifs. De nombreux dérivés géniques issus de HHV8 incluant le vIL-6 (*viral homolog of human IL-6*) sont exprimés au cours du cycle lytique de réplication du virus HHV8. Il apparaît donc pertinent de tester des thérapies antivirales dans le traitement de la MCM en particulier chez les patients présentant une charge virale HHV8 détectable [14]. Nous avons aussi pu mettre en évidence une réactivation du virus EBV dans deux des cas présentés. Quelques articles rapportent une association entre MC et infection à EBV [15]. Cependant, de faibles niveaux de réplication de l'EBV dans le sang existent souvent chez les patients atteints de maladies systémiques et le virus n'a pas été détecté sur les échantillons de ganglions lymphatiques.

L'IL-6 est un acteur majeur dans la physiopathologie de la MCM. Il s'agit d'une cytokine pro-inflammatoire pléiotropique impliquée dans la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, dans l'activation des lymphocytes T en lymphocytes Th17, dans l'inhibition des lymphocytes T régulateur et dans la croissance des cellules tumorales de plasmocytome. La production d'IL-6 induit aussi la synthèse des protéines hépatiques de la phase aigüe de l'inflammation. Elle est aussi impliquée dans l'hématopoïèse en stimulant la formation de colonies granulocytaires et monocytaires et en favorisant la maturation des mégacaryocytes. Elle semble jouer un rôle physiopathologique majeur au cours de la MCM de type plasmocytaire : i) les taux sériques d'IL-6 chez les patients atteints sont élevés; ii) l'ablation complète des masses ganglionnaires conduit à la guérison et à l'effondrement des taux d'IL-6 circulants [16] ; iii) le traitement par un anticorps monoclonal anti-IL-6 est efficace sur les manifestations cliniques et biologiques [17] ; iv) l'hyperexpression d'IL-6 chez la souris induit un tableau proche du syndrome de Castleman multicentrique [18]. L'IL-6 provient essentiellement des ganglions atteints. Ces ganglions produisent également de l'IL-6 *in vitro* [16]. La présence d'IL-6 en immunohistochimie est détectée surtout dans les centres germinatifs des follicules hyperplasiques, et de façon plus discrète et éparse, dans les zones interfolliculaires. Les taux élevés d'IL-6 au cours de la MCM de type plasmocytaire pourraient donc expliquer la prolifération plasmocytaire ganglionnaire, l'hypergammaglobulinémie et le syndrome inflammatoire clinique et biologique [12].

Dans tous les cas présentés, les biopsies rénales mettaient en évidence des lésions secondaires à une MAT diffuse. Dans la littérature, les atteintes rénales associées à la MCM de l'adulte sont décrites dans 25 à 54%. Dans deux études rétrospectives concernant les biopsies rénales de patients atteints de MCM VIH négatif, les lésions de MAT concernaient 15 cas sur 26 [19, 20, 21]. Il a été suggéré que la MAT dans la MC était en lien avec une augmentation du VEGF (*vascular endothelial growth factor*) secondaire à l'augmentation de production folliculaire de l'IL-6 (rapportée dans le cas n°4) [12]. Les taux élevés de VEGF et IL-6 circulant [22] induisent une augmentation de la perméabilité des capillaires rénaux à l'origine de l'anasarque (ascite,

épanchement pleuraux, péricardite), de l'œdème mésangial et d'une dysfonction endothéliale. L'extravasation de macromolécules et des cellules sanguines forment des dépôts péri-capillaires qui expliquent la dissection de la paroi vasculaire et l'aggrégation plaquettaire entraînant la MAT. Cependant, le lien exact entre la MC et la production glomérulaire de VEGF reste à approfondir. Une autre explication à l'apparition de la MAT dans la MC pourrait être l'existence d'un purpura thrombotique et thrombocytopénique. Cette maladie résulte de l'existence d'anticorps dirigés contre la protéine ADAMTS13 (*a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type 1 repeats-13*), responsable du clivage des multimères de facteur Willebrand (FW) de haut poids moléculaire. La dysfonction enzymatique aboutit à l'accumulation de multimères de FW mal clivés et hyperadhérents responsables de la formation de microthrombi à l'origine de la MAT (Figure 2) [23]. London *et al* [24] rapportent 4 cas de MAT associée à une MCM (HHV8 positive) avec une activité ADAMTS13 effondrée inférieure à 5% et présence d'anticorps dirigés contre la protéine ADAMTS 13.

Pour tous les cas présentés dans ce travail, le traitement étiologique de la MC a permis une amélioration rapide de la défaillance rénale. Concernant la prise en charge thérapeutique, la corticothérapie a été prescrite dans tous les cas. Dans la littérature, 21 cas de MCM pédiatrique ont bénéficié d'un traitement par corticoïdes seuls et une réponse favorable a été obtenue chez 80% des patients traités, mais les rémissions complètes étaient rares ou transitoires, avec un taux élevé de rechutes [1,2, 8]. La corticothérapie peut aussi être associée à d'autres thérapeutiques. L'étoposide est un inhibiteur de topoisomérase II. Cette molécule peut être utilisée, en monothérapie ou combinée, à la dose de 50 à 100 mg/jour soit 75 mg/m²/j (dose maximale : 150 mg/m²/j) en prise orale de J1 à J7 d'un cycle de 14 jours, renouvelable jusqu'à efficacité maximale. Ce traitement peut aussi être administré par voie intraveineuse à la dose de 100 mg/m² la première semaine d'un cycle de quatre. Ce traitement peut être poursuivi si besoin, en l'absence de toxicité. Dans le troisième cas, la trétinoïne a été utilisée en association avec la corticothérapie à la dose de 30 mg deux fois par jour (45 mg/m²). La trétinoïne est un bloqueur du récepteur à l'IL-6 et induit une diminution de la production du VEGF. Une seule étude rapporte l'utilisation de cette molécule dans le traitement de la MC [25].

Malgré le manque de données robustes dans la littérature, le rituximab est considéré comme la première ligne de traitement dans la MCM par "*The National Comprehensive Cancer Network guidelines*" (www.nccn.org). Ce traitement agit comme immunosuppresseur et réduit fortement les populations de lymphocytes B [23,24]. Van Rhee *et al* recommandent entre 4 et 8 injections hebdomadaires à 375mg/m² chez l'adulte soit des doses quatre fois supérieures à celles administrées pour les cas 1 et 4. Etant donné le délai de réponse variable après injection, il est recommandé d'associer initialement des bolus intraveineux de corticoïdes (méthylprednisolone

1g/1,73m²) pour les formes les plus sévères. Pour ces patients, un relais par corticoïdes oraux pourra être envisagé à la dose de 1mg/kg/jour. Chez les patients non répondeurs à cette première ligne de traitement ou en cas de rechute rapide, l'utilisation des anticorps monoclonaux tels que le siltuximab [26-28] ou le tocilizumab [29] ciblant le récepteur à l'IL-6 apparaît comme une bonne alternative. En 2012, *Galeotti et al* rapportent 2 cas de maladie de Castleman multicentrique mise en rémission prolongée suite au traitement par tocilizumab administré à la dose 8 mg/kg initialement toutes les 2 semaines pendant 10 mois [27]. En cas d'inefficacité de cette deuxième ligne de traitement ou en cas d'évolution rapidement défavorable de la MC, l'utilisation de chimiothérapies combinées à base de cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prédnisone ou combinant cyclophosphamide, vincristine et prédnisone sans rituximab ont permis d'obtenir des rémissions prolongées pour des patients réfractaires. A l'heure actuelle, de tels protocoles n'ont jamais été évalués dans ces indications chez l'enfant et aucune donnée n'existe en cas de défaillance rénale associée (Figure 4).

Figure 5 : Algorithme thérapeutique pour la prise en charge du syndrome de Castleman multicentrique idiopathique de l'adulte (Van Rhee F et al 2018)

XI. Conclusion

L'atteinte rénale dans la MCM pédiatrique est rare et secondaire à des lésions de MAT dans tous les cas décrits. Bien que l'atteinte puisse être sévère initialement, la fonction rénale s'est améliorée rapidement suite au traitement étiologique de la MCM par la corticothérapie associée au rituximab pour les cas 1 et 4, sans reprise évolutive jusqu'à ce jour. Il est néanmoins souhaitable de proposer un suivi à long terme de la fonction rénale pour s'assurer de l'absence de maladies rénales progressives comme observées dans les MAT d'autres étiologies de l'enfant. L'efficacité et la place de l'utilisation des anticorps anti IL6 dans la population pédiatrique reste à définir.

XII. Références

- [1]. Smir BN, Greiner TC, Weisenburger DD. Multicentric angiofollicular lymph node hyperplasia in children. A clinicopathologic study of eight patients. *Modern Pathol.* 1996;9:1135–1142.
- [2]. Perez N, Bader-Meunier B, Roy CC, Dommergues JP. Paediatric Castleman disease : report of seven cases and review of the literature. *Eur J Pediatr.* 1999;158:631–637.
- [3] Gherardi RK, Malapert D, Degos JD. Castleman disease-POEMS syndrome overlap. *Ann Intern Med.* 1991 Mar 15;114(6):520-1.
- [4] Zhang L, Cao XX, Wang SJ, Zhou DB, Li J. Clinical Features of Patients with Castleman's Disease Complicated Systemic Lupus Erythematosus. *Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao.* 2016 Oct 10;38(5):543-547
- [5] Dei-Adomakoh YA, Quarcoopome L, Abrahams AD, Segbefia CI, Dey DI. Sjögren's and plasma cell variant Castleman disease: a case report. *Ghana Med J.* 2018 Mar;52(1):61-65.
- [6] Dispenzieri A. (2008) Castleman Disease. In: Ansell S.M. (eds) *Rare Hematological Malignancies*. Springer, Boston, MA
- [7] Wang HW, Pittaluga S, Jaffe ES. Multicentric Castleman disease: where are we now?. *Semin Diagn Pathol.* 2016;33:294–306.
- [8]. Farrugia P, Trizzino A, Scibetta N, et al. Castleman's disease in childhood: report of three cases and review of the literature. *Ital J Pediatr.* 2011;37:50.
- [9] Soumerai JD, Sohani AR, Abramson JS. Diagnosis and management of Castleman disease. *Cancer Control.* 2014;21:266–278.
- [10] Coppo P, Veyradier A, Thrombotic microangiopathies: physiopathology, diagnosis, treatment *Réanimation* 14 (2005) 594–603
- [11] Droz D, Nochy D, Noël LH, et al, Thrombotic microangiopathies: renal and extrarenal lesions. *Adv Nephrol Necker Hosp.* 2000;30:235-59. Review.
- [12] Rieu P, Noel LH, Droz D, et al. Atteintes glomérulaires au cours des syndromes lymphoprolifératifs avec production excessive de cytokines (Castelman, POEMS). *Adv Nephrol Necker Hosp.* 2000;30:305–331.
- [13] El Karoui K, Vuiblet V, Dion D, et al. Renal involvement in Castleman disease. *Nephrol Dial Transplant.* 2011;26:599–609.
- [14] Uldrick TS, Polizzotto MN, Aleman K, et al. High-dose zidovudine plus valganciclovir for Kaposi sarcoma herpesvirus-associated multicentric Castleman disease: a pilot study of virus-activated cytotoxic therapy. *Blood.* 2011;117:6977–6986.

- [15] Chan KH, Lade S, Prince HM, Harrison SJ. Update and new approaches in the treatment of Castleman disease. *PJ Blood Med*. 2016;7:145–158.
- [16] Yoshizaki K, Matsuda T, Nishimoto N et al Pathogenic significance of interleukin-6 (IL-6/BSF-2) in Castleman's disease. *Blood*, 1989, 74, 1360-1367.
- [17] Beck JT, Hsu SM, Wijdenes J et al. Brief report : alleviation of systemic manifestations of Castleman's disease by monoclonal anti-interleukine-6 antibody. *N Engl J Med*, 1994, 330, 602-605.
- [18] Brandt SJ, Bodine DM, Dunbar CE, Nienhuis AW, Dysregulated interleukin 6 expression produces a syndrome resembling Castleman's disease in mice. *J Clin Invest*, 1990, 86, 592-599.
- [19] Flahault A, Vignon M, Rabant M, et al. Case report and literature review: glomerular and neurologic thrombotic microangiopathy as a primary manifestation of multicentric Castleman disease. *Medicine (Baltimore)*. 2016;95: e5047.
- [20] Xu D, Lv J, Dong Y, et al. Renal involvement in a large cohort of Chinese patients with Castleman disease. *Nephrol Dial Transplant*. 2012;27(suppl 3): iii119–iii125.
- [21] Jourde-Chiche N, Dussol B, Daniel L. Kidney involvement in hematologic malignancies. Diagnostic approach. *Rev Med Interne*. 2010;31:685–696.
- [22] Mutneja A, Cossey N, Liapis N, A rare case of renal thrombotic microangiopathy associated with Castleman's disease *BMC Nephrol*. 2017; 18: 57.
- [23] Sadler JE. Von Willebrand factor, ADAMTS13, and thrombotic thrombocytopenic purpura, *Blood* 2008 112:11-18
- [24] London J, Boutboul D, Agbalika F, et al. Autoimmune thrombotic thrombocytopenic purpura associated with HHV8-related multicentric Castleman disease. *Br J Haematol*. 2017;178:486–488.
- [25] Rieu P, Droz D, Gessain A, Grünfeld JP, Hermine O. Retinoic acid treatment of multicentric Castleman disease. *Lancet*. 1999;354:1262–1263.
- [26] Robinson D Jr, Reynolds M, Casper C, et al. Clinical epidemiology and treatment patterns of patients with multicentric Castleman disease: results from two UC treatment centers. *BR J Haematol*. 2014;165:39-48.
- [27] Van Rhee F, Greenway A, Stone K. Treatment of Idiopathic Castleman Disease. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2018 Feb;32(1):89-106. doi: 10.1016/j.hoc.2017.09.008. Review.
- [28] Fajgenbaum DC, Kurzrock R. Siltuximab: a targeted therapy for idiopathic multicentric Castleman disease. *Immunotherapy*. 2016;8:17–26.
- [29] Lyseng-Williamsom KA. Siltuximab: a review in idiopathic (human herpesvirus-8-negative) multicentric Castleman disease. *Bio- Drug*. 2015;29:399–406.

[30] Galeotti C, Boucheron A, Guillaume S et al, Sustained remission of multicentric Castleman disease in children treated with tocilizumab, an anti-interleukin-6 receptor antibody. Mol Cancer Ther. 2012 Aug;11(8):1623-6.

Sites internet :

Centre de référence maladie rare : maladie de Castleman : <http://www.castleman.fr>

XIII. Annexe 1 : Schema d'un ganglion lymphatique

Cortex : zone de prolifération et de différenciation des lymphocytes B

1. follicules lymphoïdes primaires : petit amas de cellules lymphoïdes essentiellement T avec quelques macrophages
 2. follicules lymphoïdes secondaires : contenant les centres germinatifs apparaissant après stimulation antigénique, constitués de cellules lymphoïdes B.
- zone sombre périphérique contenant les centroblastes (manteau)
 - zone claire contenant des centrocytes (lymphocytes B activés), macrophages et cellules dendritiques folliculaires (cellules présentatrices d'antigènes).
 - différenciation des lymphocytes B
 - cellules B mémoire
 - plasmocytes qui migrent dans la médulla

Para cortex : tissu lymphoïde diffus composé de lymphocytes T et de cellules interstitielles

- Présence de veinules post capillaires
- Site d'induction des réponses cellulaires T

Médulla : cordons cellulaires comportant des lymphocytes et des plasmocytes.

XIV. Annexe 2 Article publié dans la revue *Pediatric Blood and Cancer*

Cousin E, Flodrops H, Boyer O, et al. Renal failure in pediatric Castleman disease: Four French cases with thrombotic microangiopathy. Pediatr Blood Cancer. 2018;65:e27045.

BRIEF REPORT

Renal failure in pediatric Castleman disease: Four French cases with thrombotic microangiopathy

Elie Cousin¹ | Hugues Flodrops² | Olivia Boyer³ | Julien Hogan⁴ | Mahe Ruin² | Anne Couderc⁴ | Jean-Michel Goujon⁵ | Sophie Taque¹

¹Department of Pediatrics, Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, Rennes, France

²Department of Pediatrics, Centre Hospitalier Universitaire Saint Pierre de la Réunion, Saint Pierre, France

³Department of Pediatric Nephrology, Centre Hospitalier Universitaire Necker-Enfant Malades, APHP, Institut Imagine, Université Paris Descartes, Paris, France

⁴Department of Pediatric Nephrology, Centre Hospitalier Universitaire Robert Debré, assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP), Paris, France

⁵Department of Pathology, Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, Poitiers, France

Correspondence

Elie Cousin, Service Pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire de Rennes Hôpital Sud, 16 boulevard de Bulgarie, 35200 Rennes, France.
Email: cousin.elie@live.fr

Abstract

Pediatric Castleman disease (CD) is an uncommon and poorly understood disorder of the lymph nodes. Renal failure has not been described in pediatric multicentric CD (MCD). We report four cases, who presented with polyadenopathy, organomegaly, edema and fluid accumulations, high blood pressure, and acute renal failure. In all cases, renal biopsy confirmed diffuse thrombotic microangiopathy. Definitive diagnosis of MCD was made by a biopsy of an affected lymph node located by computer tomography before initiation of corticosteroid therapy. Treatment of CD with corticosteroid therapy and rituximab was rapidly effective without relapse to date.

KEYWORDS

acute renal failure, pediatric Castleman disease, thrombotic microangiopathy

1 | INTRODUCTION

Pediatric Castleman disease (CD), or angiofollicular lymphoid hyperplasia, is a poorly understood disorder of the lymph nodes. This disease belongs to a group of atypical lymphoproliferative disorders, characterized by a hyperplastic reactive process involving the immune system.

There are two clinical types of CD: localized CD and multicentric form of CD (MCD). MCD is characterized by general symptoms such as fever, anemia, asthenia, polyadenopathy, organomegaly, edema, skin lesions, neurological symptoms (rarely), and sometimes renal failure and multiorgan failure. Associated biological findings include polyclonal hypergammaglobulinemia, anemia, thrombocytopenia, and autoimmune disorders in some instances. MCD may be associated with HIV or human herpesvirus 8 (HHV8) infections in adults, and pediatric cases have rarely been reported.^{1,2} There are three distinct histological types of MCD. The hyalinovascular type is characterized by small hyalinized follicle centers and prominent interfollicular vascular proliferation. The plasma cell type is characterized by an abundance of

plasma cells. Features of multiple types can be present in a so-called mixed type.³ The prognosis of this hematological disorder is poor, and treatment requires steroids and chemotherapy.⁴

Renal failure in pediatric CD has not been described precisely in the literature.^{1–4} We report four French cases of pediatric MCD with renal failure caused by diffuse thrombotic microangiopathy (TMA).

2 | RESULT

For each case, clinical, biological, radiological features, treatment, and complications are summarized in Table 1.

2.1 | Case no. 1

A 17-year-old male was admitted for acute renal failure, after taking ibuprofen for fever while suffering from gastroenteritis. Computed tomography scan showed left-sided pleural effusion, pericarditis, hepatosplenomegaly, and cervical, axillary, and left latero-aortic polyadenopathy. Bone marrow aspiration and biopsy excluded lymphoma. Cervical lymph node biopsy showed plasma cell proliferation

Abbreviations: CD, Castleman disease; MCD, multicentric Castleman disease; IL6, interleukin 6; TMA, thrombotic microangiopathy; VEGF, vascular endothelial growth factor

TABLE 1 Patient characteristics

	Case no. 1	Case no. 2	Case no. 3	Case no. 4
Age	17	14	16	14
Gender	Male	Female	Female	Female
Clinical features	Diarrhea Edematous syndrome High blood pressure Fever Polyadenopathy Hepatosplenomegaly	Vomiting Edematous syndrome High blood pressure Lumbar pain Fever Polyadenopathy Hepatosplenomegaly	Headache Vomiting Edematous syndrome Oliguria High blood pressure Lumbar pain Fever Polyadenopathy Hepatosplenomegaly	Dyspnea Edematous syndrome Oliguria Abdominal pain Diarrhea Fever Polyadenopathy Hepatosplenomegaly
Biological analyses				
Hemoglobin (g/dl) ¹²⁻¹⁵	10.7	11.8	9.3	5.6
Platelets (G/l) (140–400)	165	219	186	150
Schistocytes (negative)	Positive	Positive	Positive	Negative
Creatinine (μ mol/l) (40–68)	181	90	165	113
Urea (mmol/l) (2.5–7.5)	23	8.9	12	17.4
Proteinuria (g/l) (0–0.15)	1.58	4.5	2.89	0.67
Albumin (g/l) (>35)	23.6	20	24.5	24
Autoimmune tests				
Complement analysis	Normal	Normal	Normal	Normal
Nuclear antibodies	Negative	Negative	Negative	Negative
ANCA	Negative	Negative	Negative	Negative
Bone marrow aspiration and biopsy	Excluded lymphoma	Excluded lymphoma	Excluded lymphoma	Excluded lymphoma
Radiological findings (computed tomography scan)	Ascites	Ascites	Ascites	Ascites
	Pleural effusion Pericarditis	Pleural effusion Pericarditis	Pleural effusion Pericarditis	Pleural effusion Abdominal polyadenopathy
Lymph node biopsy	Plasma cells proliferation	Hyalinovascular form	Hyalinovascular form	Hyalinovascular form
Kidney biopsy	Lesions of diffuse thrombotic microangiopathy with mesangiolysis and arteriolar occlusion	Lesions of diffuse thrombotic microangiopathy with mesangiolysis and C3 deposits without extracapillary proliferation	Lesions of diffuse thrombotic microangiopathy with glomerular basement membrane thickening with double contours and mesangiolysis as well as immunoglobulin deposits (IgM, C3, and C1q), without extracapillary proliferation	Lesions of diffuse thrombotic microangiopathy with mesangiolysis and immunoglobulin deposits (IgM) without extracapillary proliferation
Initial treatment	One bolus of methylprednisolone IV 1 g/1.73m ² then PO 1 mg/kg/day Etoposide 100 mg/m ² Rituximab 375 mg/m ² /week $\times$ 4	Three bolus of methylprednisolone IV 1 g/1.73m ² then PO 1 mg/kg/day	Five plasmapheresis from D4 to D10 to treat microangiopathy Hemodiafiltration 24 hr due to persistent anuria and worsening edematous syndrome before resumption of plasmapheresis Prednisolone PO 1 mg/kg/day Tretinoin 30 mg twice daily	Prednisolone PO 2 mg/kg/day Then rituximab 375 mg/m ² /week $\times$ 4, because of the lack of improvement

(Continues)

TABLE 1 (Continued)

	Case no. 1	Case no. 2	Case no. 3	Case no. 4
Age	17	14	16	14
Gender	Male	Female	Female	Female
Complications	PRES	Peritonitis Transient hyperkalemia Steroid-induced diabetes mellitus	Pulmonary embolism Catheter-related bloodstream infection Transient hyperkalemia HTIC	None
Evolution	Prednisolone 3 mg/day at M6 and complete steroid withdrawal at M9 without any relapse	Prednisolone 0.1 mg/kg/day at M6 and complete steroid withdrawal at M8 without any relapse	Prednisolone 0.25 mg/kg at M6 and complete steroid withdrawal at M30 without any relapse	Stopped corticosteroid therapy at D15 without any relapse
	Normal creatinine level at 1 year follow-up	Normal creatinine level at 3 months follow-up	Normal creatinine level at 2 months follow-up	Normal creatinine level at 1 month follow-up
Blood pressure management	Calcium channel blocker furosemide, ACE inhibitor	Calcium channel blocker finally replaced by an ACE inhibitor	RAAS inhibitor and calcium channel blocker	Calcium channel blocker

ACE, Angiotensin-converting enzyme; ANCA, antineutrophil cytoplasmic antibody; D15, at day 15; IH, intracranial hypertension; M6, at 6 months; M9, at 9 months; M8, at 8 months; M30, at 30 months; PO, per os (orally); PRES, posterior, reversible encephalopathy syndrome; RAAS, Renin/angiotensin/aldosterone system.

compatible with MCD (Figure 1A, panels 1,2). HIV serology was negative, as was HHV8 blood polymerase chain reaction (PCR). Plasma Epstein Barr virus (EBV) viral load was detectable (900 copies/ml) with serology indicating past infection. Kidney biopsy revealed lesions of diffuse TMA with mesangiolysis and arteriolar occlusion (Figure 1A, panels 3,4).

Treatment consisted of one intravenous methylprednisolone pulse (1 g/1.73m²) along with one etoposide infusion (100 mg/m²), followed by four infusions of rituximab (375 mg/m²/week) and oral prednisolone therapy starting at 1 mg/kg/day.

2.2 | Case no. 2

A 14-year-old female was admitted for lower back pain, vomiting and fever with night sweats, hepatosplenomegaly, and cervical polyadenopathy. Computed tomography scan showed bilateral pleural effusion, pericarditis, and ascites and retroperitoneal adenopathy. Bone marrow aspiration excluded lymphoma. Cervical lymph-node biopsy showed hyperplastic follicles with increased interfollicular vascularity compatible with the hyalineovascular form of CD. HIV serology and HHV8 PCR were negative. Serology indicated past EBV infection. Renal biopsy revealed lesions of diffuse TMA with C3 deposits (Figure 1B, panels 1,2).

Treatment consisted of three methylprednisolone pulses (1 g/1.73m²), followed by oral prednisolone started at 1 mg/kg/day for 1 month and tapered at 8 months without relapse at last follow-up.

2.3 | Case no. 3

A 16-year-old female was admitted for headache, asthenia, fever spikes, polylymphadenopathy, pleural effusion, marked peripheral edema, oliguria, and high blood pressure. Initial blood tests showed microcytic aregenerative anemia and nephritic and nephrotic syn-

drome with impaired renal function. Bone marrow aspiration and biopsy excluded lymphoma. Cervical lymph node biopsy showed histology compatible with the vasculohyalin form of MCD (Figure 1C, panels 1,2). Renal biopsy showed lesions of diffuse TMA with glomerular basement membrane thickening, double contours, mesangiolysis, and Immunoglobulin M (IgM), C3, and C1q deposits, without extracapillary proliferation (Figure 1C, panels 3,4). HHV8 immunofixation was negative on this sample. HHV8 PCR and HIV serology were negative. EBV PCR was positive (5000 copies/ml). Serology indicated previous infection.

She underwent five courses of plasmapheresis (Day 4–Day 10) and 24-hr hemodiafiltration at D10 due to persistent anuria and worsening edema. After confirmation of CD, oral prednisolone were started at 1 mg/kg/day at Day 26 along with tretinoin 30 mg twice daily for 5 months. Corticosteroids were tapered to 0.25 mg/kg at 6 months and stopped at 30 months without any relapse and with normal epithelial growth factor (eGFR) after a follow-up of 6 years.

2.4 | Case no. 4

A 14-year-old female was admitted for dyspnea, abdominal pain, diarrhea, ascites and edema, oliguria, polylymphadenopathy, and fever with night sweats. Computed-tomography scan showed bilateral pleural effusion, and cervical, axillary, mesenteric, and iliac adenopathies. Positron emission tomography scan showed moderate hypermetabolism of adenopathies. Bone-marrow aspiration and biopsy excluded malignant lymphoma. Axillary lymph-node biopsy was compatible with the vasculohyalin form of MCD and no evidence of EBV found on the biopsied tissue by immunofluorescence staining (Figure 1D, panels 1,2). HHV8 and EBV viral loads were undetectable and HIV and EBV serologies were negative. Interleukin 6 (IL6) blood level was elevated (28.9pg/ml with normal value below 7pg/ml). Renal biopsy showed lesions of diffuse TMA with mesangiolysis and IgM deposits without extracapillary proliferation (Figure 1D, panels 3,4).

FIGURE 1 (A) Case no. 1: Histological sections of renal biopsy showing thrombotic microangiopathy and cervical lymph node sample, (1) arteriole with occlusion of the lumen by a myxoid intimal thickening (Masson's trichrome stain, $\times 200$), (2) glomerulus with swollen endothelial cells and diffuse mesangiolysis (Jones Method, $\times 400$), (3) follicular hyperplasia ("onion bulb" aspect) (Hematoxylin/Eosin (H&E) stain, $\times 100$), (4) interfollicular zona plasmocytis proliferation (H&E stain, $\times 200$); (B) Case no. 2: Histological section of renal biopsy showing thrombotic microangiopathy, (1) thickening of capillary walls with subendothelial transparent deposits (Masson's trichrome stain, $\times 200$), (2) interlaced lines in the thickened capillary walls with tram-track peripheral walls (Marinozzi staining, $\times 400$); (C) Case no. 3: Histological section of renal biopsy showing thrombotic microangiopathy and lymph node sample, (1) glomerulus with swollen endothelial cells and diffuse mesangiolysis (Masson's trichrome stain, $\times 200$), (2) glomerulus with swollen endothelial cells (Jones Method, $\times 400$), (3) follicular hyperplasia ("onion bulb" aspect) (H&E stain, $\times 200$), (4) interfollicular zona plasmocytis proliferation (H&E stain, $\times 400$); (D) Case no. 4: Histological section of renal sample showing thrombotic microangiopathy and lymph node sample, (1,2) glomerulus with swollen endothelial cells and diffuse mesangiolysis (periodic acid-Schiff $\times 200$ /Jones Method, $\times 200$), (3,4) follicular hyperplasia ("onion bulb" aspect) (H&E stain, $\times 100$ /Masson's trichrome stain, $\times 100$)

Treatment consisted of prednisolone (2 mg/kg/day). Rituximab infusions (375 mg/m²/week for 4 weeks) were started 10 days later and resulted in rapid improvement 24 hr after the first perfusion.

3 | DISCUSSION

We report four French cases of pediatric MCD with renal failure caused by TMA. Lymph node biopsies were compatible with the hyalineovascular form of MCD in three cases and plasma cell proliferation in one case. From a pathological standpoint, CD is a diagnosis of exclusion and requires careful histological examination, immunohistochemical analysis, flow cytometry, molecular genetic evaluation, and correlation with clinical, laboratory, and radiological findings to exclude other benign or malignant diseases. The diagnosis can be made based on the lack of additional histological features supporting a diagnosis of lymphoma and the absence of a clonal B-cell population with a characteristic immunophenotype.⁵

In our cases, MCD was not associated with HIV or HHV8 infections, and autoimmune tests were negative. In the literature, HHV8 infection is present in approximately 50% of HIV-negative cases of

adult MCD, and the prevalence varies with HHV8 seroprevalence in the general population. Many HHV8-derived gene products, including viral homolog of human IL-6 (vIL-6), are expressed during the lytic cycle of HHV8 replication. MCD would be potentially treatable with antiviral therapy, particularly in patients with detectable HHV8 viral loads.⁶ Two of our four patients had detectable EBV viral load secondary to EBV reactivation. Few articles report on the association between CD and EBV infection⁷; however, low level EBV replication is often found in patients with infections or systemic diseases and EBV was not found in lymph node biopsies.

In the four present cases, renal biopsies showed typical diffuse TMA. In the literature, renal involvement has been reported in 25–54% of cases of CD in adults. In two retrospective studies of renal biopsies in HIV-negative CD, TMA accounted for 15 of 26 cases.^{6,8,9} It has been suggested that TMA in CD is due to increased production of vascular endothelial growth factor (VEGF) secondary to IL6 production (as assessed in case 4) by the plasma cell proliferation.^{10,11} However, the exact link between CD and glomerular VEGF expression remains to be elucidated. Besides, MCD-associated TMA may also be related to thrombotic thrombocytopenic purpura. London et al.¹² reported four cases with TMA associated with HHV8-related MCD. In all cases,

ADAMTS13 activity was below 5% and there were hematological manifestations of TMA. In our study, only one patient received plasmapheresis. In all cases, etiological treatment improved renal failure.

Considering treatments, steroids were used in all cases. In the literature, 21 cases of pediatric MCD treated with corticosteroids alone have been described and responses were observed in approximately 80% of patients,³ but complete remissions were rare and generally transient. Steroids can be combined with chemotherapy. Etoposide, a topoisomerase II inhibitor, may be used as single therapy at a daily dose of 50 or 100 mg taken orally on days 1–7 of a 14-day cycle until maximal response, or 100 mg/m² administered intravenously once a week for 4 weeks. This treatment can be continued in the absence of significant toxicity. In the third case, steroids were used with tretinoin acid 30 mg twice daily with the aim of blocking the IL6 receptor and decreasing VEGF production. One previous study reports tretinoin acid for treatment of MCD.¹³

According to the literature,^{5,14} rituximab is considered as the first-line treatment. Given the delayed response to rituximab, steroid pulses may be helpful initially especially in very severe cases. In these patients, prednisone 1 mg/kg/day may be added to rituximab until systemic inflammatory symptoms are controlled. In patients who fail to respond, or relapse rapidly following rituximab monotherapy, monoclonal antibodies, such as siltuximab^{15,16} or tocilizumab,¹⁷ targeting the IL6-receptor can be considered. For resistant or rapidly progressive diseases, combining cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone or cyclophosphamide, vincristine, and prednisone without rituximab has induced sustained remission in a few cases. Such protocols have never been evaluated in pediatric patients, and no data are available in case of acute renal failure.⁴

4 | CONCLUSION

Pediatric CD with renal failure is a rare condition and may be secondary to diffuse TMA. Although the initial presentation can be severe, in this series renal failure rapidly improved in all cases after etiological treatment of MCD.

ACKNOWLEDGMENTS

The authors would like to thank M. Rabant, M. Peuchmaur, N. Rioux-Leclercq, V. Despert, and M. Fahd for their contributions and their review of the manuscript.

CONFLICT OF INTEREST

The authors have no conflicts of interest to disclose.

ORCID

Elie Cousin <http://orcid.org/0000-0001-9967-8599>

REFERENCES

- Smir BN, Greiner TC, Weisenburger DD. Multicentric angiofollicular lymph node hyperplasia in children. A clinicopathologic study of eight patients. *Modern Pathol*. 1996;9:1135–1142.
- Parez N, Bader-Meunier B, Roy CC, Dommergues JP. Paediatric Castleman disease: report of seven cases and review of the literature. *Eur J Pediatr*. 1999;158:631–637.
- Wang HW, Pittaluga S, Jaffe ES. Multicentric Castleman disease: where are we now? *Semin Diagn Pathol*. 2016;33:294–306. <https://doi.org/10.1053/j.semdp.2016.05.006>.
- Farrugia P, Trizzino A, Scibetta N, et al. Castleman's disease in childhood: report of three cases and review of the literature. *Ital J Pediatr*. 2011;37:50. <https://doi.org/10.1186/1824-7288-37-50>.
- Soumerai JD, Sohani AR, Abramson JS. Diagnosis and management of Castleman disease. *Cancer Control*. 2014;21:266–278.
- El Karoui K, Vuiblet V, Dion D, et al. Renal involvement in Castleman disease. *Nephrol Dial Transplant*. 2011;26:599–609. <https://doi.org/10.1093/ndt/gfq427>.
- Chan KH, Lade S, Prince HM, Harrison SJ. Update and new approaches in the treatment of Castleman disease. *PJ Blood Med*. 2016;7:145–158.
- Flahault A, Vignon M, Rabant M, et al. Case report and literature review: glomerular and neurologic thrombotic microangiopathy as a primary manifestation of multicentric Castleman disease. *Medicine (Baltimore)*. 2016;95:e5047.
- Xu D, Lv J, Dong Y, et al. Renal involvement in a large cohort of Chinese patients with Castleman disease. *Nephrol Dial Transplant*. 2012;27(suppl 3):iii119–iii125.
- Rieu P, Noel LH, Droz D, et al. Atteintes glomérulaires au cours des syndromes lympho-prolifératifs avec production excessive de cytokines (Castelman, POEMS). *Adv Nephrol Necker Hosp*. 2000;30:305–331.
- Jourde-Chiche N, Dussol B, Daniel L. Kidney involvement in hematologic malignancies. Diagnostic approach. *Rev Med Interne*. 2010;31:685–696. <https://doi.org/10.1016/j.revmed.2009.08.013>.
- London J, Boutboul D, Agbalika F, et al. Autoimmune thrombotic thrombocytopenic purpura associated with HHV8-related multicentric Castleman disease. *Br J Haematol*. 2017;178:486–488.
- Uldrick TS, Polizzotto MN, Aleman K, et al. High-dose zidovudine plus valganciclovir for Kaposi sarcoma herpesvirus-associated multicentric Castleman disease: a pilot study of virus-activated cytotoxic therapy. *Blood*. 2011;117:6977–6986. <https://doi.org/10.1182/blood-2010-11-317610>.
- Robinson D Jr, Reynolds M, Casper C, et al. Clinical epidemiology and treatment patterns of patients with multicentric Castleman disease: results from two UC treatment centers. *BR J Haematol*. 2014;165:39–48. <https://doi.org/10.1111/bjh.12717>.
- Rieu P, Droz D, Gessain A, Grünfeld JP, Hermine O. Retinoic acid treatment of multicentric Castleman disease. *Lancet*. 1999;354:1262–1263.
- Fajgenbaum DC, Kurzrock R. Siltuximab: a targeted therapy for idiopathic multicentric Castleman disease. *Immunotherapy*. 2016;8:17–26. <https://doi.org/10.2217/imt.15.95>.
- Lyseng-Williamsom KA. Siltuximab: a review in idiopathic (human herpesvirus-8-negative) multicentric Castleman disease. *Bio-Drug*. 2015;29:399–406. <https://doi.org/10.1007/s40259-015-0142-5>.

How to cite this article: Cousin E, Flodrops H, Boyer O, et al. Renal failure in pediatric Castleman disease: Four French cases with thrombotic microangiopathy. *Pediatr Blood Cancer*. 2018;65:e27045. <https://doi.org/10.1002/pbc.27045>

XV. Annexe 3 : Poster présenté à la société de néphrologie pédiatrique en Novembre 2017

Atteinte rénale dans le syndrome de Castleman Multicentrique en Pédiatrie : 4 cas Français avec Microangiopathie Thrombotique.

E. Cousin MS, H. Flodrops MD, O. Boyer MD, Ph.D., M. Rabant MD, Ph.D., M. Ruin MD, J. Hogan MD, Ph.D., A. Couderc MD, V. Despert MD, M. Fahd MD, M. Peuchmaur Ph.D., J.M. Goujon Ph.D., N. Rioux-Leclercq Ph.D., S. Taque MD.

Service de Pédiatrie CHU Rennes

Introduction :

La maladie de Castleman ou hyperplasie lymphoïde angiofolliculaire est un syndrome lymphoprolifératif rare en pédiatrie [1] et dont les mécanismes sont encore mal expliqués. Il existe 2 types cliniques de syndrome de Castleman: la forme localisée et la forme multicentrique. L'atteinte rénale dans la forme multicentrique pédiatrique n'a jamais été décrite jusqu'à présent.

	Forme localisée	Forme multicentrique
Patients	<30ans	Adulte immunodéprimé (HHV8, VIH) Cas pédiatriques rares
Caractéristiques cliniques	Polyadénopathies Tumeur médiastinale isolée Pas d'atteinte rénale	Altération de l'état général Polyadénopathie Hépatosplénomégalie Atteinte multiscérale Atteinte rénale
Anatomo-pathologie		Forme vasculohyaline Forme à prolifération plasmocytaire Forme mixte
Pronostic	Favorable après chirurgie	Réservé

Matériel/Méthode :

Il s'agit d'une étude rétrospective de 4 cas de syndrome de Castleman pédiatrique répertoriés via la Société Française de Néphrologie Pédiatrique depuis 2005.

Une description clinique, biologique, radiologique, histologique, thérapeutique et évolutive des cas a été réalisée.

Résultats :

	Cas N°1 CHU Saint Pierre de la Réunion	Cas N°2 CHU Rennes	Cas N°3 CHU Necker-Enfants Malades	Cas N°4 CHU Robert Debré
Genre/Âge	Garçon 17 ans	Fille 14 ans	Fille 16 ans	Fille 14 ans
Caractéristiques cliniques et biologique	Diarrhée Anasarque HTA Fièvre Polyadénopathie Hépatosplénomégalie IRA	Vomissements Douleurs lombaires Anasarque HTA Fièvre Polyadénopathie Hépatosplénomégalie IRA	Céphalées Vomissements Douleurs lombaires Anasarque Oligurie HTA Fièvre Polyadénopathie Hépatosplénomégalie IRA	Diarrhée Douleur abdominale Dyspnée Anasarque Oligurie Fièvre Polyadénopathie Hépatosplénomégalie IRA
Biopsie rénale	Microangiopathie thrombotique	Microangiopathie thrombotique Dépôts de C3 Pas de prolifération extracapillaire	Microangiopathie thrombotique Dépôts IgM, C3 et C1q Pas de prolifération extracapillaire	Microangiopathie thrombotique Dépôts IgM Pas de prolifération extracapillaire
Traitement initial	1 bolus de méthylprednisolone IV 1g/1,73m ² puis PO 1mg/kg/day Etoposide 100mg/m ² 4 injection de Rituximab : 375mg/m ² /semaine	1 bolus de méthylprednisolone IV 1g/1,73m ² puis PO 1mg/kg/jour	5 plasmaphérèses (MAT) Hémodiafiltration 24 heures pour anurie et anasarque Corticothérapie PO 1mg/kg/jour Vesanolol 30mg 3 fois par jour	Corticothérapie PO 2mg/kg/jour Puis 4 injection de Rituximab 375mg/m ² /semaine
Evolution	Corticothérapie : 3mg/jour à M6 et arrêt à M9 sans rechute. Créatinine normalisée à M12	Corticothérapie : 0,1mg/kg/jour à M6 et arrêt à M8 sans rechute. Créatinine normalisée à M3	Corticothérapie : 0,25 mg/kg/j à M6 et arrêt à M30 sans rechute. Créatinine normalisée à 2 mois	Arrêt de la corticothérapie à M15 sans rechute. Créatinine normalisée à M1

Coupe histologique de ganglion cas N°4

Hyperplasie folliculaire avec lymphocytes en bulbe d'oignon 1 : H&E stain X 100, 2 : Masson's Trichrom stain X 100

Coupe histologique de PBR révélant des lésions de MAT diffuse

1 : Glomérule avec cellules endothéliales turgescents et mésangiolyse diffuse Masson's Trichrom stain X 200, 2 : Jones' Method X 400

Discussion :

Dans la littérature, il est rapporté une association entre infection à EBV et syndrome de Castleman [2]. La PCR EBV avec un faible taux de répllication étaient positives dans 2 cas sur 4. Pour tous les cas, les sérologies HHV8 et VIH étaient négatives. L'EBV n'a pas été mis en évidence sur les biopsies ganglionnaires. Il n'existe pas d'argument fort en faveur d'une implication d'EBV dans le développement de la maladie de Castleman systémique.

La microangiopathie thrombotique dans la maladie de Castleman serait secondaire à une augmentation du VEGF en réponse à une hyperproduction d'IL 6 responsable d'une augmentation de la perméabilité capillaire.

Conclusion :

L'atteinte rénale dans la maladie de Castleman pédiatrique multicentrique est rare et secondaire à une microangiopathie thrombotique diffuse. Bien que le tableau clinique initial puisse être sévère, la fonction rénale s'améliore rapidement grâce au traitement symptomatique du syndrome lymphoprolifératif. Le Rituximab doit être le traitement de 1^{ère} intention +/- associé à des bolus de méthylprednisolone dans les formes sévères.

1 : Parez N, et al Paediatric Castleman disease : report of seven cases and review of the literature. Eur J Pediatr, 1999, 158, 631-637. 2 : Wang S, et al, Report of a case with multicentric Castleman's disease associated with EB virus infection, Zhonghua ER Ke Za Zhi 2016 jan;54(1):69-70. Doi: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2016.01.018

de COUSIN, Elie.- Atteintes rénales dans la maladie de Castleman de l'enfant, 4 cas français avec microangiopathie thrombotique.

48 feuilles, 1 tableau, 4 figures. 30cm.-Thèse : (Médecine) ; Rennes 1 ; 2019 ; N°

Résumé français :

L'hyperplasie ganglionnaire angiofolliculaire ou maladie de Castleman (MC) dans sa forme pédiatrique est une pathologie peu fréquente et mal comprise du ganglion lymphatique. Les atteintes rénales associées à la MC ont déjà été rapportées chez l'adulte mais n'ont jamais été décrites chez l'enfant. Nous rapportons quatre cas français d'enfants avec polyadenopathie, organomégalie, anasarque, hypertension artérielle et insuffisance rénale aiguë évoquant une MC dans sa forme multicentrique (MCM) avec atteintes rénales. Pour tous les cas, l'étude anatomo-pathologique des biopsies rénales retrouvait des atteintes de microangiopathie thrombotique diffuse (MAT). Le diagnostic définitif de MCM était confirmé par l'analyse anatomo-pathologique d'une adénopathie repérée par tomodensitométrie et réalisée avant l'initiation de la corticothérapie. Pour tous les cas, le traitement étiologique de la MCM par corticothérapie et Rituximab a été rapidement efficace et a permis une amélioration rapide de la fonction rénale sans rechute à ce jour. Dans la section discussion, nous proposons une mise au point sur les atteintes rénales dans la maladie de Castleman et sur la prise en charge thérapeutique.

Abstract :

Pediatric Castleman disease (CD) is an uncommon and poorly understood disorder of the lymph nodes. Renal failure has never been previously described in pediatric multicentric Castleman disease (MCD). We report four cases, who presented with polyadenopathy, organomegaly, hydrops, high blood pressure, and acute renal failure suggesting CD. In all cases, histological analysis of renal sample confirmed diffuse thrombotic microangiopathy. Definitive diagnosis of MCD was made by a histological analysis of an affected lymph node located by computer tomography before initiation of corticosteroid therapy. Etiological treatment of CD with corticotherapy and rituximab was rapidly effective without relapse to date.

Rubrique de classement : Série de cas clinique

Mots-clés : maladie de Castleman, microangiopathie thrombotique

Mots-clés anglais MeSH : Pediatric Castleman disease, thrombotic microangiopathy, acute renal failure

Jury :

Président : Mme Virginie GANDEMÉR
Assesseurs : Mme Sophie TAQUE [directrice de thèse]
Mme Cécile VIGNEAU [assesseur]
M Patrick PLADYS [assesseur]