



**HAL**  
open science

# Évaluation rétrospective des facteurs de risque de fistule pancréatique après pancréatectomie distale : établissement d'un score prédictif

Nicolas Rollin

## ► To cite this version:

Nicolas Rollin. Évaluation rétrospective des facteurs de risque de fistule pancréatique après pancréatectomie distale : établissement d'un score prédictif. Human health and pathology. 2021. dumas-03206833

**HAL Id: dumas-03206833**

**<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03206833v1>**

Submitted on 23 Apr 2021

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0 International License

UNIVERSITE DE MONTPELLIER  
FACULTE DE MEDECINE MONTPELLIER-NIMES

**THESE**

Pour obtenir le titre de

**DOCTEUR EN MEDECINE**

Présentée et soutenue publiquement

Par

**Nicolas ROLLIN**

Le 30 mars 2021

EVALUATION RETROSPECTIVE DES FACTEURS DE RISQUE DE FISTULE  
PANCREATIQUE APRES PANCREATECTOMIE DISTALE.  
ETABLISSEMENT D'UN SCORE PREDICTIF.

Directeur de thèse : Dr Jean Christophe VALATS

JURY

Président : Pr Pierre BLANC

Assesseurs : Pr PANARO, Dr VALATS, Pr NAVARRO

Membre invité : Pr DOMERGUE

## **RESUME**

La fistule pancréatique est une complication fréquente et grave après une pancréatectomie distale. Le nombre et le poids des différents facteurs de risque rapportés dans la littérature restent encore controversés et il n'existe pas de score pour prédire la survenue de fistule pancréatique de grade B et C (cliniquement pertinente).

Les données concernant 103 patients consécutifs subissant une pancréatectomie ont été collectées.

Trente-trois patients ont développé une fistule pancréatique : 24 fistules de grade B et 9 fistules de grade C. Le temps opératoire supérieur à 4 heures, le taux d'amylase sur le liquide de drainage abdominal supérieur à 500 UI/L à J3 post opératoire, l'épaisseur du pancréas supérieur à 10 mm et un IMC supérieur à 30 se sont avérés prédictifs fistule pancréatique cliniquement pertinente. Un score de 4 points a été créé à partir des variables sélectionnées dans le modèle multivarié. La capacité de discrimination a été testée sur la courbe ROC, montrant une aire sous la courbe de 0,83 (IC 95% [0,75 - 0,92]). Le seuil du score a été déterminé à 2 points / 4, ce qui a la valeur la plus élevée selon l'indice de Youden (0,53). La sensibilité est calculée à 82% (IC95% [69 - 95]) et la spécificité à 71 (IC95% [61 - 82]). Un seuil à 3 points / 4 permet d'atteindre une spécificité de 99% (IC95% [99-100]).

**MOTS CLES :** Fistule Pancréatique, Pancréatectomie distale, Score prédictif, Temps opératoire, Obésité, Amylase, Epaisseur pancréatique.

## ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021

### PERSONNEL ENSEIGNANT

#### Professeurs Honoraires

ALBAT Bernard	BRUNEL Michel	HUMEAU Claude	MIRO Luis
ALLIEU Yves	CANAUD Bernard	JAFFIOL Claude	NAVARRO Maurice
ALRIC Robert	CHAPTAL Paul-André	JANBON Charles	NAVRATIL Henri
ARNAUD Bernard	CIURANA Albert-Jean	JANBON François	OTHONIEL Jacques
ASENCIO Gérard	CLOT Jacques	JARRY Daniel	PAGES Michel
ASTRUC Jacques	COSTA Pierre	JOURDAN Jacques	PEGURET Claude
AUSSILLOUX Charles	D'ATHIS Françoise	KLEIN Bernard	PELISSIER Jacques
AVEROUS Michel	DEMAILLE Jacques	LAFFARGUE François	PETIT Pierre
AYRAL Guy	DESCOMPS Bernard	LALLEMANT Jean Gabriel	POUGET Régis
BAILLAT Xavier	DIMEGLIO Alain	LAMARQUE Jean-Louis	PUJOL Henri
BALDET Pierre	DUBOIS Jean Bernard	LAPEYRIE Henri	RABISCHONG Pierre
BALDY-MOULINIER Michel	DUJOLS Pierre	LEROUX Jean-Louis	RAMUZ Michel
BALMES Jean-Louis	DUMAS Robert	LESBROS Daniel	REBOUL Jean
BANSARD Nicole	DUMAZER Romain	LOPEZ François Michel	RIEU Daniel
BAYLET René	ECHENNE Bernard	LORIOT Jean	ROCHEFORT Henri
BILLIARD Michel	FABRE Serge	LOUBATIERES Marie Madeleine	ROUANET DE VIGNE LAVIT Jean Pierre
BLARD Jean-Marie	FREREBEAU Philippe	MAGNAN DE BORNIER Bernard	SAINT AUBERT Bernard
BLAYAC Jean Pierre	GALIFER René Benoît	MARTY ANE Charles	SANCHO-GARNIER Hélène
BLOTMAN Francis	GODLEWSKI Guilhem	MARY Henri	SANY Jacques
BONNEL François	GRASSET Daniel	MATHIEU-DAUDE Pierre	SEGNARBIEUX François
BOURGEOIS Jean-Marie	GUILHOU Jean-Jacques	MEYNADIER Jean	SENAC Jean-Paul
BOUSQUET Jean	GUI TER Pierre	MICHEL François-Bernard	SERRE Arlette
BRUEL Jean Michel	HEDON berbard	MION Charles	SOLASSOL Claude
BUREAU Jean-Paul	HERTAULT Jean	MION Henri	VIDAL Jacques
			VISI ER Jean Pierre

### Professeurs Emérites

ARTUS Jean-Claude	LE QUELLEC Alain
BLANC François	MARES Pierre
BONAFE Alain	MAUDELONDE Thierry
BOULENGER Jean-Philippe	MAURY Michèle
BOURREL Gérard	MESSNER Patrick
BRINGER Jacques	MILLAT Bertrand
CLAUSTRES Mireille	MONNIER Louis
DAURES Jean-Pierre	MOURAD Georges
DAUZAT Michel	PREFAUT Christian
DAVY Jean-Marc	PUJOL Rémy
DEDET Jean-Pierre	RIBSTEIN Jean
ELEDJAM Jean-Jacques	SCHVED Jean-François
GROLLEAU RAOUX Robert	SULTAN Charles
GUERRIER Bernard	TOUCHON Jacques
GUILLOT Bernard	UZIEL Alain
JONQUET Olivier	VOISIN Michel
LANDAIS Paul	ZANCA Michel
LARREY Dominique	

### Docteurs Emérites

PRAT Dominique  
PUJOL Joseph

**ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021**

**PERSONNEL ENSEIGNANT**

---

---

**Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers**

**PU-PH de classe exceptionnelle**

ALRIC Pierre	Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (option chirurgie vasculaire)
BACCINO Eric	Médecine légale et droit de la santé
BASTIEN Patrick	Parasitologie et mycologie
BEREGI Jean-Paul	Radiologie et imagerie médicale
BLAIN Hubert	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine générale, addictologie
BOULOT Pierre	Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale
CAPDEVILA Xavier	Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire
CHAMMAS Michel	Chirurgie orthopédique et traumatologique
COLSON Pascal	Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire
COMBE Bernard	Rhumatologie
COSTES Valérie	Anatomie et cytologie pathologiques
COTTALORDA Jérôme	Chirurgie infantile
COUBES Philippe	Neurochirurgie
COURTET Philippe	Psychiatrie d'adultes ; addictologie
CRAMPETTE Louis	Oto-rhino-laryngologie
CRISTOL Jean Paul	Biochimie et biologie moléculaire
CYTEVAL Catherine	Radiologie et imagerie médicale
DE LA COUSSAYE Jean Emmanuel	Médecine d'urgence
DE WAZIERES Benoît	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine générale, addictologie
DELAPORTE Eric	Maladies infectieuses ; maladies tropicales
DEMOLY Pascal	Pneumologie ; addictologie
DOMERGUE Jacques	Chirurgie viscérale et digestive

DUFFAU Hugues	Neurochirurgie
ELIAOU Jean François	Immunologie
FABRE Jean Michel	Chirurgie viscérale et digestive
FRAPIER Jean-Marc	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
HAMAMAH Samir	Biologie et Médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale
HERISSON Christian	Médecine physique et de réadaptation
JABER Samir	Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire
JEANDEL Claude	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine générale, addictologie
JORGENSEN Christian	Thérapeutique ; médecine d'urgence ; addictologie
KOTZKI Pierre Olivier	Biophysique et médecine nucléaire
LABAUGE Pierre	Neurologie
LEFRANT Jean-Yves	Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire
LEHMANN Sylvain	Biochimie et biologie moléculaire
LUMBROSO Serge	Biochimie et Biologie moléculaire
MERCIER Jacques	Physiologie
MEUNIER Laurent	Dermato-vénéréologie
MONDAIN Michel	Oto-rhino-laryngologie
MORIN Denis	Pédiatrie
PAGEAUX Georges-Philippe	Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie
PUJOL Pascal	Biologie cellulaire
QUERE Isabelle	Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (option médecine vasculaire)
RENARD Eric	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale
REYNES Jacques	Maladies infectieuses, maladies tropicales
RIPART Jacques	Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire
ROUANET Philippe	Cancérologie ; radiothérapie
SOTTO Albert	Maladies infectieuses ; maladies tropicales
TAOUREL Patrice	Radiologie et imagerie médicale

TOUITOU Isabelle

Génétique

VANDE PERRE Philippe

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière

YCHOU Marc

Cancérologie ; radiothérapie

**PU-PH de 1<sup>re</sup> classe**

AGUILAR MARTINEZ Patricia

Hématologie ; transfusion

ASSENAT Éric

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie

AVIGNON Antoine

Nutrition

AZRIA David

Cancérologie ; radiothérapie

BAGHDADLI Amaria

Pédopsychiatrie ; addictologie

BLANC Pierre

Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie

BORIE Frédéric

Chirurgie viscérale et digestive

BOURDIN Arnaud

Pneumologie ; addictologie

CAMBONIE Gilles

Pédiatrie

CAMU William

Neurologie

CANOVAS François

Anatomie

CAPTIER Guillaume

Anatomie

CARTRON Guillaume

Hématologie ; transfusion

CAYLA Guillaume

Cardiologie

CHANQUES Gérard

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

CORBEAU Pierre

Immunologie

COULET Bertrand

Chirurgie orthopédique et traumatologique

CUVILLON Philippe

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

DADURE Christophe

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire

DAUVILLIERS Yves

Physiologie

DE TAYRAC Renaud

Gynécologie-obstétrique, gynécologie médicale

DE VOS John

Histologie, embryologie et cytogénétique



DEMARIA Roland	Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
DEREURE Olivier	Dermatologie - vénéréologie
DROUPY Stéphane	Urologie
DUCROS Anne	Neurologie
DUPEYRON Arnaud	Médecine physique et de réadaptation
FESLER Pierre	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine générale, addictologie
GARREL Renaud	Oto-rhino-laryngologie
GENEVIEVE David	Génétique
GUILLAUME Sébastien	Psychiatrie d'adultes ; addictologie
GUIU Boris	Radiologie et imagerie médicale
HAYOT Maurice	Physiologie
HOUEDE Nadine	Cancérologie ; radiothérapie
KLOUCHE Kada	Médecine intensive-réanimation
KOENIG Michel	Génétique
KOUYOUMDJIAN Pascal	Chirurgie orthopédique et traumatologique
LAFFONT Isabelle	Médecine physique et de réadaptation
LAVABRE-BERTRAND Thierry	Histologie, embryologie et cytogénétique
LAVIGNE Jean-Philippe	Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière
LE MOING Vincent	Maladies infectieuses ; maladies tropicales
LECLERCQ Florence	Cardiologie
MARIANO-GOULART Denis	Biophysique et médecine nucléaire
MATECKI Stéfan	Physiologie
MORANNE Olivier	Néphrologie
MOREL Jacques	Rhumatologie
NAVARRO Francis	Chirurgie viscérale et digestive
NOCCA David	Chirurgie viscérale et digestive
PASQUIE Jean-Luc	Cardiologie

PERNEY Pascal	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine générale, addictologie
PRUDHOMME Michel	Anatomie
PUJOL Jean Louis	Pneumologie ; addictologie
PURPER-OUAKIL Diane	Pédopsychiatrie ; addictologie
ROGER Pascal	Anatomie et cytologie pathologiques
TRAN Tu-Anh	Pédiatrie
VERNHET Hélène	Radiologie et imagerie médicale

### **PU-PH de 2ème classe**

BOURGIER Céline	Cancérologie; radiothérapie
CANAUD Ludovic	Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (option chirurgie vasculaire)
CAPDEVIELLE Delphine	Psychiatrie d'Adultes ; addictologie
CLARET Pierre-Géraud	Médecine d'urgence
COLOMBO Pierre-Emmanuel	Cancérologie ; radiothérapie
COSTALAT Vincent	Radiologie et imagerie médicale
DAIEN Vincent	Ophthalmologie
DORANDEU Anne	Médecine légale et droit de la santé
FAILLIE Jean-Luc	Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie
FUCHS Florent	Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale
GABELLE DELOUSTAL Audrey	Neurologie
GAUJOUX Viala Cécile	Rhumatologie
GODREUIL Sylvain	Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière
GUILPAIN Philippe	Médecine Interne, gériatrie et biologie du vieillissement; addictologie
HERLIN Christian	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, brûlologie
IMMEDIATO DAIEN Claire	Rhumatologie
JACOT William	Cancérologie ; Radiothérapie
JEZIORSKI Eric	Pédiatrie

JUNG Boris	Médecine intensive-réanimation
KALFA Nicolas	Chirurgie infantile
LACHAUD Laurence	Parasitologie et mycologie
LALLEMANT Benjamin	Oto-rhino-laryngologie
LE QUINTREC DONNETTE Moglie	Néphrologie
LETOUZEY Vincent	Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale
LONJON Nicolas	Neurochirurgie
LOPEZ CASTROMAN Jorge	Psychiatrie d'Adultes ; addictologie
LUKAS Cédric	Rhumatologie
MENJOT de CHAMPFLEUR Nicolas	Radiologie et imagerie médicale
MILLET Ingrid	Radiologie et imagerie médicale
MURA Thibault	Biostatistiques, informatique médicale et technologies de la communication
NAGOT Nicolas	Biostatistiques, informatique médicale et technologies de la communication
OLIE Emilie	Psychiatrie d'adultes; addictologie
PANARO Fabrizio	Chirurgie viscérale et digestive
PARIS Françoise	Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale
PELLESTOR Franck	Histologie, embryologie et cytogénétique
PEREZ MARTIN Antonia	Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (option médecine vasculaire)
POUDEROUX Philippe	Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie
RIGAU Valérie	Anatomie et cytologie pathologiques
RIVIER François	Pédiatrie
ROSSI Jean François	Hématologie ; transfusion
ROUBILLE François	Cardiologie
SEBBANE Mustapha	Médecine d'urgence
SIRVENT Nicolas	Pédiatrie
SOLASSOL Jérôme	Biologie cellulaire
STOEBNER Pierre	Dermato-vénéréologie

SULTAN Ariane	Nutrition
THOUVENOT Éric	Neurologie
THURET Rodolphe	Urologie
TUAILLON Edouard	Bactériologie-virologie; hygiène hospitalière
VENAIL Frédéric	Oto-rhino-laryngologie
VILLAIN Max	Ophtalmologie
VINCENT Denis	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine générale, addictologie
VINCENT Thierry	Immunologie
WOJTUSCISZYN Anne	Endocrinologie-diabétologie-nutrition

### **PROFESSEURS DES UNIVERSITES**

#### 1<sup>re</sup> classe :

COLINGE Jacques (Cancérologie, Signalisation cellulaire et systèmes complexes)

LAOUDJ CHENIVESSE Dalila (Biochimie et biologie moléculaire)

VISIER Laurent (Sociologie, démographie)

### **PROFESSEURS DES UNIVERSITES - Médecine générale**

#### 1<sup>re</sup> classe :

LAMBERT Philippe

AMOUYAL Michel

### **PROFESSEURS ASSOCIES - Médecine Générale**

CLARY Bernard

DAVID Michel

GARCIA Marc

## **PROFESSEURS ASSOCIES - Médecine**

BESSIS Didier (Dermato-vénéréologie)

MEUNIER Isabelle (Ophtalmologie)

MULLER Laurent (Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire)

PERRIGAULT Pierre-François (Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire)

QUANTIN Xavier (Pneumologie)

ROUBERTIE Agathe (Pédiatrie)

VIEL Eric (Soins palliatifs et traitement de la douleur)

**ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021**

**PERSONNEL ENSEIGNANT**

---

---

**Maîtres de Conférences des Universités - Praticiens Hospitaliers**

**MCU-PH Hors classe - Echelon Exceptionnel**

RICHARD Bruno	Médecine palliative
SEGONDY Michel	Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière

**MCU-PH Hors classe**

BADIOU Stéphanie	Biochimie et biologie moléculaire
BOULLE Nathalie	Biologie cellulaire
CACHEUX-RATABOUL Valère	Génétique
CARRIERE Christian	Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière
CHARACHON Sylvie	Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière
FABBRO-PERAY Pascale	Epidémiologie, économie de la santé et prévention
GIANSILY-BLAIZOT Muriel	Hématologie ; transfusion

**MCU-PH de 1<sup>re</sup> classe**

BERTRAND Martin	Anatomie
BOUDOUSQ Vincent	Biophysique et médecine nucléaire
BRET Caroline	Hématologie biologique
BROUILLET Sophie	Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale
COSSEE Mireille	Génétique
GIRARDET-BESSIS Anne	Biochimie et biologie moléculaire
LAVIGNE Géraldine	Hématologie ; transfusion
LESAGE François-Xavier	Médecine et Santé au Travail
MARTRILLE Laurent	Médecine légale et droit de la santé
MATHIEU Olivier	Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie

MOUZAT Kévin	Biochimie et biologie moléculaire
PANABIERES Catherine	Biologie cellulaire
RAVEL Christophe	Parasitologie et mycologie
SCHUSTER-BECK Iris	Physiologie
STERKERS Yvon	Parasitologie et mycologie
THEVENIN-RENE Céline	Immunologie
<b><u>MCU-PH de 2<sup>ème</sup> classe</u></b>	
BERGOUGNOUX Anne	Génétique
CHIRIAC Anca	Immunologie
DE JONG Audrey	Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire
DU THANH Aurélie	Dermato-vénéréologie
FITENI Frédéric	Cancérologie ; radiothérapie
GOUZI Farès	Physiologie
HERRERO Astrid	Chirurgie viscérale et digestive
HUBERLANT Stéphanie	Gynécologie-obstétrique ; Gynécologie médicale
KUSTER Nils	Biochimie et biologie moléculaire
MAKINSON Alain	Maladies infectieuses, Maladies tropicales
PANTEL Alix	Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière
PERS Yves-Marie	Thérapeutique; addictologie
ROUBILLE Camille	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie
SZABLEWSKY	Anatomie et cytologie pathologiques

**Maîtres de Conférences des Universités - Médecine Générale**

**MCU-MG de 1<sup>re</sup> classe**

COSTA David

OUDE ENGBERINK Agnès

**MCU-MG de 2<sup>ème</sup> classe**

FOLCO-LOGNOS Béatrice

CARBONNEL François

**Maîtres de Conférences associés - Médecine Générale**

CAMPAGNAC Jérômes

LOPEZ Antonio

MILLION Elodie

PAVAGEAU Sylvain

REBOUL Marie-Catherine

SERAYET Philippe



ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021

---

PERSONNEL ENSEIGNANT

**Maitres de Conférences des Universités**

Maîtres de Conférences hors classe

BADIA Eric	Sciences biologiques fondamentales et cliniques
CHAZAL Nathalie	Biologie cellulaire

Maîtres de Conférences de classe normale

BECAMEL Carine	Neurosciences
BERNEX Florence	Physiologie
CHAUMONT-DUBEL Séverine	Sciences du médicament et des autres produits de santé
DELABY Constance	Biochimie et biologie moléculaire
GUGLIELMI Laurence	Sciences biologiques fondamentales et cliniques
HENRY Laurent	Sciences biologiques fondamentales et cliniques
HERBET Guillaume	Neurosciences
LADRET Véronique	Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
LAINÉ Sébastien	Sciences du Médicament et autres produits de santé
LE GALLIC Lionel	Sciences du médicament et autres produits de santé
LOZZA Catherine	Sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques
MAIMOUN Laurent	Sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé
MOREAUX Jérôme	Science biologiques, fondamentales et cliniques
MORITZ-GASSER Sylvie	Neurosciences
MOUTOT Gilles	Philosophie
PASSERIEUX Emilie	Physiologie
RAMIREZ Jean-Marie	Histologie
RAYNAUD Fabrice	Sciences du Médicament et autres produits de santé
TAULAN Magali	Biologie Cellulaire

## ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021

### PERSONNEL ENSEIGNANT

#### PH chargés d'enseignements

ABOUKRAT Patrick	BLANCHET Catherine	COROIAN Flavia-Oana	GINIES Patrick
AKKARI Mohamed	BLATIERE Véronique	COUDRAY Sarah	GRECO Frédéric
ALRIC Jérôme	BOBBIA Xavier	CRANSAC Frédéric	GUEDJ Anne Marie
AMEDRO Pascal	BOGE Gudrun	CUNTZ Danielle	GUYON Gaël
AMOUROUX Cyril	BOURRAIN Jean Luc	DARDALHON Brigitte	HENRY Vincent
ANTOINE Valéry	BOUYABRINE Hassan	DAVID Aurore	JAMMET Patrick
ARQUIZAN Caroline	BRINGER-DEUTSCH Sophie	DE BOUTRAY Marie	JEDRYKA François
ATTALIN Vincent	BRINGUIER BRANCHEREAU Sophie	DE LA TRIBONNIÈRE Xavier	JREIGE Riad
AYRIGNAC Xavier	BRISOT Dominique	DEBIEN Blaise	KINNE Mélanie
BADR Maliha	BRONER Jonathan	DELPONT Marion	LABARIAS Coralie
BAIS Céline	CADE Stéphane	DENIS Hélène	LACAMBRE Mathieu
BARBAR Saber Davide	CAIMMI Davide Paolo	DEVILLE de PERIERE Gilles	LANG Philippe
BASSET Didier	CARR Julie	DJANIKIAN Flora	LAZERGES Cyril
BATIFOL Dominique	CARTIER César	DONNADIEU-RIGOLE Hélène	LE GUILLOU Cédric
BATTISTELLA Pascal	CASPER Thierry	FAIDHERBE Jacques	LEGLISE Marie Suzanne
BAUCHET Luc	CASSINOTTO Christophe	FATTON Brigitte	LOPEZ Régis
BENEZECH Jean-Pierre	CATHALA Philippe	FAUCHERRE Vincent	LUQUIENS Amandine
BENNYS Karim	CAZABAN Michel	FILLERON Anne	MANZANERA Cyril
BERNARD Nathalie	CHARBIT Jonathan	FITENI Frédéric	MARGUERITTE Emmanuel
BERTCHANSKY Ivan	CHEVALLIER Thierry	FOURNIER Philippe	MARTIN Lucille
BIBOULET Philippe	CHEVALLIER-MICHAUD Josyane	GAILLARD Nicolas	MATTATIA Laurent
BIRON-ANDREANI Christine	COLIN Olivier	GALMICHE Sophie	MEROUEH Fadi
BLANC Brigitte	CONSEIL Mathieu	GENY Christian	MEYER Pierre
BLANCHARD Sylvie	CORBEAU Catherine	GERONIMI Laetitia	MILESI Christophe

MORAU Estelle	SEGURET Fabienne
MOSER Camille	SENESSE Pierre
MOUSTY Eve	SKALLI El Medhi
MOUTERDE Gaël	SOLA Christelle
PANSARD Nicole	SOULLIER Camille
PERNIN Vincent	STOEBNER DELBARRE Anne
PERRIGAULT Pierre François	TEOT Luc
PEYRON Pierre-Antoine	THIRION Marina
PICARD Eric	VACHIERY-LAHAYE Florence
PICOT Marie Christine	VERNES Eric
PIERONI Laurence	VINCENT Laure
POQUET Hélène	WAGNER Laurent
PUJOL Sarah-Lise	ZERKOWSKI Laetitia
PUPIER Florence	
QUANTIN Xavier	
RAFFARD Laurence	
RAPIDO Francesca	
RIBRAULT Alice	
RICHAUD-MOREL Brigitte	
RIDOLFO Jérôme	
RIPART Sylvie	
RONGIERES Michel	
ROULET Agnès	
RUBENOVITCH Josh	
SANTONI Fannie	
SASSO Milène	
SCHULDINER Sophie	

## ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 - 2021

### PERSONNEL ENSEIGNANT

---

#### Praticiens Hospitaliers Universitaires

BARATEAU Lucie	Physiologie
BASTIDE Sophie	Epidémiologie, économie de la santé et prévention
CAZAUBON Yoann	Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie
DAGNEAUX Louis	Chirurgie orthopédique et traumatologique
DUFLOS Claire	Biostatistiques, informatique médicale et technologies de la communication
GOULABCHAND Radjiv	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie
LATTUCA Benoit	Cardiologie
MARIA Alexandre	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie
MIOT Stéphanie	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie
SARRABAY Guillaume	Génétique
SOUCHE François-Régis	Chirurgie viscérale et digestive

---

## SOMMAIRE

1) ABREVIATIONS .....	21
2) INTRODUCTION .....	22
3) PATIENTS AND METHODS .....	24
A/ Study design and patient selection .....	24
B/ Data collection.....	24
C/ Statistical analysis.....	25
4) RESULTS .....	26
A/ General results .....	26
B/ Building a predictive score .....	29
5) DISCUSSION .....	31
6) REFERENCES .....	35
7) ANNEXES .....	39
8) SERMENT D'HIPPOCRATE .....	40
9) ABSTRACT .....	41
10) RESUME .....	43

## 1) ABBREVIATIONS

BL : Biochemichal leak

BMI : Body Mass Index

CR : Clinically Relevant

DFA : Drain Fluid Amylase

DP : Distal pancreatectomy

ERCP : Endoscopic Retrograde Cholangiopancreaticography

IQR : Interquartile Range

IPMN : Intraductal Papillary Mucinous Neoplasia

ISGPF : International Study Group Pancreatic Fistula

POD : Post-Operative Day

POPF Postoperative pancreatic fistula

ROC : Receiver Operating Characteristic

SD : Standard Deviation

## 2) INTRODUCTION

Distal pancreatectomy (DP) is a standardized and frequently performed surgical procedure for the resection of pancreatic diseases located in the body and/or tail of the pancreas<sup>1,2</sup>. The occurrence of a postoperative pancreatic fistula (POPF) is a common and serious complication such as bleeding, hemorrhage, septic complications, prolonged ileus, which can lead to reoperation or death<sup>3,4</sup>. The incidence of this complication ranges between 25-40%, despite surgical technical progress<sup>5,6</sup> and the sharp increase in the pancreatic adenocarcinoma's incidence predicts a parallel increase in pancreatic fistulas<sup>7</sup>. Moreover, POPF cause a delay of adjuvant chemotherapy or radiotherapy treatment<sup>3</sup>, leading to a worse therapeutic management of the oncologic patient.

The treatment of POPF is multidisciplinary, involving anesthesiologists, radiologists, digestive surgeons and also gastroenterologists. Treatment of clinically relevant (CR) POPF complications may also involve radiologic and endoscopic procedures, such as gastrocystostomy, duodenocystostomy or ERCP<sup>8,9</sup>. Indeed, a well codified therapy of the fistula itself still does not exist and the best management strategy is still debated. For these reasons, a major challenge for surgeons is to understand the risk factors of POPF in order to prevent its occurrence, and to come to an early diagnosis to avoid timely complications.

The ISGPF (International Study Group Pancreatic Fistula) redefined POPF in 2016, differentiating three situations<sup>10</sup>. The biochemical leak is defined by measurable drain output on after postoperative day 3 with drain fluid amylase (DFA) concentration equals or higher than 3 times the upper limit of normal

serum value (no longer defined as a fistula). The grade B POPF is defined with a pancreatic leak that requires a therapeutic intervention (radiological or endoscopic) or the presence of abdominal drains for more than 21 days. The grade C POPF occurs when the fistula is complicated by organ failure or further surgery is needed.

The risk factors for pancreatic fistula after distal pancreatectomy were the subject of many studies, with soft pancreas, significant intraoperative blood loss, and long operating time most commonly described<sup>11,12</sup>. Biochemical leak itself, no longer corresponding to a pancreatic fistula since the new definitions, is considered a good predictor of the occurrence of a POPF<sup>13</sup>. However, the number and the weight of the different risk factors still remain controversial<sup>14</sup>.

The main objective of our study is to define a new score, easy to use, to identify patients at high risk of developing a pancreatic fistula grade B or C (clinically relevant; CR) after DP.



### 3) PATIENTS AND METHODS

#### *A/ Study design and patient selection*

The study had a single-center retrospective cohort design and was conducted at the Montpellier University Hospital. All patients who underwent a distal pancreatectomy between January 2015 and December 2019 were included, regardless of the indication, with or without splenectomy in addition. Exclusion criteria was age younger than 18.

#### *B/ Data collection*

From a prospectively collected database, preoperative demographic and medical data were collected (age, BMI, medical history). Pancreatic isthmus diameter was measured on a preoperative imaging test, where available. Amylase level on drain fluids was performed on post-operative day (POD) 1, 3, 5, and every two days if positive for a BL or a POPF. If several drainages were positioned, that one with the highest value was considered. Pancreatic fibrosis and tumor histology were recorded from pathological report. Data regarding both mini-invasive and laparotomic surgery were recorded. The technique used for pancreatic remnant closure was always a stapler closure, already known to be safe and effective<sup>15,16</sup>. Drain were always positioned during surgery. On the first post-operative day patients were observed in a sub-intensive care unit. They were re-admitted in the surgical ward based on their clinical conditions. BL and POPF were defined according to POPF definition of ISGPF<sup>10</sup>.

### *C/ Statistical analysis*

The categorical data were described by frequencies and percentages, whereas continuous data by mean  $\pm$  standard deviation (SD) or median  $\pm$  interquartile range (IQR) depending on whether or not they have a normal distribution.

Categorical variables were compared by using the  $\chi^2$  test or Fischer exact test, while the distribution of continuous variables were compared by applying

Student's t-test or Mann-Whitney test, when appropriated. An univariate analysis of variables predictive of POPF according to literature was performed via logistic regression with a p value set to 0,05. Then a multivariate analysis of variables potentially predictive of fistula risk via multivariate logistic regression with backward selection. The variables were checked for collinearity via tolerance.

The variables finally were selected to build a simplified score if the p value at multivariate analysis was  $<0,10$ . The predictive performance of this score was then tested on the population studied. The accuracy of a continuous variable in predicting a categorical outcome was evaluated using the Receiver Operating Characteristic (ROC) curves. The specificity and the sensitivity of the different thresholds are presented with their 95% confidence intervals. Youden's J test was performed to evaluate the performance of a positive score on the POPF occurrence.

The primary endpoint was the developing of a POPF grade B or C during the post-operative course.

The statistical analysis was conducted using the SPSS software (version 26.0).

## 4) RESULTS

### *A/ General results*

103 patients who underwent a distal pancreatectomy (DP) were included, 45 males and 58 females. The medium age of the population was 62 years, without difference between patients with and without CR-POPF. Patients characteristics are shown in Table 1. Almost all surgeries were performed for oncological purpose, accounting for 69,5% of cases (Table 2), with 35 patients had a diagnosis of Adenocarcinoma (34%), 24 of Neuroendocrine Tumor (23.3%) and 12 (11.7%) of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasia (IPMN).

Thirty-three patients developed a CR-POPF : 24 grade B fistulas and 9 grade C fistulas. In the group of grade B POPF, 27 patients had abdominal drains which were left more than 21 days, 6 patients were treated with a complementary interventional procedure, by radiology for 4 of them, and by endoscopy for the other two.

In the group of grade C PF, 4 patients underwent additional interventional endoscopy treatment but a surgical intervention was still necessary for 3 of these patients. In total, 8 patients underwent a reoperation and 4 of them underwent 2 interventions. Six surgeries consisted of collection drainage and 5 surgeries were for hemostatic purposes. One patient underwent a complementary gastrectomy for oncologic purpose. Only one patient died in the month following the DP, due to the progression of his neuroendocrine disease.

Data of univariate and multivariate analysis are shown in Table 2. The average BMI was 24,7 and obesity (defined as a BMI > 30) was associated with PF at univariate analysis, but was not statistically significative at multivariate analysis

(OR= 1,33; 95%CI 0.35 - 5.02; p value 0.067). The average operating time was 3 hours and twelve minutes. An operating time longer than 4 hours was associated with a higher risk of PF (OR=5,28 ; IC95%= [1,61 - 17,31]). Laparoscopy was performed slightly more than laparotomy (58% vs 42%), without correlation with POPF. The median level of amylase in abdominal drains at post-operative day (POD) 3 were higher for patients with POPF than those without POPF (656,0 vs 132,5; p=0,002). A preoperative imaging test was available in 64 patients. The median diameter of the pancreatic isthmus was 10,5 mm. Pancreas thickness superior to 10 mm was found to be a prognostic indicator for PF (OR=7,12; IC95%=[2,32 - 21,87], p<0,01).

		Clinically Relevant Post-Operative Pancreatic Fistula (CR-POPF)			
		Population	No	Yes	p
<b>Pancreas thickness</b>	<i>Mean (± SD)</i>	11.3 (± 3.5)	10.2 (± 3.0)	12.9 (± 3.5)	<b>0.0003</b>
	<i>Median (Q1;Q3)</i>	10.5 (9.0 ;13.0)	9.0 (8.0;11.0)	13.0 (11.0;15.0)	
<b>Length of stay</b>	<i>Mean (± SD)</i>	13.5 (± 8.3)	10.8 (± 4.8)	19.4 (± 10.9)	<b>&lt;0.0001</b>
	<i>Median (Q1;Q3)</i>	11.0 (8.0 ;16.0)	10.0 (8.0;12.0)	18.0 (11.0;24.0)	
<b>Age</b>	<i>Mean (± SD)</i>	62.2 (± 13.6)	63.1 (±14.2)	60.2 (± 11.9)	0.1131
	<i>Median (Q1;Q3)</i>	64.0 (54.0 ;71.0)	67.5 (57.0;73.0)	62.0 (50.0;69.0)	
<b>BMI</b>	<i>Mean (± SD)</i>	24.7 (± 4.6)	24.4 (± 4.0)	25.5 (± 5.7)	0.2704
	<i>Median (Q1;Q3)</i>	24.0 (21.0 ;28.0)	24.0 (21.0;27.0)	25.0 (22.0;30.0)	
<b>Drain Fluids Amylase POD 3</b>	<i>Mean (± SD)</i>	2095.9 (±7806.7)	1089.8 (±3229.5)	4296.6 (±12963.8)	<b>&lt;0.0001</b>
	<i>Median (Q1;Q3)</i>	196.0 (67.0 ;864.0)	132.5 (45.0;45.0)	656.0 (243.5;2076.0)	
	<i>Median (Q1;Q3)</i>	744.0 (156.0 ;3321.0)	292.0 (111.0;2619.0)	2176.5(521.0;6209.0)	

<b>Operating Time</b>	<i>Mean (± SD)</i>	3.5 (± 1.2)	3.2 (± 1.1)	4.0 (± 1.3)	<b>0.0090</b>
	<i>Median (Q1;Q3)</i>	3.3 (2.5 ; 4.3)	3.1 (2.4;3.7)	4.0 (2.9;5.0)	
<b>Surgical technique</b>	<i>Laparoscopy (%)</i>	60 (58.3)	45 (64.3)	15 (45.5)	0.0705
	<i>Laparotomy (%)</i>	43 (41.7)	25 (35.7)	18 (54.5)	
<b>Gender</b>	<i>Man (%)</i>	45 (43.7)	26 (37.1)	19 (57.6)	0.0511
	<i>Woman (%)</i>	58 (56.3)	44 (62.9)	14 (42.4)	
<b>BMI</b>	<i>Normal (%)</i>	86 (83.5)	63 (90.0)	23 (69.7)	<b>0.0096</b>
	<i>BMI &gt; 30 (%)</i>	17 (16.5)	7 (10.0)	10 (30.3)	
<b>Hypertension</b>	<i>No (%)</i>	74 (71.8)	51 (72.9)	23 (69.7)	0.7393
	<i>Yes (%)</i>	29 (28.2)	19 (27.1)	10 (30.3)	
<b>Tobacco</b>	<i>No (%)</i>	72 (69.9)	49 (70.0)	23 (69.7)	0.9750
	<i>Yes (%)</i>	31 (30.1)	21 (30.0)	10 (30.3)	
<b>Dyslipidemia</b>	<i>No (%)</i>	93 (90.3)	64 (91.4)	29 (87.9)	0.7228
	<i>Yes (%)</i>	10 (9.7)	6 (8.6)	4 (12.1)	
<b>Diabetes</b>	<i>No (%)</i>	85 (82.5)	59 (84.3)	26 (78.8)	0.4930
	<i>Yes (%)</i>	18 (17.5)	11 (15.7)	7 (21.2)	
<b>Alcohol</b>	<i>No (%)</i>	97 (94.2)	65 (92.9)	32 (97.0)	0.6614
	<i>Yes (%)</i>	6 (5.8)	5 (7.1)	1 (3.0)	
<b>Chronic pancreatitis</b>	<i>No (%)</i>	97 (94.2)	68 (97.1)	29 (87.9)	0.0815
	<i>Yes (%)</i>	6 (5.8)	2 (2.9)	4 (12.1)	
<b>OSAS</b>	<i>No (%)</i>	97 (94.2)	66 (94.3)	31 (93.9)	1.0000
	<i>Yes (%)</i>	6 (5.8)	4 (5.7)	2 (6.1)	
<b>Chronic liver disease</b>	<i>No (%)</i>	96 (93.2)	66 (94.3)	30 (90.9)	0.6775
	<i>Yes (%)</i>	7 (6.8)	4 (5.7)	3 (9.1)	
<b>Histologic fibrosis</b>	<i>No (%)</i>	73 (70.9)	49 (70.0)	24 (72.7)	0.7762
	<i>Yes (%)</i>	30 (29.1)	21 (30.0)	9 (27.3)	

**Table 1:** Patients' characteristics according to CR-POPF presence. BMI: Body Mass Index; POD: Post-operative day; OSAS: Obstructive Sleep Apnea Syndrome

	Univariate		Multivariate	
	Odds ratio [CI95%]	p-value	Odds ratio [CI95%]	p-value
<b>Obesity (BMI &gt;30)</b>	3,37 [1,09 - 10,43]	0,0347	1,33 [0,35 - ,02]	0.0672
<b>Laparotomy vs Laparoscopy</b>	1,89 [0,78 - 4,54]	0,1569		
<b>Gender (Woman)</b>	0,4 [0,17 - 0,97]	0,0535		
<b>Amylase &gt; 500 U/L</b>	3,92 [1,64 - 9,4]	0,0022	4,62 [1,56 - 13,62]	0.0026
<b>Pancreas thickness (&gt;10 mm)</b>	7,17 [2,85 - 18,02]	<.0001	7,70 [2,65 - 22,31]	0.0006
<b>Operating time &gt;4h</b>	4.13 [1,66 - 10,26]	0,0023	5,66 [1,66 - 19,29]	0.0060

**Table 2:** Univariate and Multivariate analysis for Post-operative Pancreatic Fistula


### *B/ Building a predictive score*

A 4 points score was created from the variables selected in the multivariate model.

One point was assigned if the patient had a pancreas thickness greater than 10 mm, as well as if he has an operation lasting more than 4 hours, if the amylase level on drain on POD 3 was higher than 500/L and if the patient had BMI >30. Obesity was chosen for the score because of the results of univariate analysis and because it well fitted the model on the ROC curves. The discriminating ability was tested on the ROC curve, showing an AUC (area under the curve) of 0.83 (IC 95%= [0.75 - 0.92]). On the Hosmer-Lemeshow test, the difference between the prediction of the model and the observed value is not significant (p-value = 0.44), which validates a relatively good fit of the model.

The score threshold was determined at 2 points/4, which has the highest value according to the Youden index (0.53). The sensitivity is calculated at 82%

(CI95%69 - 95) and the specificity at 71 (CI95%= [61 - 82]). A threshold at 3 points/4 is also very interesting, allowing to reach a specificity of 99% (CI95%= [99 – 100]).



B

Cutoff	Sensitivity [CI95%]	Specificity [CI95%]	Youden Index
4	0.12 [0.01 - 0.23]	1 [1 - 1]	0.12
3	0.42 [0,26 - 0,59]	0.99 [0,96 - 1,00]	0.41
2	0.82 [0.69 - 0.95]	0.71 [0.61 - 0.82]	0.53
1	0.97 [0.91 - 1.03]	0.24 [0.14 - 0,34]	0,21

**Figure 1:** Receiving Operating Characteristic Curves (A) with their specificity and sensitivity (B) of the different thresholds.

## 5) DISCUSSION

A simple score using the pancreas thickness, obesity, amylase level in abdominal drain on POD 3 and operating time seems to be able to predict with sensitivity of 82% and specificity of 71% with a cutoff at 2 points/4. The specificity of this score can be increased at 99% by raising the threshold at 3 point/4.

The risk factors found in our study (amylase on drains' fluid on POD 3, pancreatic thickness > 10mm, operating time) are concordant with the literature. As the texture of the pancreas was not provided in all the operative reports, we used a new variable which consists of measuring the pancreas at the level of the isthmus. Previous studies have already reported pancreatic thickness to be related with POPF<sup>17</sup>. Indeed, preoperative CT or MRI imaging has been reported to be a useful modality for surgeons to stratify the risk of severe POPF after pancreatic surgery, helping to select specific and tailored perioperative strategies<sup>18</sup>. Pancreatic thickness seems to be objective and can be obtained preoperatively, has showed to be a risk factor for the occurrence of CR-POPF at multivariate analysis with an ODDS Ratio higher than seven. This result can have different reasons, like the technical difficulty of suturing or stapling a thicker tissue, as already investigated in literature<sup>19</sup>. We tested the amylase level in abdominal drains instead of lipase, because of its wider diffusion and usefulness for pancreatic fistula diagnosis and prognosis, as stated by many papers<sup>20,21</sup>. The amylase cutoff at 500 U / L was associated with better statistical performance in constructing the score. Longer operative time have been known to correlate with increased morbidity<sup>22</sup> and confirmed in our series to increase the risk for CR-



POPF. Cutoff of 4 hours had the best performance and was coherent with previous study<sup>22</sup>. Finally, obesity was chosen for our risk score, even if not significantly associated with POPF. After multivariate analysis its p value was not far from significance, and in literature there are a lot of previous papers reporting its role as a prognostic factor<sup>20,23</sup>. For these reasons we tried to build a score by using this parameter, obtaining a discriminating ability on the ROC curves with an AUC of 0.83.

The main strength of this study lies in the creation of a score very easy to use, by using the risk factors identified in our study and already known in literature. If a patient has a score of 3, you can be almost sure that he will develop a grade B or C pancreatic fistula. Obviously, these are preliminary results, which need to be validated in an external cohort on a larger sample size. Nevertheless, they seem very promising and they could be very useful in everyday clinical practice, as well as in research.

Despite there are no sufficient evidences to suggest substantial changes in clinical practice, having a score suggestive for developing CR-POPF could help the surgeons to perform a more strict observation of the patient even in absence of specific suspicious symptoms or laboratory findings. It may be useful to plan postoperative radiological investigations to detect POPF before the occurrence of its fearsome complications, and to choose with a good likelihood rate which patient needs further investigations.

Strategies to reduce the occurrence of CR-POPF may include intraperitoneal drains, prophylactic somatostatin analogues, surgical tissue/fibrin sealants<sup>24</sup>. The usefulness of the aforementioned strategies is still debated, but having the

possibility to choose a subpopulation in which to implement them may be very important. In particular, the decisions on drainage management could be influenced by a positive score, thanks to an additional parameter, strong but very simple to apply. The usefulness of the score on the conduct to be kept on the removal or not of the abdominal drains after DP is still to be studied, but we are convinced that it would be very useful and interesting, as evidenced by the numerous papers existing in the literature that highlight an enormous disparity and uncertainty in the daily practice of pancreatic surgeons<sup>25,26</sup>.

Given the absence of a consolidated therapy, having a score to classify patients at high risk of developing a POPF could allow you to select a population on which to test a possible prophylactic therapy, also invasive, given the high risk and severity of the complication itself. For example, endoscopic drainage by sphincterotomy and placement of a pancreatic prosthesis has already shown curative efficacy, and it could be studied in patients with a score greater than 2 in prophylaxis<sup>27</sup>.

The study had important limitations. First of all, the small sample size that gave less statistical power to our conclusions. The score has not yet been validated on an external cohort, for sure this will be the next step. Then, the lack of information on operative transfusions in our database didn't allow to consider this parameter in our analysis, even if some previous study described it as a predictive factor for POPF. Finally, the retrospective and single-center design of the study was certainly another important limitation. An evaluation of the score on larger and external cohorts, possibly within a prospective multicentric study, is needed.

A simple score based on operation time, BMI > 30, amylase level >500 UI on abdominal drains on POD 3 and pancreatic thickness > 10 mm, measured at the isthmus on preoperative CT, can predict the postoperative risk of developing CR-POPF with a sensitivity of 82% (CI95%= [69 - 95]) and a specificity of 71% (CI95%= [61 - 82]) using a cutoff of 2 point, and even higher by choosing a threshold at 3 points/4. It seems very interesting for future clinical and research applications, further studies might go in this direction in order to validate it and to be able to benefit from its use.

## 5) REFERENCES

1. Parikh PY, Lillemoe KD. Surgical management of pancreatic cancer - Distal pancreatectomy. *Semin Oncol.* 2015. doi:10.1053/j.seminoncol.2014.12.010
2. Lillemoe KD, Kaushal S, Cameron JL, Sohn TA, Pitt HA, Yeo CJ. Distal pancreatectomy: Indications and outcomes in 235 patients. In: *Annals of Surgery.* ; 1999. doi:10.1097/00000658-199905000-00012
3. Fuks D, Piessen G, Huet E, et al. Life-threatening postoperative pancreatic fistula (grade C) after pancreaticoduodenectomy: incidence, prognosis, and risk factors. *Am J Surg.* 2009. doi:10.1016/j.amjsurg.2008.03.004
4. Lermite E, Sommacale D, Piardi T, et al. Complications after pancreatic resection: Diagnosis, prevention and management. *Clin Res Hepatol Gastroenterol.* 2013. doi:10.1016/j.clinre.2013.01.003
5. Oneil MacHado N. Pancreatic fistula after pancreatectomy: Definitions, risk factors, preventive measures, and management - Review. *Int J Surg Oncol.* 2012. doi:10.1155/2012/602478
6. Miyasaka Y, Mori Y, Nakata K, Ohtsuka T, Nakamura M. Attempts to prevent postoperative pancreatic fistula after distal pancreatectomy. *Surg Today.* 2017. doi:10.1007/s00595-016-1367-8
7. Bouvier AM, Uhry Z, Jooste V, et al. Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. *Int J Epidemiol.* 2017. doi:10.1093/ije/dyx088
8. Fujino Y. Perioperative management of distal pancreatectomy. *World J Gastroenterol.* 2015. doi:10.3748/wjg.v21.i11.3166

9. Goasguen N, Bourrier A, Ponsot P, et al. Endoscopic management of pancreatic fistula after distal pancreatectomy and enucleation. *Am J Surg*. 2009. doi:10.1016/j.amjsurg.2008.03.005
10. Bassi C, Marchegiani G, Dervenis C, et al. The 2016 update of the International Study Group (ISGPS) definition and grading of postoperative pancreatic fistula: 11 Years After. *Surg (United States)*. 2017. doi:10.1016/j.surg.2016.11.014
11. Kleeff J, Diener MK, Z'graggen K, et al. Distal pancreatectomy: Risk factors for surgical failure in 302 consecutive cases. *Ann Surg*. 2007. doi:10.1097/01.sla.0000251438.43135.fb
12. Hackert T, Werner J, Büchler MW. Postoperative pancreatic fistula. *Surgeon*. 2011. doi:10.1016/j.surge.2010.10.011
13. Yang J, Huang Q, Wang C. Postoperative drain amylase predicts pancreatic fistula in pancreatic surgery: A systematic review and meta-analysis. *Int J Surg*. 2015. doi:10.1016/j.ijssu.2015.07.007
14. Peng YP, Zhu X Le, Yin L Di, et al. Risk factors of Postoperative pancreatic fistula in patients after distal pancreatectomy: A systematic review and metaanalysis. *Sci Rep*. 2017. doi:10.1038/s41598-017-00311-8
15. Probst P, Hüttner FJ, Klaiber U, et al. Stapler versus scalpel resection followed by hand-sewn closure of the pancreatic remnant for distal pancreatectomy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015. doi:10.1002/14651858.CD008688.pub2

16. Zhang H, Zhu F, Shen M, et al. Systematic review and meta-analysis comparing three techniques for pancreatic remnant closure following distal pancreatectomy. *Br J Surg*. 2015. doi:10.1002/bjs.9653
17. Chang YR, Kang JS, Jang JY, et al. Prediction of Pancreatic Fistula After Distal Pancreatectomy Based on Cross-Sectional Images. *World J Surg*. 2017. doi:10.1007/s00268-017-3872-3
18. Sandini M, Bernasconi DP, Ippolito D, et al. Preoperative computed tomography to predict and stratify the risk of severe pancreatic fistula after pancreatoduodenectomy. *Med (United States)*. 2015. doi:10.1097/MD.0000000000001152
19. Kawai M, Tani M, Okada KI, et al. Stump closure of a thick pancreas using stapler closure increases pancreatic fistula after distal pancreatectomy. *Am J Surg*. 2013. doi:10.1016/j.amjsurg.2012.11.023
20. Lee CW, Pitt H, Riall TS, et al. 751 Does Drain Fluid Amylase Accurately Predict Pancreatic Fistula? *Gastroenterology*. 2014. doi:10.1016/s0016-5085(14)63747-1
21. Shinchu H, Wada K, Traverso LW. The Usefulness of Drain Data to Identify a Clinically Relevant Pancreatic Anastomotic Leak After Pancreaticoduodenectomy? *J Gastrointest Surg*. 2006. doi:10.1016/j.gassur.2005.08.029
22. Ball CG, Pitt HA, Kilbane ME, Dixon E, Sutherland FR, Lillemoe KD. Perioperative blood transfusion and operative time are quality indicators for pancreatoduodenectomy. *HPB*. 2010. doi:10.1111/j.1477-2574.2010.00209.x

23. Gaujoux S, Cortes A, Couvelard A, et al. Fatty pancreas and increased body mass index are risk factors of pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy. *Surgery*. 2010. doi:10.1016/j.surg.2009.12.005
24. Ecker BL, McMillan MT, Allegrini V, et al. Risk Factors and Mitigation Strategies for Pancreatic Fistula after Distal Pancreatectomy: Analysis of 2026 Resections from the International, Multi-institutional Distal Pancreatectomy Study Group. *Ann Surg*. 2019. doi:10.1097/SLA.0000000000002491
25. Villafane-Ferriol N, Shah RM, Mohammed S, et al. Evidence-Based Management of Drains Following Pancreatic Resection: A Systematic Review. *Pancreas*. 2018. doi:10.1097/MPA.0000000000000961
26. Beane JD, House MG, Ceppa EP, Dolejs SC, Pitt HA. Variation in Drain Management After Pancreatoduodenectomy: Early Versus Delayed Removal. *Ann Surg*. 2019. doi:10.1097/SLA.0000000000002570
27. Dumonceau JM. Distal pancreatectomy: Another indication for prophylactic pancreatic stenting? *Gastrointest Endosc*. 2010. doi:10.1016/j.gie.2010.05.016

## 6) ANNEXES

Histological diagnosis	Clinically Relevant Post-Operative Pancreatic Fistula (CR-POPF)		
	No	Yes	p
<i>Adenocarcinoma (%)</i> 35 (34.0)	27 (38.6)	8 (24.2)	0.1862
<i>Neuroendocrine tumor (%)</i> 24 (23.3)	14 (20.0)	10 (30.3)	
<i>IPMN (%)</i> 12 (11.7)	9 (12.9)	3 (9.1)	
<i>Serous Cystadenocarcinoma (%)</i> 5 (4.9)	2 (2.9)	3 (9.1)	
<i>Mucinous cystadenocarcinoma (%)</i> 9 (8.7)	8 (11.4)	1 (3.0)	
<i>Other (%)</i> 18 (17.5)	10 (14.3)	8 (24.2)	

**Table 3:** Histological diagnosis on pathological examination. IPMN: Intraductal papillary mucinous neoplasm



## 7) SERMENT D'HIPPOCRATE

En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l'Être suprême, d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine.

Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail.

Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs pères.

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque.

## 8) ABSTRACT

### INTRODUCTION

Postoperative Pancreatic Fistula (POPF) is a common and serious complication after Distal Pancreatectomy (DP). The number and the weight of the different risk factors reported in literature still remain controversial and an effective and accepted score to predict the occurrence of grade B and C (Clinically Relevant; CR) POPF does not exist.

### METHODS

Data regarding 103 consecutive patients undergoing DP were collected. A multivariate analysis of variables potentially predictive of fistula risk via multivariate logistic regression with backward selection was performed, in order to build a simplified score. The predictive performance of the score was then tested on the population studied. The accuracy in predicting a categorical outcome was evaluated using the Receiver Operating Characteristic (ROC) curves. Youden's J test was performed to evaluate the performance of a positive score on the POPF occurrence.

### RESULTS

Thirty-three patients developed a CR-POPF : 24 grade B fistulas and 9 grade C fistulas. Operation time >4 hours, amylase levels on drains' fluid >500 UI on POD 3 and pancreatic thickness >10mm were found to be predictive of CR-POPF on multivariate analysis. A 4 points score was created from the variables selected in the multivariate model, by assigning 1 point for each of the previous parameters and 1 if the patient had a BMI > 30. The discriminating ability was tested on the ROC curve, showing an area under the curve of 0.83 (CI 95%=

[0.75 - 0.92]). On the Hosmer-Lemeshow test, the difference between the prediction of the model and the observed value is not significant (p-value = 0.44). The score threshold was determined at 2 points/4, which has the highest value according to the Youden index (0.53). The sensitivity is calculated at 82% (CI95%= [69 - 95]) and the specificity at 71 (CI95%= [61 - 82]). A threshold at 3 points/4 allows to reach a specificity of 99% (CI95%= [99 - 100]).

## CONCLUSION

A simple score based on operation time, obesity, amylase level on abdominal drains on POD3 and pancreatic thickness measured at the isthmus on preoperative CT can predict the postoperative risk of developing CR-POPF with good sensitivity using a cutoff of 2 or more point.

## 9) RESUME

La fistule pancréatique est une complication fréquente et grave après une pancréatectomie distale. Le nombre et le poids des différents facteurs de risque rapportés dans la littérature restent encore controversés et il n'existe pas de score pour prédire la survenue de fistule pancréatique de grade B et C (cliniquement pertinente).

Les données concernant 103 patients consécutifs subissant une pancréatectomie ont été collectées.

Trente-trois patients ont développé une fistule pancréatique : 24 fistules de grade B et 9 fistules de grade C. Le temps opératoire supérieur à 4 heures, le taux d'amylase sur le liquide de drainage abdominal supérieur à 500 UI/L à J3 post opératoire, l'épaisseur du pancréas supérieur à 10 mm et un IMC supérieur à 30 se sont avérés prédictifs fistule pancréatique cliniquement pertinente. Un score de 4 points a été créé à partir des variables sélectionnées dans le modèle multivarié. La capacité de discrimination a été testée sur la courbe ROC, montrant une aire sous la courbe de 0,83 (IC 95% [0,75 - 0,92]). Le seuil du score a été déterminé à 2 points / 4, ce qui a la valeur la plus élevée selon l'indice de Youden (0,53). La sensibilité est calculée à 82% (IC95% [69 - 95]) et la spécificité à 71 (IC95% [61 - 82]). Un seuil à 3 points / 4 permet d'atteindre une spécificité de 99% (IC95% [99-100]).

**MOTS CLES :** Fistule Pancréatique, Pancréatectomie distale, Score prédictif, Temps opératoire, Obésité, Amylase, Epaisseur pancréatique.